





12

16 C

28





HISTORIA PLAN-

TARVM ET VIRES EX
DIOSCORIDE, PAVLO AEGI-
NETA, Theophrasto, Plinio, & recetio-
ribus Græcis, iuxta elementorū ordinē.

PER CONRADVM GER-
nerum Tigurinum.

Adiecta ad marginē nomenclatura, qua
singulas herbas officinæ herbarij, &
vulgus Gallicum efferre solent.



PARISIIS
Apud Odinum Petic, sub Lilio aureo,

1541.

mor.

HENRICO BILLINGO

~~Conradus Gesnerus.~~

S. D.

E

GO QUIDEM fatisgnarus, Henrice charissime, in quibus quantisq; negotiorum hoc imprimis tempore verseris, haud temperare tamen mihi potui, quin qualicumq; tandem indicio meum in te amore, qui hactenus pectore latuit, palam profiterer. Quod cum in praesentia qua fieret alia ratione non haberem, quod habui solum, superioribus diebus plantatum mihi congestam historiam ad te mittere volui. Acquisitum enim tibi ut ascriberetur existimaui, non modò tuorum erga me officiorum nomine; quāvis id maxime: sed etiam quod cum studiosorum omnium amator & admirator sis vnicus, occasionem tibi quoq; sine meliorum literarum lectione vllam effluere nō patiaris, comprimis quidem sacrarum, post quas, ut nec alios bonos auctores, ita neque medicos inspicere aliquando piget. Accessit alia causa hac tibi nuncupandi, ut si luctu nimio premerere tristioris fortis, qua te tuosq; per familiarum vestre funera nuper exerceri Deo visum est, iucundiore hoc, si possem, argumēto, inde auocarem. Huc facit etiam fortuna tua (quam hinc non ut vulgus, sed prouidentia

diuinæ œconomiam, seu promā condāmque accipio) quę cū tibi hortos & prædia donaue- rit amplissima, simul agriculturæ & planta- rum studiū iniecit, quo quidē ipso inter ne- gotiosa huius vitę studia, vix dici vllū potest bonis viris coniunctius familiariúsq;. Philo- sophi quidem inter alia liberalisanimi signa recēsent, animalibus delectari, præcipuē pul- chri quippiā mirandq; habentibus, idq; iu- cunditatis solum gratia. Ego verò longē ma- gis collaudauerim, qui pulcherrimis plantis ac peregrinis oblectantur. Nam & liberalitas in huiusmodi existit; qui dum non suæ, sed cōmunis vtilitatis rationem habent, sumpti- bus nullis parcunt, vnde cūq; terrarum plan- tis peregrinis, pulchris, admirandis, iucūdis, salubribus, arboribus, fruticibus herbis ex a- lieno orbe magno studio, magnis sumptibus conquisitis, ornando ditandóque nostrū. Sed iam nostrę plantarū historiæ, vel potius tuę, rationē tibi explicabo. Cū superioribus men- sibus suauissimā patriam Tigurū inuisssem, salutandi gratia semel atq; iterū doctissimū virū Christophorum Clauerū vrbis nostræ archiatrum accessi. is cum varia colloquenti- bus nobis, medicinæ studiosis rem vtilem fa- cturū diceret, si quis simplicium medicami- num ē Dioscoride quidem descriptiones, fa- cultates autē ex Aegineta cōscriberet: placuit mihi tum id cōsiliū, & iam prius in mentem

sæpe venerat. Mox igitur non hoc solû præ-
stare conatus sum, sed ordinẽ alphabeti secu-
tus, reliqua etiam Simplicia adieci, quę Dio-
scoridi omiſsa in frequẽti sunt ac celebri hu-
ius temporis medicorum vsu, barbaris mon-
strata primũ, & à recentioribus Gręcis in suã
linguã transfusa, à quibus ego huc transcrip-
psi, doctissimi viri Ruellii interpretatione
plerunq; vsus. Fuit autem præcipuũ scribendi
institutũ, vt studiosi medicinę enchiridion
haberent circumlatu facillimum, etiam ruri,
Dioscoride quem antehac circũferebant, bre-
uius, melius, locupletius, & quoniam ordina-
tim scriptum commodius, laborioso inquire-
di tædio vacans, mole nulla, nõ omiſsis mul-
tis aliis præclaris apud Arabes medicinis sim-
plicibus. Melius autẽ dixi, quod ex Agineta
plerunq; (qui Galeni compendiũ est, aut vt
alii loquuntur, simia) nonnunquam ex ipso
Galeno, aut Aëtio facultates ascripserim in
genere primas, secundas, & tertias, vt illi vel
omnes vel aliquas tantum memorauerunt.
Hoc autẽ, priores dico & vniuersales ceu par-
ticulariũ virtutum fontes quosdam describe-
re, rationalis tãtum artificis est: particulares
verò tradere, magis empirici. Propterea ex his
quidem generalia inuenire difficillimũ: ex
generalibus verò alias omnes inde manan-
tes, cuius exercitato in Galeni methodo fa-
cile fuerit. Porro hic solum plantarum hi-

storiā mitto, ut quā minimū sit enchi-
ridion, & ruri præcipuè commodissimū. Mit-
tam proximis diebus reliqua etiam, quæ præ-
ter plātas sunt simplicia. in Marginibus Ger-
manica, sicut Græca, non addidi, quod aliū,
ut nosti, ex professo scripserim librū de plan-
tarum nomenclaturis, nostra, Gallorū, Græ-
corum, & Romanorū linguis, sed nudis no-
minibus absq; viriū & ipsarum descriptionis
historia. Liberet de aliis pluribus in primis
vero pulcherrimi liberalissimiq; plantarum
studii laudibus te affari, nisi vitio mihi dan-
dum metuerē, quod breui libello promisso
longiorem quā pro eius portione, neq; de
necessariis rebus epistolam prefixissem: quā-
obrem nihil amplius addam, quā ut animo,
quo soles omnia, candidissimo his acceptis
a Conrado tuo mortaliū omnium tui aman-
tissimo, maiora in posterū expectes. Vale.
Christus Opt. Max. te cum grauissimo viro
patre tuo in Reipub. & bonorum studiorum
salutem, incolumem quā diutissimè tuc-
tur. Iterum vale. Lausannæ. 1 x. Augusti.

INDEX.

A

A Gasyllis	14.28	Balsamum	33.6
Agnus	256.24	Barbula hirci	34.25
Alcibiadiōi	7.23	Barba senilis	10.22
Alus	228.12	Bathypicron	2.6
Amaracus	180.29	Bdellium	34.29
Amaranton	91.20	Bellis	35.15
Anchusa	139.6. & seq.	Bellius	ibidem
Aniarrhinon	22.5	Beta	35.18
Anaxyris	131.24	Betula	36.14
ἀνδραχυνάγρια	125.8	Betonica	35.28
Anthericon	114.27	Blattaria	39.27
Antirrhinon	22.5	Blitum	37.2
Anthyllon	13.23	Boleti	37.4
Antimalum	147.11	Botrys	37.16
Apiastrum	22.29	Bolchon	34.29
Arrhenogonum	187.21	Brassica	37.18
Aronia	151.16	Brassica	23.31
Arcturon	25.10	Bryon	56.10, & 158.13
Ascyroides	28.18	Bryonia	257.8
Asparagus	29.19	Brytanica	38.16
Astragalus	30.18	Bucheides	216.29
Attractylis	30.29	Bucinus	85.22
Attriplex	31.	Buglossus	38.22
Auena	31.10	Bulbina	39.2
		Bulbus esculentus	39.10
		Bulbus vomitorius	39.15
		Bulapathum	38.29
		Bunium	39.22

B

B Accharis	32.5
Ballote	32.26
Balaustium	32.18

INDEX

Buphtalmon	40.6	Centunculus	71.6
Bupleurum	40.14	Chamaeacte	212.26
Buselinum	41.3	Chamaecisso, 57.6.64.14	
Butomus	40.21	Chamaedrys	57.21.
Buxus	41.6	& 252.7	
C		Characias	246.13
Cacalia	41.11	Chironium	91.19
Cactus	41.22	Chrysanthemon, ibidā	
Calamintha	42.17	Chrysolachanos	31.7
Calamus odoratus,	41.23	Cibotion	96.23
Calathiana	42.1	Cici	205.29
Calcifraga	42.9	Cichorion	60.27
Cacbla	40.6	Circæa	147.13
Caltha	41.10.61.13	Citharon	69.13
Calthula	42.17	Cissaron	69.12
Calyx	17.17	Cissanthemon	64.4.
Cammoron	5.21	Cissophyllon, ibidem	
Cancamon.	43.21	Clematitis	27.16
Canaria	43.6	Colocynthis	65.9
Cannabis	43.16	Coris	78.12
Canna Indica	51.3	Coriandrum	78.2
Canopon	44.11	Cornus	78.20
Cantabrica	44.12	Conferua	77.6
Caphura	44.20	Consiligo	77.12
Cardamina	230.3	Conuoluolus	77.24
Carnabum	27.2	Conyza	77.28
Carnabadium	ibidem	Corianum	78.2
Cassitas	51.22	Coronopus	79.1
Cedria	52.29	Corruda	29.21
Cedrides	53.9	Costus	29.8

INDEX

Coronea	80.1	Daucus	84.20
Crataegonum	80.4	Diſtamnus	85.25
Crithmum	80.13	Delphinium	85.11
Crocodilion	82.28	Dicoccos	261.1
Crocus	81.7	Diospyros, vel diosporos.	
Cromphena	219.15	86.14	261.1
Croton	205.29	Dipsacus	86.17
Cucurbita	81.1	Dodecatheos	86.30
Cucumis	81.4	Dolichi	186.25
Cuminum	83.4	Donax	114.15
Cunila	77.28	Dorias	90.17
& 84.6, 170.7		Dorycnion	87.5
Cunilago	77.28	Dorypetron	136.6
Cupressus	83.27	Draba	25.1, & 87.23
Cymbalion	258.20	Dracunculus	87.31
Cynocrābe	23.21, & 67.1	Dryophonum	88.16
Cynoſtonon	6.2	Dryopteris	88.25
Cynomoron	24.2	Dulcis radix	89.1
Cynofarchis	169.5	E	
Cypariſſias	246.10	E Benus	89.14
Cytinus	69.20	Ebulus	212.3
D		Elate	91.9, & 175.20
Dactylitis	27.9	Elaterium	81.20
Damaſcena	197.30	Eleliſphacon	212.8
Damaſoniō,	10.23, & 85.1	Eleophyllum	187.15
Daphnitis	50.17, zigir	Eruca ſylueſtris	95.27
cognomine	cod.	Eryſſepton	29.6
Daphnoides	70.23,	Erytranon	69.23
& 77.30		Erytrodanum	208.1
Darca	50.23	Erythros	205.12

INDEX

Erythronium	ccxv, xxvi	Incana	cxxy.xx
F		Irio	cxxyi.xiii
Faba pontica	xcix.xi	Iucus Babylonius, 128, 21	
Foeniculum sylvestre.		Ixia	lvii.xxv
cii.xiii		L	
Fumaria	xlx.xix	L Achryma Aethiopica,	
G		cxvi.vi	
Gethyllis	cviii.xx	Lactoris	cxix.xviii
Gethyon	cviii.vi	Lapathum	cxxyi.xviii
Gladiolus	cx.vii	Laser	cxxyii.xii
Glandes Iouis, cx.xxiii		Lepidion	cix.xiii
Glycyfide clxxiii.xviii		Leontice	xli.xi
Gnochiles xvii.xxiii		Licron	cxxyvi.vi
Gordylon, cxxyiii.xviii		Ligustrum	cxl.xvi
H		Lilia	cxl.vii
Halicacabō, ccxxxiii.3		Limnesion	liiii.x
Hedysaron, ccxyi.ii		Limonion	cxli.v
Helitropion cxvi.xiii		Lingua	cxli.xix
Helioscopius, ccxvi.ix		Linozotis	cli.i
Helix cxv.viii		Linum	cxli.xvi
Hemionium, xxix.xxix		Lithospermon	cxlii.v
Heraclea ccxvii.vi		Lolium	cxlii.xviii
Heraclia cxvii.viii		Lonchitis	cxlii.xxi
Herba pedicularis 237.11		Lopima	cx.xxiii
Hippuris xciii.xxiii		Lotus	cxliii.viii
Holoscœnos, cxxyiii.x		Lupinus sativus cxliiii.x	
Hypocistis lxix.xxiii		Lupha	xxvii.xxii
I		Lupus salictarius, 144.20	
I Biscus xxx.xx		Lutea	cxlv.vi
Illecebra ccxxy.viii		Lycoctonon	viii

INDEX

Lychnis sylvest.	137.25	Melittæna	xxii,xxviii
Lychnitis	cclv.xvi	Mentha	cl.xx
Lygos	ccclvi.xxxiii	Menthastrum	ibidem
Lyfimachia	cxli,xx	Menthastra,	xlii,xxiii
Lythron	ibidem.	Meon	clii,i
M		Mespilus	cli.xvi
MAcer	cxlv,xii	Millefolium	cliii,xiii
Macheronion,	cx.vii	Milium	cliii,i
Machis	clviii.ii	Milium Indicum,	ibidē
Madelcon	xxxiii,xxx	Miliaria herba	clii,xxv
Magudaris	cxxxii,xxiii	Myos ota	xiii,xxiii
Malabathrum	cxlv,xx	Mioctonum	v.xxi
Malumpunicū,	cxcix,xvi	Mithridation	clvi,xi
Mala,146,23, pfica, 184		Mollugo	clvii,vi
Malacocissus	cxlvi,ix	Moly	clii,xxiii.ccx,vi
Malua	cxlvi,xiii	clvi,xxi	
Mamiras	cxlvii.vi	Molybdæna	clvii,i
Mannathuris	ccxliiii,v	Morus	clvii,vii
Mandragora	cxlvii,xi	Moschocaryon	clvii,xvi
Marrubium	cxlix,i	Mosyliti	lvv,vi
Marrubiū nigrum, 32.26		Muris auricula	xxxi,xxi
Marum	cxlix,xii	Muscus	clviii,xiii
Masticho	cxxxv,viii	Muscus marinus,	ibidem
Maspeton	cxxxii.viii	Myagrus,	clii,x
Medica	cxlix,xx	Myles	clii,xxi
Medion	cl.i	Myosotis	xxi.
Melampodion,	cliiii.x	Myrsinoides	lxx,xxiii
Melampus	codem	Myrrha	cliii,iii
Melampyron	clii.x	Myrica	cliii,xx
Melissophyllō,	xxii,xxix	Myristica	clvii,xxiii

INDEX

Myriophyllum cliii,xiii
 Myrepfica clvii,xviii
 Myrsinites ccxvi,viii
 Myrtacantha ccix,xiii
 Myrtidanum, clv,xxiii
 Myrrhis clv,xv
 Myrt^o syluestris ccix,xiii
 Myrtus sativa clv,xxi
 Myxa clvi,xiii

N

Nacaphthum clix,iii
 Napi 158,26.& 229,19
 Narcaphthum clix,iii
 Narcissus clix.xi
 Nardus clix,xxiii
 Nardū syluestre xxviii.vi
 Nastos cxiii,i
 Nasturtium clx,ix
 Nepa ccxx,iii
 Nepeta xlii,xx
 Nerion clxii,xvi
 Nigella clxii,xxviii
 Nux Indica clxiii,xi
 pontica cxxxv.viii
 Nuces auellanae 163,23
 iuglandes ibidem
 Nymphæa clxii,xxvii

O

Ocimum clxv,iii
 Ocimoides,clxiii,25

Oenanthe clxv,xix
 Olea, clxvi,i
 Ocimastrum clxiii,xxvi
 Onagra clxvi,xxi
 Onitis clxx,xii
 Onobrychis clxvi,xxx
 Onoclia xvii,xviii
 Ononis xx,xxvi
 Onosma clxvii,viii
 Oothera clxvi,xxi
 Onuris ibidem
 Ophioscorodon xi,xxvi
 Opium cluvii,viii
 Popanax clxvi,xi
 Opulus clxviii,xxv
 Oreoselinum clxix,xxvi
 Origanum clxx,viii
 Ornithogalum clxxi,xi
 Orneoglosson clxxi,i
 Ornus clxxi,xx
 Orobanche clxxii,xiii
 Oryza clxx,xxvi
 Osyris clxxii,xxiii
 Osteocollon clxxiii,i
 Othonna clxxiii,x
 Oxalis cxxxiii,xxiii
 Oxya clxxiii,xxx
 Oxys clxxiii,xviii
 Oxylapathū cxxxi,xix
 Oxymyr sine ccix,xiii,

INDEX

P		Peticlymenon	181.19
Pacerota	3.30	Peristercon	183.7
Paxonja	174.18	& 211.18	
Paliurus	175.11	Persea	183.17
Palma	175.20	Perficæ	183.29
Panacea	139.29	Persion	235.13
Panaces Asclepiō	177.18	Personata	184.4
Heraction	170.18	Pesgallinaceus	45.29
Panaces	177	miluinus	114.11
heracleum	176	Petasites	184.14
Pancratium	178.10	Petilius	184.21
Panicum	178.16	Petoselinum	184.30
Papauer	178.20	Peuce	129.1
Papyrus	180.20	Peucedanum	185.9
Pardalianches	5.20	Phalangium	186.6
Paralius	146.9	Phalangites	ibidē
Paronychia	180.23	Phalaris	186.17
Partheniō	117.8 & 180.2	Phascon	56.10
Pastinacia	181.4	Phasgonon	110.7
Pecton	228.18	Phaselli	186.25
Pelecinus	221.2	Phasiolon	127.21
Pepanus	199.7	Phasioli	186.25
Peplion	381.18	Phellandrium	187.3
Peplis	181.17	Philetæria	194.13
Peplos	181.28	Phlomidēs	255.15
Pentameron	174.28	Phloon	188.4
Pentoboron	174.18	Phlox & phlogion	219
Pepon	182.9	Phlum	188.13
Perdicium	117.8	Phoenix	175.20
Pericarpum	182.14	Phormio	188.22

INDEX

Phragmites, seu uallato- ria 114.15		Polygonoides	70.25
Phu	189.7	Popul ^a alba nigra	196.10
Phyllitis	187.6	Porrum	196.17
Phyllum	187.15	Portulaca syluest.	181.18
Phyrama	15.4	Poterium	196.2
Phyteuma	187.29	Pothos	107.1
Picea	189.23	Potamogeton	196.24
Picris	222.24	Prunum	197.24
Pinus	189.14	Pſora	198.6
Piper	200.14	Psyllion	198.10
Pisum	202.19	Ptarmica	198.19
Pistacia	202.7	Pulegium	198.30
Pistolochia	202.14	Pulmonaria	199.7
Pithyantes	7.4	Pycnocomon	200.60
Pityides	200.3	Pyrethrum	201.22
Pityusa	193.4	Pyrina	7.3
Plantago	193.13	Pyrum	202.3
Platanus	194.4.	Q ^q	
Platyphyllos	96.24		
247.28		Quercus	200.1
Plumbago	157.1	Quinquefolium	199.28
Polemonia	194.13	R	
Polium	195.28		
Polycnemon	194.23	R Adicula	200.18
Polygonatū	195.4	Radix	200.22
Polygonium	173.3	Ranunculus	201.12
Polygonū 195.19, 213.18		Rapum	201.30
Polygala	194.29	Resina liquida	202.14
Polytrichon	195.26	Rha	204.1.18
		Rhamnus	204.11
		Raphanus	206.23
		Rhaponticum	204.18

INDEX

Rheum	ibidem	Satureia	ccxvii.iiii
Rhæas xx, xx & clxxvii.		Satyrium	ccxv.xix
xxvii.		Satyrion basilicū	ccxvi.iii
Rhodia radix	ccv.v	Saxiphraga, seu saxiphra-	
Rhododendron	clxii.xv	gos	ccxvi. xviii
Rhus	ccv.xii	Scammonia	ccxvii.xix
Recinus	ccv.xix	Scandix	ccxviii,xxi
Rodora	ccvi.i	Scissima	clxxiiii,i
Rosa	ccclxxvi	Scorpius	ccxx,iiii
Rosmarinus	ccclx.xix	Scorpioides	ccxix,xxviii
& cclxx,xxix		Scorpiurum	cxvi,xv
Rubus canis	ccviii.xvii	Scolopédriō	xxix,xxviii
Rubus, Idæus	Ibidem	Scolymon	xlvi,xi
Ruscus	ccix,xiii	Scopa regia	ccxviii,xxix
S		Scordium	ccxix,xiii
Abina	ccxi.i	Scorodoprasum	ccxx,xvi
Sacra herba	ccxi.x	Scylla	ccxviii,xxvi
Sagapenum	ccxi.vii	Secale	ccxx,xxv
Saliunca	clx,xxx	Securidaca	ccxxi,ii
Salix	ccxii.i	Selago	ccxxi,xii
Saluio	ccxii.viii	Semperuiuum	ccxxi,xvi
Sambucus	ccxii.i	Senecio	ccxxii,xiii
Samsuchus	ccxiii.vii	Serapias	clxix, xiii
Sanguinaria	ccxiii,xviii	Serpillum	ccxxiii,ii
Santalum	cuxiiii,v	Seris lx, 27, ccxxii, xxiii	
Santonicum absinthium		Sertula campana	cl,xiii
cc.xxiii		Sesama	ccxxiii,xviii
Sarcocolla	ccxiii,xxv	Sesamoides	ibidem
Sardoa vel sardonias		Seseli creticum	ccxxiii,
ccxv.iii.		xiii,	

INDEX

maſſilienſe	ibidem	Stachys	ccxxxvi, xxvii
Scutlomalachō	ccxxv, xii	Staphisagria	ccxxx, xi
Side	ccxxvi, x	Staphyodendros	237, 6
Sideritis	ccxxvi, xvii, cxvii, viii	Sthœcas	ccxxxviii, xxi
Siler	ccxxvii, xix	Sthœbe	ccxxxviii, xliii
Siligo	ccxxviii, ii	Stratiotes	ccxxxviii, 28
Siliqua	ccxxviii, ix	Struthium	cc, xviii
Silphion	cxix, vi	Styrax	ccxxxvii, xix
Silibos	ccxxvii, xxvii	Sycaminus	ccxxv, xvii
Sinapi	ccxxix, xix	Sycomorus	ibidē
Siō	cxix, xxi, cxxx, iii	Symphona	ccxxix, xv
Sium	ccxxx, xxi	Symphyton petraeon	ccxxxviii, xii
Siler	ccxxix, xxv	Syringias	cxliii, xliii
Sifon	ccxxx, xv	T	
Sifymbrium	ccxxix, xxix	Talantium	clxxiii, iii
Smilax	ccxxx, xxv	Tamarix	cliii, xx
Smyrnium	ccxxxii, viii	Taxus	ccxxx, xxv
Solanum	237.27 & ſeq.	Telephium	ccxxxix, xxi
Somphus	ccxxxiii, ix	Terebinthus	ccxl, vi
Sonchus	ccxxxiii, xviii	Teriophonon	v, xxi
Sorba	ccxxxiii, xxv	Testiculus	clxix, v
Spanacia	ccxxxv, iii	Teucrion	ccxl, xv
Sparganion	ccxxxv, vii	Tapſia	ccxl, xxviii
Spartion	ccxxxv, xiii	Talietron	ccxl, xxi
Spatha	clxxv, xxv	Thelygonū	clxxxvii, xvii
Spōdylum	ccxxxv, xxi	Thelyphomon	v, xxi
Spina 25. 12. acuta	ccxxxvi	Therionarca	ccxli, xxviii
vii, alba	ccxxxvi, vi	Thlaſpi	ccxlii, xxvi
ſplenion	xxix, xxix	Thrauſma	xv, ii

Thus ccxlii.xiii
 Thylacitis clxxviii.xxiii
 Thymelæa ccxlii.xi
 Thymus ccxlii.xx.
 Tilia ccxlv.i
 Tithymalus ccxvi.iiii
 Tragacantha ccxlviii.
 xviii
 Tragium ccxlviii.xxviii
 Tragos ccl.ix
 Tragoriganum ccxlix.
 xxix,
 Tragopogon ccxlix.xiii
 Tribulus ccl.xxi
 Trifolium ccli.xii
 Tripolion ccli.i
 Triticum ccli.xvii
 Trisago ccli.vii
 Tubera ccli.xxvi
 Tusilago ccliii.i
 Typha ccxlv,xxi

V V
 Eneris pe^æ ccliii.xii
 Veratrum ccliii,xxi
 Verbascum cclv.iii
 Verbenaca clxxxiii.vii
 Vetonica xxxviii.xvi
 Vmbilicus Veneris
 cclviii.vii
 Vnedo xxv.ii
 Vrticula syluestris cclix.i

X
 X Iphidion ccxxxv.
 Xylocinnamomum
 lxvi.x

Z
 Z Arnabum 27.2
 Z Zarnabadium xxvii.ii
 Z Zingiber lxvi.x
 Z Zuyia. xlix.xix
 Zygis ccxxiii.viii

FINIS.

HISTORIA PLANTARUM

ET VIRES EX DIOS-
coride, Paulo Aegineta, Theo-
phraſto, Plinio, & receptio-
ribus Græcis, iuxta ele-
mentorum or-
dinem.

PER CONRADVM GESSNE-
rum Tigurinum.

A

BROTONVM duorum eſt ἀβρότο-
generum: fœmina, quadam ar-
boris ſpecie fruticans, candi-
cat, circum ramulos foliis, ſe-
riphi modo, minutim incifis.

A

vv.

Cypreæ

floribus referta eſt, comantibus in ſummo,
fulgore auri, corymbis. quod per æſtatem
prodiit, ſuauius olet, cū grauitate quadam
& amaro guſtu. id genus Siculum eſſe cōſtat.
Alterum mas vocatur, ſarmentofum, gracili-
bus ramulis vti abſinthium. Plurimū in Cap-
padocia gignitur, & Galatia Aſiatica, atq; in
Syriæ Hierapoli. Aegineta, Calefacit & ſic-
cat in tertio abſceſſu, digerendi incendiq; fa-
cultate præditum, modicè enim astringit. to-

Aurone

A

ti corpori cū oleo infricatū rigores circuitu remeantes per sanat. Stomacho inimicū est. Crematū eo magis siccatur, quod ignem haud expertum est. Alopecias sanat cū aliquo tenuium partium oleo.

ἀψιθίων
aluisue

ABSINTHIUM, aliqui bathy picron, herba vulgò cognita. Præstantius in Ponto & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Aegineta. Cal. 1. sic. 3. Astringit cum amarore acrimoniâque. Humores ventriculi biliosos aluo & vrina pellit: quibus autem pituita redundat, eos propter astrictiōē nihil iuuat. Succus ipsius, herba multo calidior est.

σιρῖφιον
Barboti-
na &
mors de
vers

ABSINTHIUM marinum, quod aliqui seriphum vocāt, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam, & in Taphorisi Aegypti gignitur, quo Isiaci pro oliuæ ramo vtuntur. Herba est tenuis, abrotoni parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. Ea grauitè olet, & cū quadam calfactione adstringit. Tertium genus absinthio assignatur, quo Gallia alpibus finitima scatet: id patrio nomine Santonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomento, absinthio non dissimile, verum subamarum est, non adedò seminis fecundum. Eadem quæ seriphium potest. Aegineta, Seriphium calefacit 2. siccat 1. Consimile absinthio, minus tamen eo astringit, magis calefacit. animalia vètris oc-

cidit, mediocriter stomacho aduersatur.

ἀκκία

ACACALIS fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis myricæ quadā tenus similis. Aegin. Eius dilutum collyriis claritate oculorum efficacibus miscetur.

λίσ

ACACIA in Aegypto nascitur spina instar arboris, fruticosa, non se in rectum attolens, florem habet cādidum, & semen lupino simile in folliculis. ex quo succus expressus siccatur in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. aliqui exprimunt ex foliis & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Alterum acaciæ genus in Cappadocia Pontoque provenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, longè minus, tenerius, humile. aculeorū vallo munitur, folia habens rutæ. semen lenticula minus fert autumno, in loculis cōnexis, ternū quaternūve capacib. Succus eius adstringit virib. inferiorib. & ocularib. medicamētis inutilis. Aegineta. Sic. 3. frig. 1. elota autem 2. Acerba & terrestris est.

ἀκκία

ACANTHIUM albæ spinæ simile, foliis aculeatis per extremitates, & lanugine arancosa obductis. ex qua collecta & neta vestes bōbycinis similes texūt. folia vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur. Aeg. Calidæ naturæ, & tenuiū partiū est. Conuulsis auxiliatur.

ἀκάνθιον

ACANTHYS, Rom. pæderotā vocāt. nasci-

ἀκάνθος

brancha tur in hortis, petrosis, & riguis. folia habet
vr̄ina- multo lactu caceis latiora, & longiora, crucæ
 diuisura, nigricantia, pinguia, læuia: caulem
 binum cubitorum, digitali crassitudine, læuē,
 prope verticem ex interuallis circumdatum fo-
 liolis, ceu nucamēta quædam oblonga refe-
 rentibus, spinosis: è quibus flos prodit albus,
 semen oblongum, luteum: caput thyrsi specie.
 radicibus nititur longis, mucosis, rubris, &
 glutinosis. Nascitur & syluestris acanthus,
 scolymo similis, aculeatus, breuior quàm sa-
 tius, & is qui in hortis prouenit. cuius radix
 ad eadem ad quæ superior efficax. Aeg. Alii à
 nigro foliorum colore melamphyllon appel-
 lant. discutit & siccatur.

* erable A C E R arbor est tilia: non absimilis forma
 & magnitudine, verum cortice paulo scabri-
 ori, subliuidoque, crasso, & flexi cōtumace.
 Radicib. paucis, sublimib. crispis. materie ve-
 nis longiorib. fluctuante, molli, macilēta, gra-
 cili. Summa soli facie gaudet, facilēq; cape-
 sit incrementum, in riguis potissimum. De flo-
 re nasci aiunt fructum paliuro similem, verum
 oblongiorem. R. eperiuntur hac in arbore duo
 tubera, vnum brusci nomine, intortius, crispum:
 alterum molusci, sparsum, simplicius, sed ex-
 cellentius priori. Aceris montanum genus cris-
 pius duriusq; est, etiamnum è mascula crispus
 ad lautiora opera. De campestri, id est, galli-
 ca, & zigia, id est, caprino alibi loquemur.

Aceris radix contusa iocineris doloribus vtilissimè imponitur.

A C H I L L E A, quibusdam Achillea fideritis, dodrantes aut maiores gerit scapos, ἀχιλλία
mille-
feuille fusorū effigie, quasi minutulis foliis circūdatos, crebris in latere foliorū sectionibus, coriandri similitudine, subfuluo colore, odore multo nō insuavi, medicato & glutinoso. vmbella in cacumine rotūda, floribus candidis, purpureis, & aurū emulantibus. prouenit læto solo. Aeg. Consimilis est fideritidi Heracliæ, sed magis astringit, eoque fluidis affectibus conuenit.

A C I N O S, aut acanos à Græcis dicitur, tenui siccoque ramulo herba, ocimo similis odorata, sed hirsutior. qua coronæ factitantur. à nonnullis olitoribus colitur. Aegin. Menses & aluum pota sistit. illita ignemq; panos sacrum sanat. mediocriter astringit. ἀκινος

A C O N I T O N, aliqui pardalianches, alii ἀκόνιτον cammoron, alii thelyphonon, alii myothonon, alii theriophonon vocāt. folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta, caulē palmo altum. radix scorpionis caudam æmulatur, & alabastris modo splendet. Torpescunt, vt fama est, scorpiones admota radice, stupentq;. qui rursus hellebori contactu, excitantur. oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adiicitur. enecat pantheras, sues, lupos & feras omnes in

luparia carnibus obiectum. Est & alterum aconitum, quod aliqui cynoctonon, alii lycoctonon appellant. Huius genera sunt tria. vnum, quo vtuntur venatores: alia duo in vsum suum vertere medici. è quibus tertium, quod Ponticum nominatur, plurimum in Italia, montibus Iustinis exilit, à priore distas, quoniam folia faciat effigie platani, crebriore diuisura, longiora, & multò nigriora: caulem filicis, læuem stylum, cubitali altitudine, aut ampliorem. semen in filiquis oblongis recondit, radices in modum squillæ marine circumrorum nigrescunt. Quibus ad venationem luporum vtuntur insertæ siquidem crudis carnibus, & deuorate, lupos enecant. Aegineta. Aconitum, pardalianches exedentem lethalemque vim habet, quàm ob causam intro non assumitur: extrinsecus tamen in carnibus quas exedi oporteat, vti licet. Lycoctonon similes vires sortitū priuatim lupos, vt illud pantheras enecat.

ἀκρόπος.

Flamme
batarde,
ou glai-
eul de ri-
uiere ou
de mar-
res.

ACORVM folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum sed obliquum actas, & summo cespite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu actes, odore non ingratas. Optimum est densum, candidum, plenum carie, non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod aspletion dicunt, Aegineta. Calefacit, siccat 3. Radice ad

ciendam vrinam lienemque induratum vti-
mur. Corneæ oculorum membranæ crassi-
tatem extenuat.

ACUTASPINA, quàm pirinam aut pi- ὀξύακιν
tyanthen aliqui vocant. arbor est pyastro si- θα.
milis, spinosa valde & minor. baccas profert berberis
myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nu- offi. spi-
cleum: radicem multifidam, altè descenden- niuine-
tem. Aegineta. Viribus quoque pyro sylue- tū rura.
stri æqualis est. habet & subtile quippiam
coniunctum. Fructus ipſius myrti baccis re-
spondet.

ADIA NT ON, polytrichon, pusilla ge- ἀδίαντ
rit folia similia coriandri, in summo incisur- τον.
ris diuisa. cauliculi, quibus exoriuntur, nigro capillus
colore nitēt prætenues, palmum alti: radice. veneris,
superuacua: neq; caulem, neq; fructum, neq;
florem profert. Seritur gratia vtilitatis peco-
rum, circa ouilia. Vmbrosis, & palustribus,
circa parietum aspergines, & fontium specus
enascitur. Aeg. Siccatur, extenuatur, modicè discu-
tit. Calore ac frigiditate medium est. Alope-
ciis medetur, tumores digerit, calculos potu
cōfringit, reiectiones pulmonis deficcatur, alui
profluuium sistit.

ÆGILOPS herbula folia tritici habens ἄγριλος
sed molliora, in summo capite semina bina Αυτὸ ou
ternave rubra, quibus aristæ quasi capilla- Coguio-
cæ exeunt. Aegin. Discutit, indurescentibus λε.
inflammationibus, & ægilopi, quæ oculo-

rum fistula est, opitulatur.

AETHIOPIA folia habet verbasco similia, perquam hirsuta densaque, in orbem circa radicem imā redacta caulem quadrangulum, scabrum, similem apiastro, aut arctio, multis cōcauum alis: semen crui magnitudine, geminum, in vno conceptaculo: radices ab eodem cespite numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ siccae nigrescunt duranturque, vt cornua possint videri. plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Messenia. Aeg. Radicis decoctum potu datur ischiadicis, pleuriticis, & sanguine excreantibus. item faucium asperitates cum melle lenit.

ἄγχιλλο

χον.

Indicū lignū Pau
lo, offic.
lignum
aloes,

AGALLOCHVM, lignum est quod ex India atque Arabia deportatur, thuiæ ligno simile, maculatum, odoratum, gustu astringens, cum quadam amaritudine, cute verius quam cortice vestitur, aliquantulum versicolore. Aegineta. Mansum animæ suauitatem commendat. in suffitum adhibetur. Radix eius pota denarii pondere languidum ex humore ventriculum resolutumque confirmat. Iocinorosis, dysentericis, pleuriticisq; opitulatur.

ἄγχιλλο

αγανικ

AGARICVM radix fertur laserptii similis, sed facie summa solutior, & rariore fungosq; tota cōtextū. Duo eius genera. scemina, quæ præfertur, rectis intus venarū discursibus constat. mas rotundus est, & vndique

compactior. Vtrique gustus in initio dulcis, mox in amaritudinē transit. gignitur in Sarmatiæ regione, quæ Agaria dicitur. Sunt qui radicem esse plantæ affirmant. alii vt fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine, gignitur in Galatia Asiæ, & Cilicia, in cedris, sed friabile & infirmū. Ac. Mixta est aërea terrestrique substantia. Vis eius est digerere, & crassos humores incidere. Viscerū maxime obstructions purgando tollit.

AGERATON fruticosa herba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, origano maximè similis. umbellam gerit in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniā diutissimè flos in sua coloris specie cōseruetur. Vis decocti feruens. huius vsu, nidor urinam cit, & vuluę duritias emollit. Acg. Digerit, & inflammationes modicè arcet.

AIVGA herba in terra repens, incurua similis folijs serperuiui minoris, multo tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circumramos densis, odore pinus, flore tenui, luteo, vel candido: radicibus cichorij. Alterum est genus aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, pretenuibus, coma supra dictæ: flore candido: semine nigro. hæc etiā pinum redolet. Tertia mas nominatur, parua, foliis exilibus, albis scabris: caule aspero, cādido: luteis floribus, semine iuxta alas.

ἀγνέρτων

χαμαίτις

τις

Iua seu

Iba offi.

& herb.

muscha-

ta.

Resipit & hæc pinum. Hæc duæ vim superio-
ris obtinent, sed non vsqueadco efficacem.
Aegineta. Calid. 2. sic. 3. Purgat & abstergit
viscera potissimū iecur. vrinas mensesq; tra-
hit. magna vulnera conglutinat. Putredinē
expertis medetur, duritias discutit. decoctū
ipsum etiā coxendicū doloribus salutare est.

ἀλκαία.

A L C E A sylvestrium maluarū generi assi-
gnatur. folia habens diuisa, verbenacæ proxi-
ma: caules treis aut quatuor, cortice cannabi-
no vestitos: florem rosæ, parvū: radices albas,
latas quinq; aut sex, cum plurimum cubita-
les. quæ cum vino aut aqua potē, dysentericis
ruptisq; medentur. Eadem sunt apud Aegi-
netam, nisi quod pro ῥήξας, id est rupta, legi-
tur δήξας, id est erosiones.

ἀλεκτορό-
λοφος.
Oruale
ou toute
bonne.

A L E C T O R O L O P H O S folia habet
similia cristæ gallinacæ, caulem tenuem, &
semen nigrū in siliquis. Solidum semen in o-
culum coniicitur, nec turbat, sed in se caligi-
nem contrahit. Mutat enim colorem, ex ni-
gro albicare incipit, & in tumescit ac exit.

ἄλισμα.
fistula pa-
storis &
plātogo
aquatic⁹.

A L I S M A, alii damasonion, appellant, fo-
lia ei plātaginis, nisi angustiora essent, lacini-
osa, cōuexaq; in terrā; caule simpliciter tenui
cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui,
candido, pallefcēte: radicibus, tenuibus, vt ve-
ratri nigri, acribus, odoratis, modicē pingui-
bus, aquosos amat tractus. Aeg. Absterforiā
quādam vim obtinet, qua calculos conterit,

& per vrinas educit in ventre contenta.

ALYPON furculosa herba est, subrubra: *ἄλυπον*.
 gracilibus ramulis: tenuib⁹ foliis: flore mol- Paulo
 li, læui, & copioso: radice, betæ, tenui, refer- alypias
 ta acri succo: semine epithymi. gignitur in actuario
 maritimis, maxime Libyæ, quàm largissima. turbet al
 quanquã alibi quoq; plurima prouenit. Aeg. bum.
 Eius semen bilem atram purgat pari epithy-
 mo mensura sumptum cum sale & aceto: ve-
 runtamen intestina leniter exulcerat.

ALYSSON fruticosa herbula est, vnicau *ἄλυσσον*.
 lis, subaspera, rotundis foliis: fructu dupliciũ rubia mi
 scutorum effigie, in quo est semen, quadam- nor offi.
 tenus latum. in mōtib⁹ & asperis locis emi-
 cat. Aegi. Quod à cane rabido morsos libe-
 ret, sic appellatum est. siccatur, discutitur, abster-
 git, renũ meatus aperit: ephelidẽ, quẽ aspera
 discolorq; cutis est, extertit.

ALLIUM quoddam satium atq; hortẽ *σκόρδα*
 fium habetur. quod in Aegypto, singulari, vt *δον*.
 porrum, capite constat: dulce, in purpureum Ail.
 vergens paruum. reliqua verò magna & can-
 dida, ex pluribus coagmentantur nucleis,
 quos aglitas, id est spicas, Græci nominant.
 aliud est syluestre, quod ophio scorodon, id
 est anguinum, vocant. Aeg. Calefacit, siccatur.
 4. Syluestre, domestico valentius est.

ALNUS arbor est sterilis, caudice recto, li *κλήθεα*.
 gno medullaq; molli, adeò vt graciliores Aulne.

virgæ concauentur. folio pyri, sed ampliore ac neruosiore, quadamtenus orbiculato virgatoque. Cortice squaroso, foris albicante, intus rufo, quæ de causa coria tingit. fructu nullo, cū nihilominus floreat. Radice summa, nec quàm laurus maiore, tenui. in plana descendit, aquosisque gaudet, quanquam ancipitem agat vitam. Infœlix habetur ceu scopis tantum nata: verum ad naualia quoque materies eius commédatur. Non potest extra terram paulum tēpus edurare, sed in humore obruta permanet ad diuturnitatem. Suppurationes folia discutere tradunt.

αλός.

perro-
quet & sc
peruiū
marinū

A L O E S folium scillæ similitudinem habet, crassum, pingue, modicè latum, rotundum, retrorsus pandum, folia vtrinque genit ex obliquo spinosa, rariusculè striata, breuia & curta. caulis emittitur nō dissimilis anthericus: flos albus: fructus hastulæ regiæ cognatus. graui tota est odore, & gustu amariss. radice vna, ceu palo, in terram depacta. Plurima præpinguisque in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nascitur etiā in Asia & Arabia, in locis quibusdā maritimis: & in insulis, vt in Andro. non valdè succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanè quàm utilis si detrita illinatur. Duo succi genera. quoddam arenosum, quod sedimentum purissimè esse videtur. alterum ad iocionoris imaginē vergit. Eligi debet boni odo-

Caballi-
nū offic.
succotri-
num.

ris, sincera, quæ nihil doli sensit, nitida, calculorum expers, rufi coloris, friabilis, ac iocinoris modò coacta, facile liquefcens, eximie amaritudinis. improbatur nigra & fractu contumax. Gummi eam adulterant. quod deprehenditur gustu, amaritudine, & valido odore: eoq; argumento, quòd digitis friata non ad minima vsque frustra resoluitur. Nec desunt qui acaciam immisceant. Aeg. Cal. I. sic. 3. Stomacho utilis est. abstergit, discutit. Ventris excrementa subducit. Lota quidem detergit minus, sed magis stomacho cõfert, & inflammationem prohibet, vlceribus cicatricẽ inducit, præsertim sedem & naturalia instantibus.

A LOPECVROS specie tota similis est ἀλοπίνο-
tritico, verum folio latiore. spica plantaginis ^{eos}
hirsuta, molli, lanugine densa, nullis acerib⁹ frumētū
aut aristis armata, nõ dissimili vulpium cau- caudatū
dis, ynde ei nomen. Radix est articulata, ex
cuius nodis emicant folia pinnata.

ALSINEN, aliqui anthyllion, nonnulli ἀλσίνη.
myosota vocant, quoniam musculorum au- μουρον.
res folia imitantur. Lucis opacisq; gaudet,
vnde alsine dicta est. Hæc erat eadem quæ
helxine, nisi humilior esset, & folijs longio-
ribus, nec hirsuta. cum teritur, odorem cucu-
mis reddit. Aeg. Refrigerat & humectat vt
helxine, ad feruentes inflammationes utilis.

ALTHAEA, quam alij ibiscum vocant,

ἀλθαία. in syluestrium maluarum genere est, cui fo-
 Mauluc lia ut cyclamino, rotunda, lanugine canescunt:
 fauluc flore rosaceo: bicubitali caule: radice lenta,
 offic. bis. intus alba Althæa appellatur, quod inter pri-
 malua, mas sit utilis, & pluribus polleat remediis.
 vulgo Aeg. Discutit, laxat, inflammationē abigit,
 maluaui lenit, phymata concoquit. Radix & semē re-
 sce & gui liqua sanē intēsa habent, & vitilignes quoq;
 maulues. abstergūt. Præerea semen calculos cōfringit.

ἄμβρο-
 σία. A M B R O S I A tenuis frutex est, ramosus,
 trium ferē palmorum: foliis rutæ, circa imū
 caulem exiguis. cauliculi seminibus, perinde
 quasi racemulis grauidi, qui nunquam florē
 pariūt, odore vinoso, suauī, radice tenui, fes-
 quipedali. Coronātur ea Cappadoces. Aeg.
 rum est Vis eius reprimere ac repellere, & illitu ad-
 polemo- stringere humores, qui in aliquam partem
 niū non incumbunt.
 ambro-
 fia.

ἄμμι-
 offi. am-
 mecos. A M M I, Aethiopicum cuminum appel-
 lant. Plerique hoc natura diuersum esse ab il-
 lo existimant. Vulgò notum est: semen exile
 multo minus cumino, organū resipiens. Eli-
 gendum est purū, minimē surfurosum. Aegi-
 neta, Calefacit, siccāt 3. Particulas habet te-
 nues, discutit, vrinam mouet, præcipuē semē.

ἄμμωνί-
 ακον Gumme
 ammo- cum
 niac. radice agassilim vocant. Probatum bene
 coloratum, ligni & calculorum expers, thu-
 ris similitudine, minutis glebis, densum, sin-

cerū, nulla sorde spurcatum, castoreū odore imitās, gustu amarū. hoc genus thrausma, id est, friaturā appellant: quod verò terrā & calculos collegit, phryama. gignitur in aphyrica iuxta Ammonis oraculum, succum, stillante ferulacea arbore. Aeg. Adco mollit vt scitros & tophos discutiat.

AMOMVM, exigue fruticat, ex ligno se cōuoluēs in racemi modū: flore, seu cādidę violę, paruo: foliis vitis albę similibus. Laudatur q̄ maximē Armeniacū, fuluo auri colore, ligno subrufo, valde odorato. Medicū, quoniā in cāpestribus & aquosis enascitur, infirmius esse constat. Est autē magnū, subuiride, tactu tenerū frutice venoso, odore origani. Ponticū verò subrufum, parū, fragile, racemosū, fructu turgēs, & odore nares feriēs. Deligito recēs, candidū vel subrubrū, quod nec astrictū cohereat, nec cōuoluatur: sed solutū diffundatur, seminis plenū, vis paruis simile, graue, odoratū, modò caricē non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore nō euariātē. Adulteratur herba amomo simili, quę amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem quę ab vna radice integros surculos emittunt. Aeg. Acoro virtute respondet, minus eo tamē siccatur, ampliūque maturat.

ἀμωμον
non est
offic. pes
colūbin⁹

ἀμπέλο- **A M P E L O P R A S Y M** stomacho magis
 πρᾶσον. aduersatur. & plus porro exalfacit. urinā &
 porreau, menses vehementius ciet. id contra serpentiiū
 ouail sau morsus esse conuenit. Aeg. Porrum hoc syl-
 uage, uestre acerrimum calidissimumque est, exul-
 aux vi- cerat, incidit, viscerum meatus recludit, sto-
 gnes macho inimicum.

ἀμύγδα- **A M Y G D A L A** quæ quidem amara sunt
 λα extenuant, viscosos crassosque humores al-
 Amādes. tius herentes meatus recludendo educunt, tū
 in cutem erumpentes abstergunt. Arbor can-
 dem vim repræsentat. At dulcia amygdala
 moderato calore donata sunt. Aeg.

ἀνακάρ- **A N A C A R D I Y M** recentiori Græciæ,
 διογ. nam vetus non meminit huius, arbor est In-
 Anacar- dis familiaris. prouenit quoq; in Siciliæ mon-
 di offici. tibus, qui flammæ ignis eructant, fructu auī
 culæ corculo non dissimili, vnde nomen pu-
 tatur inditum: rubente intus cruore, quo ve-
 luti sanguine scatet. Calidum. sic. 3. Me-
 moriæ iacturam refarcit. Labantes sensus re-
 fricat. Mentem exacuit. morbis cerebri, quos
 frigida vel humida causa attulerit, opitula-
 tur. Neruorum resolutioni auxilio est. Sani-
 es quæ in fructu condita manet, verrucas de-
 let, cæterū cutē exulcerat. Scabiem vsu creat.
 Iuuenibus & biliosis ob caloris vim eo in-
 terdicatur.

ἀνάγαλ- **D U O A N A G A L L I D I S** genera, quæ tā-
 λισ tum flore distant. nam quæ cæruleo flore est,
 foemina

fœmina dicitur: mas, quę phœnicęo. frutices Morgeli
sunt parui, in terra iacētes, folijs in quadran- ne non
gulo caule pusillis, subrotundis, ad helxing mouron
folia accedentibus: semine rotundo. Aegin. ou paue-
Vtraq; vim habet abundē abstergentē, subca rine.
lidam & attractricem nonnullam, vt etiam
aculeos euellat. Succus naribus instillatus ca
put purgat.

A N A G Y R I S, frutex est arboris instar, ἀνάγυρις
grauis odore: folijs agni, virgisque: flore boispuāt
brassicæ. semen in corniculis non breuibz
gignit, subrotundum, firmum, versicolori
facie, simile renibus, quod durefcit vna ma-
turefcēte. Aegineta, Acris est, calefacit, di-
scutit. Semen tenuiorum partium, & vomitui
ciendo est.

A N C H Y S A, quę alio nomine calyx, aut
onoclia appellatur, folia habet lactuicę in a-
cumē fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, mul-
ta, quoquouersum humi, spinis horrida: ra-
dici crassitudo digitalis. quę æstate prouenit
manus inficit sanguineo colore. læto solo na-
scitur. Est & altera, quam aliqui alcibiadion,
aut onochiles appellarunt. hæc à priore di-
stat, quod minora habeat folia, sed simili
modo aspera: ramulos exiles: florem purpu-
reum in puniceum vergentem: radices ru-
bras, oblongas, quę mēsisibus sanguineum
succum fundunt. in sabulosis nascitur. Est &
alia huic haud dissimilis, semine puniceo,
b

ἀγχύρα
Orcha-
nette.

minore. Aegineta, Onocleæ radix astringendi vim habet, & quiddam subamarum, ad lienis renumque dolores efficax. Cum polenta illita erysipelatis succurrit. Folia radice minus refrigerant desiccantque, ad alui profluvium bibuntur. Onochelos seu alcibiadios medicatior quodammodo, viperarum moribus succurrit in cibo potuque, & alligata. Tertia reliquis brevior sine nomine fere, amarior alcibiadio. Latis alui lumbricis instar acetabuli pota benefacit.

A N C H Y S A lycopsis alio loco sequetur.

ἀνδρῶσα-
σις.

A N D R O S A C E S herba est amara, tenues spargens iuncos, sine foliis, folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. gignitur in Syriæ maritimis. Aegineta. Amara & acris est, discutit, siccatur. Vrinam potu promouet vel herba, vel ipsius fructus.

ἀνδρῶσα
μον.

A N D R O S A E M O N ab hyperico, ascyroque differt, quod fruticet ramulis surculosis, ac tenuibus: rubentibus virgis: & foliis rutilantibus, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita vinoso succo manant. compluribus alas habet in cacumine, utrinque expansas, pinnatasque: circa quas, flores pusilli, lutei: & in calyculis semine papaueris nigri, insignis lineis. Aeg. Androsæmon genus alterum ascyron, vel ascyroides nominatur specie hyperici, al

terum dionysias. fructus ipsorum purgat, folia autem magis desiccant.

Duo ANEMONES genera, vnum sylvestre, alterum in cultis nascens. Cuius multæ species. vna phœniceum florem profert: altera candicantem, aut lacteum, aut purpureum. harum folia coriandro similia, tenuioribus propè terram diuisuris, caules lanuginosi, tenues, in quibus flores, vt papaueris, & in medio capitula nigra, aut cærulea: radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grandescit, fermèque geniculis quibusdam cingitur. Sylvestri amplitudo prorsus maior, latioraque folia, & duriora: oblongius caput: flore puniceo, tenuibus, & multis radicum capillamentis. Acrior est quæ nigra habet folia. Sunt qui errore ducti, argemonen nominari eupatorium putet: quoniam à sylvestri anemone, argemonen & papauer quod rhœada appellant, de quo inter papaueris genera referemus, propter colorum cognitionem in floribus, distinguere non possunt. verum papauer & argemone colore minus saturato spectantur, & vtraque tardius floret. quinetiam argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: rhœas verò candidiorem & acrem. insuper anemone & rhœadi capitula sylvestris papaueris similia insunt. sed in anemone supernè crassiusculū, in rhœade subangustius. Anemones ge

ἀνέμων
herbe au
vent. eius
flores, co
cles & co
quelour-
des.

nera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. in aruis illa sæpius enascuntur. Aegineta, Anemonæ omnes vim habent acrem absterforiamq; , extrahunt, ora vasorum recludunt, pituitam per hos purgant, lepras tollunt appositu, & lactis faciunt vbertatem.

Passe.
fleur.

Anemone, apud Theophrastum, flos coronarius syluestrium bulborum, post Narcissum vere exit.

ανθον.
Anct.

ANETHVM calefacit & exiccat in secundo ordine intenso, siccatur paulo remissius, qd in oleo excoctum digerit, dolorem sopit, somnum conciliat, & crudos tumores maturat. Vstum tertij calefacientium siccantiumq; ordinis efficitur, humentibus vlceribus vtiliter illinitur. Viride quoniā humidius minusq; calidum est, non ita maturat.

ανισον.
Anis.

ANISMM melius semper recens, plenu, non fursurosum, odore præstans. inter prima laudatum est Creticum, proximo loco Aegyptium. Aegineta, Eius semē acrius est. Cal. sic. 3. hinc & urinam mouet, & flatu discutit.

ανων.
Arreste
beuf, ou
bugrauc
& bugrade.

ANONIS, quam aliqui ononida appellant, ramos habet fruticosos, dodrante maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauissalarum multis, capitibus rotundis, foliis lenticulæ, pusillis, ad rutæ aut pratensis loti folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non

iniucundè olentibus. Muria conditur, antè quàm spinosa fiat. cibus gratissima. rami acutioribus spinis, & veluti spiculis firmioribus horrent. radicem mittit candidam. quæ ex-calfacit, & extenuat. Aeg. Succus cum vino potus urinam ducit, calculos cõterit, crustas rumpit, & dentes mitigat.

ANTHEMIDIS genera tria, tantũ flore distantia: rami dodrantes, fruticosi, alis multis concavi: tenuibus foliolis, parvis, numeroſis: rotũdis capitulis: floribus in medio aureis, forinsecus orbiculato ambitu candidis, melius, aut purpureis, magnitudine foliorum rute. nascitur in asperis, & iuxta semitas. Colligitur vere. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. hanc propriè heranthemon vocant. Ea cui leucanthemo nomen est, item quæ chrysanthemon dicitur, vehemētius urinã ciunt. Aegineta, Calefacit siccatque in primo ordine. Virtute tenui, discussoria, laxanti, & odorata constat.

ἀνθεμίδις
Nielle.

ANTHYLLIS duplex est. quædã enim lentis simillima, foliis mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine: radice parua, tenui. Nascitur in salis terris, & à sole illustratis, non insulso gustu. Altera est foliis ramulisq; auggæ similis, hirsutioribus tamen, brevioribus & asperioribus: flore purpureo, odoris ad-

ἀνθυλλίς
Salsola &
sel alkali

b iij



modum grauis: radice cichorii. Aeg. Vtraq;
ulcera perficcat. Quę vcrò chamępityi respō
det, tenuior est, comitialibus competit, effi-
caciū abstergit.

ἀντίρρι-
νον

Oil de
chat ou
moron
violet.

ANTIRRHINON; alii anarrhinon vo-
cant, herbam caule & foliis anagallidi simi-
lem: flore albę violę, purpureo. idēq; sylue
stris anagallis nominata est: semine vituli na-
rium simili. Aeg. Per similem Inguinarię siue
Asteri Attico vim obtinet, sed minus effica-
cem. itaque ex illo hoc quoque cognosces.

ἀπαρίνη.
Grateron
offi. asp-
gula, &
sucella.

APARINE ramis multis & paruis fru-
ticat, asperis, quadrangulis, per intervalla or-
biculato foliorum ambitu, vt in rubia. flos
albus: semen durum, rotundum, concavum,
album, vmbilici figura, asperitate vestiū te-
naci. Ea pastores coli vice vtuntur, ad eximē-
dos ē lacte pilos. Aeg. Hanc alii philanthro-
pon, alij omphalocarpon appellant, modicē
abstergit & desiccāt, aliquam partium tenui-
tatem habet.

ἀφάκη.
vesse faul
uage.

APHACA in aruis nascitur, altior lente,
tenuibus foliis. filiquas lenticula maiores fert,
in quibus terna quaternave semina nigra, lē-
te minora, continētur. Aeg. Lenticulę modo
astringit: sed manducata egrius cōcoquitur,
valentius siccāt, mediocriter calefacit.

μελισσό-
φυλλον.
Me lisse.

MELISSOPHYLLON siue melistena,
id est, apiastrum, id sibi nomen vsurpauit,
quoniam apes ipsa herba delectantur. cauli,

culi & folia balloræ, de qua paulo antè diximus, similia essent, nisi maiora, tenuioraq; nō sithoc nec ita hirsuta spectarentur. citreum malum apiastrū olent. Aeg. Viribus marrubio per omnia res- Ruellio spondet, sed multo infirmius est.

A P I O S iuncos duos siue tres spargit, *ἄπιος*, *ἰσχᾶς*, bros, tenues, qui à terra parum attolluntur: foliis rutæ, oblongioribus tamē, & angustioribus, herbaceis: semine paruo, radice hastulæ regiæ, in formā pyri turbinata, rotundiore tamen, succi fœcunda, intus habet corpus candidum, extrà cortices nigros. Superior pars eius vomitione bilem pituitasque extrahit, inferior per aluum. tota vtrinque purgationes mouet. (Aegineta. non meminit.)

Hortensis **A P I I** herba ad eadem ad quæ *σίλινον*. corianum conuenit. Aeg. Tanti caloris est ut *Perfil.* vrinas & menses eliciat. flatus discutit, præsertimque eius semen.

A P O C Y N O N, siue cynocrābe, brasica canina, frutex est paruis viticulis constans, male olentibus, lentis, vitiliūmque modo obsequiosis, fractu ferè inuictis: folio hederæ, molliore tamen, & per extremum acutiore, lento, grani odore. id luteo succo turgēt. Siliquæ, ceu fabarum, folliculari specie, digiti lōgitudine protēduntur: semine intus albo, duro, paruo. Folia cū adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pātheras enecāt

in cibo data, & protinus eorum coxendices
resoluunt. Aeg. Dicitur & cynomoron quod
celerrimè canes enecet, homini etiam vene-
nosa. Calida citra siccitatem est, vnde etiam
digerendi facultatem illita representat.

ὑοσκύαμος. HYOSCYAMVS, frutex est caules emittens
crassos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hir-
suta. flores è latere caulis, ordine prodeunt,
Apollina ris lat. of tãquam punicorum cytini, scutulis septi se-
fic. iusq. minum plenis, vt papaueris. Tres eius diffe-
me ou ha rentiæ: vna semine nigro, floribus penè pur-
nebane. pureis, smilacis foliis, cytinis præduris, & spi-
nosis. alterius semen subflauū, vt irionis: flo-
res lutei. folia, & filique simpliciores. ambo
insaniam gignunt & soporem, ideo in com-
muni vsu damnatur. tertium genus, vt quod
mitissimum esset, medici recepere, pingue,
lanuginosum, molle, candidi floris seminif-
que, in maritimis rudibusque nascēs, cuius
ocasio si non adsit, rursus usurpari oportet.
niget, vt deterrimus, improbatur. Aeg. Quo-
rum semen nigrum aut flauum est, venenosa
sunt. accommodatissimū verò curationibus
quod & semen & florem candidum habet ex
tertio refrigerantinm ordine.

APPENDIX spina Plinio dicitur, quo-
niã bacce in rutilo colore pendeant, appen-
dicēsque vocentur. Hæ crudæ, per se, & aridæ
in vino decoctæ aluū citant, & tormina com-
pescunt. (Pro citant melius legetur citam.)

ARABIS eadem quæ Draba.

πόμαρος

ARBUTVS siue vnedo arbor est coroneæ malo nõ dissimilis, tenui folio. cuius fructus pruni magnitudinẽ implet, nullo intus nucleo. huic memæcylo cognomen est. maturus aut flauet, aut rubescit. in esu acerosus. Aegineta. Stomacho aduersatur, capitisque dolorem mouet. acerbæ qualiratis est & arbor, & fructus.

Pomme de bochet ou de boys

ARTION, aliqui potius arcturon vocant, similis est verbasco foliis, nisi quod hirsutiora & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cumini, paruo. radice tenera, alba, dulcique Aeg. Vis eius est tenuis, siccans & mediocriter adstringens.

ἀρκύριον

Lappa

minor,

ARGEMONE in totum syluestri papaueri similis est. folia habet anemones, diuisa: Non est florem puniceum: caput in cauliculo papaueris rhæadis, oblongius, & summis partibus latum: radicem rotundam. succum croci colore, acré, dimittit. Argema & nubeculas expurgat. folia illitu inflammationes cõpescunt. Aeg. Abstergit simul & discutit.

ἀργεμόνη

Non est

agrimoi-

ne vulg.

ARISARVM exigua herbula est, cuius radix oleæ magnitudinem implet, longè maioris quàm aron acrimoniæ. Vnde illitu nomas sistit. fiunt colyria ex ea, ad fistulas efficaciaz. illitu radices, genitale animalis cuiuscunq; in perniciem agitur.

ἀρίσαρ

ρῶμ.

ἀριστολόχ

ARISTOLOCHIA nomen ex eo sibi

χίκα.

ficis vires refert. Galenus.

ARNABO (aliis carnabum vel carnabadium, item zarnabum vel zarnabadium) ex aromatis habetur, ob quod vnguentis potissimum temperatur. Calefacit, siccatur. 3. Casia & carpesio simile est. Vnde Possidonius, Vbi cinnamomi copia non datur, hoc vtendum esse censet.

ἀρνάβω.

ARTEMISIA magna ex parte in maritimis nascitur, absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus folijs, ramisque huius quidem genera duo. vnum latius habitiusque: folijs virgisque latioribus. alterum tenuius flore paruo, tenui, candido, graeuolente. æstate floret. Sunt qui in mediterraneis vnicaulis nomine appellent, tenuē herbulam, simplici caule & minuto, floribus scattente, flauo colore. hæc iucundiorē quā præcedens efflat odorem. Aegineta. Vtraque Cal. 2. sic. 1. Tenuis adeo substantiæ est vt renum calculos comminuat, & vteri fomentis rectè accommodetur.

ἀρτεμισία.

Armoise

ARON, apud Syros lupha vocitatum, folia emittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: caulem subpurpleum, dodrantalem, pistilli specie. à quo croceum semen exit radice dracunculi alba. quæ decocta estur, vtpote cū minus acris sit. Folia ad esum cōdiuntur. & arida per se, decocta manduntur. Radix, semen & folia,

ἀρον.

Pied de
veu ou
serpētai-
re petite.

tesque: folia tenuia: flores luteos, & fructum
resinosum, hyperico non absimile. cuius at-
ritu digiti ferè cruentantur, qua de causa an-
drosemum vocauere. Aegineta, Facultas eius
in androsæmo prædicta est.

6 ASPALATHVS, aliis erysiceptron, fru-
tex est surculosus, multis spinis horrens. na-
scitur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum
insula. quo ad vnguentorum spissamenta pi-
gmentarij vtuntur. Optimus est grauis, detra-
cto cortice rubens, aut in purpuram vergēs,
densus, odoratus, gustatu amarus. Est & alte-
rum genus candidum, lignosum, sine odore,
quod deterius habetur. Aegineta, Dissimili
constat virtute, acri & astringente, & vtraq;
siccante: iccirco & putredini, & fluxionibus
utilis est.

ῥοδι-
ον.
Rodium
lignū, ou
Rodoē
offic.

19 ALTILIS asparagus multis ramis fruti-
cat, foliis fœniculi, longis, numerosis: radice
rotunda, grandi, spongiam habente. Cor-
ruda siue syluestris asparagus vulgaris est no-
titia. Aegineta, Asparagus petræus aut mya-
canthinus abstergit vtrique, sed calore, & fri-
giditate medius est, renes & iecur obstructio-
nibus liberat, præsertimque radices & semen.
item dentium doloribus medetur.

ῥοδι-
ον.
offic. spa-
ragus, as-
pargo.

ASPHODELVS. Vide hastula regia.

ῥοδι-
ον.

ASPLENVN, aliqui scolopendrium vo-
cant, alij splenion, alij hemionium, foliis est
multis, scolopendreæ animalis similibus, ab ra-

Ceterah
ou citha-
rac, offi.

dice vna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisque filiceis, & opacis. caulem, nec florem, nec semen habet. folia filiculæ modo diuiduntur, subter flauescencia hirsuta-que, supernè viridia. Aegineta. Substantia quidem est tenui, nō tamen calidum, qua ratione calculos confringit, & lienes cōsumit.

ἀσπὴρ ἄτ-
τικὸς.
βενβώ-
νιον.

Aspergu-
la minor
aliquib⁹.

A S T E R Atticus cauliculus lignosus, florem in cacumine habēs purpureum luteum-ve, & in ambitu diuisum, anthemidis modo capitulum sed ea quæ caulem ambiunt folia stellæ modo radiata, oblōga, hirsuta. Aegin. Inguinalem vocant, quia bubonibus prodesse creditur, non tantum emplastri modo imposita, verum adalligata etiā. Mixtæ est virtutis, digerentis & refrigeratoriæ.

ἀστράγα-
λος.
Cices
faulua-
ges.

A S T R A G A L V S paruus à terra frutex, foliis & ramis ciceri similis: flore purpureo paruo, radice rotundas raphani modo grādi, quæ ad natas appēdices firmas habet. nigras, præduras, veluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. nascitur in ventosis, opacis, & in niualibus, eo Memphis Arce dia scatet. Radix ægrè propter duritiam tunditur. Agin. Non ignauiter desiccat, radices habet astringentes: vlcera vetusta ad cicatricem perducit: aluum fluētē radix in vino potassit.

ἀτρακτυ-
λίσ.

A T R A C T Y L I S, spina est cnico similis, folia multo lōgiora ferens in summis virgis,

magna parte nuda asperaque, qua foeminae Cartam^o pro fusis vtūtur. capitula in cacumine spinis sylvestris horrent. flos luteus: quibusdam in locis pur- offic.
pureus inuenitur. radix tenuis, superuacua.
Agineta. Vocatur & cnicum sylvestre, vi sic-
cante & mediocriter calida.

ΑΤΡΙΠΛΙCΕΜ aliqui chrysolacha. *ἄλφα-
φισ.*
non vocant. cognitum olus est. Duo eius ge- Atroche
nera, sylvestre, & satium. coctum estur vt o.
lus. Aeg. Hum. 2. fri. 1. Ventrē mollit, semen
ipsius vi pollet absterforia, vnde ictericis ex
itecinoris obstructione accommodatum est.
(De Chrysolachano vide infra.

ΑΥΕΝΑ genicula quædam habet. folio *βρωμος.*
& stipula triticum imitatur. & in cacumini- Auoyne.
bus dependentes paruulas veluti locustas bi-
pedes gerit, in quibus semen cōtinetur. Aeg.
Similem hordeo obtinet facultatem. Siccatur
& modicè citra corrosione discutit. astringio-
nis quoq; cuiusdam compos est, vnde & alui
profluuiis subuenit.

ΜΥΡΙC auricula, quā myosotida vocāt, *μυρίστρα*
herba est caulibus pluribus ab vna radice, a-
liquatenus ab imo rubētibus, & concavis: fo-
liis angustis, oblongis, dorso acuto, elato, ni-
gricātibus, per interualla assidue geminatis,
atq; in mucronem desinentibus, & tenuibus
cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flo-
re, vt anagallidis, cœruleo: radix digitali
crassitudine, multis capillamentis fibrata.

Vt vult
ruellius

Radix illita ægilopía sanat. Sūt qui alfinen,
muris auriculam vocitent. (Aeginera: nō re-
recenset aliam quàm alfinen suprà dictam.

B

βίηχα-
sis.

Gans de
nostre
dame.

B

ACCHARIS herba frutico-
sa, quæ in coronas additur. cu-
ius folia aspera sūt, media vio-

læ & verbasci magnitudine: caulis angulo-
sus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum
asper, nō sine appendicib⁹ adnatis: flore pur-
pureo, subalbicante, odorato: radicibus vera-
tro nigro similibus quib⁹ odor inest cinna-
momo proximus. Asperū squalidumq; solū
amat. Aegin. Herba est acris. radices decoctū
meatus obstructos aperit, urinā & menses ci-
tat. folia ipsius cum sint astringentia fluxio-
nibus opitulantur.

βαλάν-
σιον.

Des ba-
laustres

BALAVSTIVM sylvestris punici flos
est, cytino similis. Cuius cōplura genera re-
periuntur, candidum, fuluū, colore rosaceo-
succus ex eo exprimitur, hypocistidis mo-
do, cui adstrictoria vis inest, eadem faciens
quæ hypocistis, & cytinus. Aeg. Valde astrin-
git, sicca & frigida facultate præditum. Sum-
mæ cutis vlcera ad cicatricē perducit, & de-
stillationes cohibet.

βαλλάν-
ιον.
Bublaete
offic.

BALLOTEN, nomine alio nigrū mar-
rubium vocant, caules edit quadrangulos,
nigros, subhirsutos, complures ex vna radi-
ce: foliis maioribus quàm marrubij hispidis,
intercedente spatio, subrotūdis, graue olen-

tibus, apiastro p̄ximis, vnde aliqui apiastrū marrubi-
eam vocauerunt. candidi flores vniuersi ver- astrū ou
ticillato ambitu caulē coronāt. Aeg. Acris est nigrum
& absterforiæ facultatis, imposita cū sale ra- marru-
bidi canis morfibus medetur. bium

BALSAMVM, arbor albę violę, licij, si-
ue pyracanthę magnitudine cōspicitur. Fo- βάλσα-
liū tute proximū, longē candidius, perpetuō μον.
virens: in Iudęa solū quadam valle & Aegy- Balsme
pro nascens, his differēs modis, scabritia, p-
ceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & ca-
pillacea coma est, theristum vocāt, quasi de-
messile. fortassis quoniā ob gracilitatē facile
demetatur. Aestiūis sub ortu Canis ardorib.
arbos vnguibus ferreis inciditur, magnāq; ē
plaga succus, quem opobalsamū vocant: sed
tam exiguo stillatu, vt annis singulis, ne plu-
res quidē quā sen septē mve congi cogan-
tur, inibiq; pondus duplo repēditur argēto.
Succi probatio est, vt sit recēs, validi odoris,
sincerus: non ad acorē vergens, dilui facilis,
læuis, astringens, ac modicē mordens gustu.
Sed variē vitiatu, misto ab aliquibus terebin-
thi, cypri, lentisci, balani vnguento: item su-
fino, metopio, melle, aut Cypria cera liqui-
da. quod maleficiū facilē deprehenditur.
Namq; merus in lancam vestem fusus, neq;
maculā facit, neq; si eluatur notā relinquit;
vitiatu autem inhæret. & lac instillatus coa-
gulat, quod adulteratus non efficit. Quine-

tiam sincerus in aqua aut lacte celerrimè liquatur, coloréque lactescit: vitiatuſ verò olei modo innatat, se conuoluens, aut in stellæ modum diffundens. Sincerus senescens crassescit, deteriorque redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum pessum ire, & ad ima sedere arbitrantur, postea dissipatum supernatant. E ligni genere, quod xylobasamū vocant, probatur recēs, sarmēto tenui, fuluum, odoratum, quadam tenus opobalsamum spirans. Necessarius etiā seminis erumpit vsus. quare eligatur flauum, plenum, grande, ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modicè opobalsamū olens. Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra oppido deferitur. Sed coarguit magnitudine, inanitate, virium ignauia, sapore piperis. Aeg. Balsami, quod veluti lignum est ficcat & cal. 2. Subtilem habet substantiam. liquor autem multo tenuior est: fructus proximè hunc virtute accedit, sed minus tenuis est.

τρακωγόνον.

Herbarij
ab hac a-
liā osten-
dūt, nō si
ne errore

βόλ-
λίον.

B A R B V L A hirci, quæ ab aliis comecatur, brevis est caule: foliis croci: radice longa, dulci supina: magno super caulem calyce, è cuius summo semen nigrum dependet, vnde nomen inditum est. herba esui apta est. (Aegineta nō memorat.) Vide plura in Tra-
gopogone.

B O R L L I V M alij bolchon appellāt, alij madercon lachryma est saracenica arboris,

Probaturn gustu amarū,translucidum,taurini glutinis in morē.intus pingue,liquefcēs facile,ligni ac sordis expers suffitu odoratū, vngui simile. Est etiamnū bdellij genus sordidum,nigrū,vberiorib. glebulis in offas cōuolutum,aspalathi odōre,ex india aduectū.defertur etiam à Petra oppido siccū, resinofum liuescens, sed facultate secūdum. Adulteratur gummi, sed ita vitiatū non perinde gustui amaritudinē representat, nec vsq; ad eō suffitionibus odoratū. Aeg. Tum Scythicū, tum Arabicū scirros emollit, præsertimq; recentia. Arabicum verò vrine ciendæ est, calculos comminuit, maturátque.

BELLIS, qui & bellius dicitur, flos est pratensis, pastilicātibus quinquagenis quinis barbulis coronatus. Plinius.

BETA duorū generū est. è quibus nigra coquitur cū lenticula, vt ventrem sistat. quod magis radice eius præstatur. cādida aluo vtilis est, vtraq; tamen propter nitrosum humorem, quem habet in se noxii succi est. Aegin, Nitrosam vim habet, qua abstergit, discutit, per nares purgat. Alba clixa plenius, in flāmā tioni arcēdæ fit idonea, modicūmq; discutit.

CESTRON psychotrophon vocitatur, quoniam frigidis locus inueniatur. Latini betonicam appellant. herba est caulem ferens tenuem, cubiti altitudine, aut maiorem, quæ dratū: folia quercus mollia, longa, in ambitu

β'ηλε
Marguerites

πιτ'λον
Bette ou
iotte ou
porce

βιτονικη
Betōgne
ou be-
toine

diuisa, odorata, prope radicem maiora, in summis caulibus, semen veluti satureiæ spicatum inest. Aegin. Betonica herba est ramulis exilibus, pulegio similibus: sed tenuioribus, & propemodum si gustes, nullam qualitatem referentibus. Nascitur potissimum locis petrosiss, qua & in renum medicinis vtuntur. Est autem apud Romanos alia quædam betonica dicta, quam Dioscorides nominat cestron, alij verò psychotrophon, eò quod frigidis locis gaudeat, nihil simile cum prædicta habet, præter actionem. Vrinam ciet, & aliis multis benefacit, potissimumq; radix ipsius cum hydromelite pota vomitionem mouet, folia aluum subducunt.

βουλεύς
Bouleau

B E T V L A Gallica est arbor, folio fagino, paulò angustiori, cortice versicolore, materie læui, non nisi ad baculos vtili, mirabili candore atq; tenuitate, terribilis magistratuū virgis, eadem circulis flexibilis: ite corbium sportis & ligaturis vtilis, scopisq; Bitumen ex ea Galli excoquunt. gaudet frigidis. Scutis item faciundis apta, quod plaga contrahit se protinus, clauditq; suum vulnus, & ob id contumacius transmittit ferrum. vsus eius inter medicos adhuc nullus est.

B L A T T A R I A adeò similis verbasco est, vt sæpe fallat pro ea capta, foliis minus cæcidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc abiecta blattas in se contrahit, ideoq; Rom.

blattariam vocant. Plin.

BLITVM estur oleris modo. aluo vtile est, nullius in medicina vsus. Aeg. Hum. frig. 2.

BOLETI fungorū generis sunt, reliquis minus nocentes, qualitatis expertes, si probè coquantur, secus periculi occasionē præbēt. Amanitę dicti secundum ab his ordinē obtinent. Aliis fungis abstinēdum, pleriq; siquidem ipsorum lætales. Aegineta.

BOTRYS fructicosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa. semen circa totos ramulos prouenit: folia cichorio similia. tota suauem odorem spirat; quare vestimentis interponitur. inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopnœas mulcet. Hæc Cappadoces ambrosiam vocant, alij artemisiam. (Idem apud Aeginetā, nec plura.)

BRASSICA quæ edendo est siccat, & māducata, & à foris imposita, nō tamen acré cōspiciuē vim ostendit, eoq; vulnēra glutinat, & dolosa malignaque vlcera, ac tumores solui contumaces persanat. habet & iam nō nihil absterforiū, quo lepras exterit. Semen ipsius potum lumbricos occidit, præsertim Aegyptiæ. Caulium crematorum cinis adurentē vi constat, cum adipe longis laterum doloribus vtilis. Aegineta.

Marina **BRASSICA** à fatiua prorsus abhorret, quòd folia ferat rotundæ aristolochiæ, prælonga, tenuia. singula à ramulis rubētibus

βλίτον
Blette ou
espinars
Potiron,
champi-
gnon

βότερυς
Du py-
men

κράμβη
Choulx

κράμβη
θαλασσία
Soldana
vulgo.

exerit, singulariter hedera, pediculo albo succo prædita est, sed paucò, falso gustu, & aliquantum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris vehementissime aluum ciet, in cibo cocta. coquitur propter acrimoniam cum pingui carne. Aeg. Sub-salsa leuiterque amara aluum soluit.

αράμβκη
ἀγρία,

Sylvestris **B R A S S I C A**, maritimis præ-niptisq; locis, magna ex parte gignitur: satiuæ similis, sed candidior, hirsutiorq; amara, cuius cyma in lixiuia cocta ori non insuauis. Folia illitu vulnera conglutinant, & inflammationes tumoresque discutunt. Aegin. Satiua in omnibus validior est, unde nec intra corpus citra noxam sumitur.

βοϊτάνη.

Quibus-
dā lapa-
thū acu-
tū, quibus-
dam bi-
storta

B R I T A N I C A aut vetonica, folia habet sylvestris lapathi: sed nigriora, & densiora, gustu adstringentia, radicē tenuem & breuē, caulem paruum emittit. Foliis exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Aeg. Astringit & conglutinat, succus ipsius putredines os infestantes persanat.

βούγλωρ
ος.

Bocache
ou lāgue
de beuf

B V G L O S S V M nascitur in caëstribus, & sabulosis. Iulio mense colligitur, verbasco simile est, foliū in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitans linguas. Aeg. In vinum deiectum, animi voluptates auget. Humidū calidūque temperamento est.

βουλάπα
θος.

B V L A P A T H V M à reliquis radicis tantā altitudine differt, efficacis erga dysentericos

effectus, si biberint ex vino.

oil de

BULBINA foliis est porraceis, flore violaceo purpureo, siue ferrugineo in spicis, nigro semine foris, rubicundo radice bulbo, intus candido, squamis carente. Bulbinas Digipphilus tradit meliorem bulbis creare succum, non tamen ita gratas utilisque stomacho, quod dulcescentem in se quadam crassitiem contineant.

beuf

βολβίνη

Buberi-

gima

Esculentus BULBUS vulgò cognitus, à nobis estur. stomacho & aluo utilis rufus, qui & ex Aphrica defertur. amarus verò & scillinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat.

βολβος

ιδώδι-

μος.

Eschalo-

te.

BULBUS quem vomitoriū vocant, folia habet lentiora multo & longiora quàm bulbis esculentis: radicem similem, cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctū eius potū, vesicæ malis medetur. vomitiones mouet. Aegineta. Multo calidiorem vim quàm esculentus representat.

βύλβος

εμετικός.

BUNIVM caulem emittit quadrangulum, (aliàs additur procerum, digiti crassitudine) & in eo foliosos ramulos, tenues, præ tenuibus foliolis & flosculis scatētes, longitudine digitali: folia propter radicem, apio similia, sed multo tenuiora, & quæ modo quodā folia tribuli (aliàs coriandri) imitentur: flores anethi: semē odoratū, minus hypocyamo. Alibi sic describitur, Pseudobunion

βουνιον.

herbeou

charpen-

tier.

palmi altitudine fruticat in Creta, folia ramulosq; napi ferēs, acri gustu. Aeg. Bunion, quod alij ἀρτίου appellāt, calidum est, vrinæ & mensibus educendis accommodatum. Huic respondetur & pseudobunium.

βούφθαλ-
μος.
Oil de
beuf ou
pisse en
liq̃.

B V P H T H A L M O N, quidam cachlam vocant, tenues emittit cauliculos, mollēsque. folia fœniculi: luteū florem, anthemide maiore, oculi similitudine, vnde nomen traxit. circa oppida nascitur, & in campestribus. Aegineta. Acriorem anthemide florē gerit, ideo & discutientem, adeo vt cerato mixtum duritias remolliat.

βλούπλι-
νον

B V P L E V R V M olus est. sponte nascēs, caule cubitali, foliis multis longisq;e, muscario anethi. Laudatur in cibis Hippocrati, & Nicandro in medicina. Semen cōtra serpētes valet, item radix in vino, ampliusq;e vrinæ ciundæ. folia ad secundas fœminarum vel succū ex vino linunt, & strumis cū sale & vino.

βούτο-
μος.
Iuncaca-
bas.

B V T O M V S frutex est palustris, caule, in offensissimō, peculiari quodam læuore, folio arundinis, angulari, fructu nigro, mali magnitudine, fidē proximum: sexu duplici, mas, fœcūdus: fœmina vitiliū ad nexus utilis, pars ab radice tenera manditur, puerorū cibo grata, vbiq;e ferē in paludibus nascitur, quanquā humore & terra gaudeat. in Orchemenico lacu plurimus. Democritus ei folia irinis p̃xima tribuit, ex vna radice nō singu-

latim, sed vt frutices scaturientia, quibus bo-
ues iucundè vescantur, vnde nomē ei datum.

B V S E L I N V M differt breuitate caulis à *Βουσίλι-*
fatiuo apio, & radicis colore rufo, peculiare *νον.*
contra serpentes potum & litum.

B V X V S arbor nota est, eius granum car *πύρος.*
thego vocant. Nullū in medicina vsum præ. *Βοιχ.*
bet: folio tantum cum materiei scobina, & li
xiuo capillum rufant.

C

A C A L I A, quę leontice vocatur, fo *κακαλία*
C lia fert magna, alba, è quib⁹ medi- *Carui*
us caulis emicat, rectus, albus, florē *sauiage*
ferens robori aut oleū similē. nascitur in mon-
tibus. Grana quę post excussum florem inna-
scuntur, trita & cum cerato illita faciem eru-
gant, & cutem extēdunt. Aeg. Viribus & vfu
cum cancano cōuenit. Cancani autem radix
modicē siccatur, & sine morfu illitionibus ac-
comodata, cum vino subacta linctāq; arte-
rię scabriciem iuuat.

C A C T V S est cinara, siue carduus altilis. *κάκτος.*

C A L A M V S odoratus in India nascitur, *artichaut*
melior est fuluus, dense geniculatus, & qui *κάλαμος*
assulose frangitur, plena arancorum fistula *ἀρωματι*
albicans, lentus in mandendo, & astringens, *κός.*
accum aliquanta acrimonia amarus. Aegini. *calamus*
Cal. sic. 2. inest ei quippiam subtile, & astrin *offic.*
gēs. Vrinam ciet. Stomachicis, tum quę vte-
rio & iocinori faciunt medicinis temperatur.

Ancho-
lic.

CALATHIANA munus autumnii,
violæ cætera veris. ea minuto est folio, violæ
albæ non est dissimili, in totum sine odore ca-
lathi similitudine, autumnno tantum proue-
niens, tanta coloris pulchritudine, ut cæru-
leum ipsum, quod imitatur, prouocet. in pra-
tis post æstatē emicat, autumnalem violam
nominant. Plin.

Percepi-
erre.

CALCIFRAGA empetrum est.

Soulcy.

CALTHA proxima calathianæ est cū
colori amplitudine, vincit numero foliorum
marinam quinq; folia non excedentem. Ea-
dem odore superatur, est enim grauis caltha
non leuior ei quam scopam regiam vocant,
quāquam folia eius oleant. Vergil. calthā lu-
teolo cecinit colore tinctam. nec Plin. ab eo
dissentit. Hinc & calthula, vestis gen^o dicitur.

καλαμίν
θη.

calamēt.

Poliot

sauluage

Offi. ne.

peta vul

go herbe

au chat.

Ex **CALAMINTHAE** generibus
quedā mōtibus familiaris, folia ocimi habēs
incana, furculos aridos, & caules angulosos,
purpureū florē. Altēra pulegio similis est, sed
maior, quā syluestre pulegium ideo appella-
rūt, q̄ odore ipsum æmuletur. nepetā Latini
vocatāt. Tertia méthastrea cognata est, foliis
oblongioribus, caule & ramis maioribus q̄
superioris, sed viribus inefficacior omniū fo-
lia gustu impensē feruentia & acria, radix su-
peruacua, nascitur in cāpestribus, asperis &
aquosis. Aeg. Cal. sic. 3. Tenuis & acris est, mé-
tha longē valentior. Siquidē est veluti sylue-

stis mētha. E profundo attrahit, sudores mouet, totum corpus digerit. Rigores febrium qui circuitu remeāt finit extrinsecus cū oleo infricata strenuē. Coxarum dolores soluit vitiosos humores in cutē erūpētes abstergit.

CANARIA humilis est herbula, foliis κύνροψ
tritici, multo minoribus, calamulo tenui, ge herbe au
niculis pyxidatim cohærentibus, articulado, chien.
internodiis modo tibiariū in se infarctis, quę
tracta suis ē vaginulis exerūtur, euanida spi-
cæ loco panicula, ita vt folio & culmo triti-
cū, cacumine arundinē æmuletur. Hanc in-
tulerunt canes qua fastidiū deducant, eamq;
in nostro cōspectu mandunt, sed ita, sicut est
Plinius author, vt nūquam intelligatur quę
sit: etenim depasta cernitur. Notata est ani-
malis huius malignitas in alia herba maior.
Percussus enim à serpente mederi quadam si-
bi dicitur, sed illam hominine inspectante
non decerpit.

CANCAMVM Arabici ligni lachry- κάρκα
ma est, myrrhę quodammodo similis, virosi μον
gustus, quam ad suffimenta vsurpant. Vestes
eo ex styrace & myrrha suffiūtur. Aeg. Odo-
ris est grati, vis eius obesos extenuare abster-
gere, & aperire obstructa.

CANABIS fatiua planta magni in vita κάννabis
vsus ad robustis. funes factitādos: foliis fra- Chanure
xini, graui odore caulib. proceris, inanib⁹, se-
mine rotūdo. Aeg. Semē flat⁹ discutit, adcoq;

siccet vt largiore cibo genituram extinguat. Succus ex ea recente, conuenienter aurium doloribus instillatur. Syuestris cannabis virgas fert althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio fatiua, nigriores & asperiores, flore lychnidis, subrubro: semine & radice althææ. decocta radix, illitu inflammationes mulcet, tumores discutit, tofos articularum dissipat. huius cortex torquendis funibus accommodatus.

CANOPON sambuci flos est.

herbe ou
couctu-
re.

CANTABRICA in Hispania inuenta est, per Diui Augusti tempora à Cantabris reperta. Nascitur vbiq; caule iunceo, pedali, in quo sunt flosculi oblongi velut calathi, in iis semen perquam minutum. Cantabriam Hispaniæ regionem hodie Biscaiam vocant. Eius radicis drachma in vini hemina sæpius bibenda contra serpentium morsus.

καφύρα
offi. cam-
phre.

CAPHURA arbor in India tanta magnitudine visitur, vt sub eius vmbra hominum centuriæ cõdi possint. Nascitur in montibus ini bi mari vicinis, materiæ leui, ferulacea, quæ gummi aut lachrymam fundit, eiusdem quo arbor nominis Ex hac caphurelæum fit quo verum mentiri balsamum audent. Caphuræ multa genera, vnum impurius in interueniis ligni modo lamellarum impactum figitur: aliud foras emergit, & arboris corticibus hæret, maculis inter initia rubentibus, postmo-

dum vel calore solis extoſtum, vel ignium vi candefcit, Riachinam indigenæ vocant. cæteris bonitate & tenuitate præſtat longiorq; durat tempore: nam & atra ei fuſca reperiuntur. Rudis eſt, nullam vim ignis experta, elaborata verò, quæ ignium ardore album contrahit colorem, in laminas pellucenſes diſta. Caphura frig. ſic. 3. Capitis ex calore dolores, & incandefcentes inflammationes reſtinguit, præſertim quæ iccur male habeant. Renes & ſeminaria vaſcula refrigerat, ſanguinemque cogit. Addunt aliqui ſomnũ conciliare: ſed cauendus eius nimius uſus, quoniam peruigilia tandem adferet. Sanguinem naribus profluentẽ ſiſtere cũ ſucco vuz acerbæ impoſitam ventrẽ ſupprimere. Canitiem crebro uſu accelerare: ægrotationes parere frigidas.

FUMARIA fruticoſa herbula eſt, præte κάπνος
nera, coriandri ſimilis, foliis candidioribus, Fumæ
vndique numerofis, cineracei coloris: flore terre.
purpureo. Aeg. Fumaria inde nomen fortita eſt, quod ſuccus ipſius copioſas lachrymas eliciat, etenim oculorum facit claritatem. Acris amarâque eſt, vnde vrinas bilioſas liberaliter prouocat, iocinoris obſtructioni languorîque medetur, ſtomachum cõfirmat & aluum emollit.

CAPNOS alia Plinio deſcribitur, quam Pied de
pedes gallinaceos vocant, naſcens in parieti- geline.

nis & sepibus, ramis tenuissimis sparsisque,
flore purpureo, viridis, succo caliginē discutit, itaq; in medicamēta oculorū additur. Similis & nomine & effectu alteri iam dictæ.

καππα-
ρις.
Capres.

CAPPARIS aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbē euagatur. spinas, vt rubus, habet, in hami modū adūcas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructū oleæ similem. qui cū dehiscens pādatur, florē candidū promit: quo excusso, nō nihil glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis puniceorum similia ostendit, parua, rubicunda. radices lignosas spargit, grādes numerosasq; Tenui solo, asperisq; locis, in insulis & iuxta rudera nascitur. caulis & fructus, cibi gratia condiuntur. Aeg. Radix extergit, probē purgat, incidit, discutitq; tum amaritudine, tum acrimonia: acerbitate verò cōtrahit, stringit, & dēfat. Lienēs induzatos pota & extrinsecus imposita iuuat, menses promouet, pituitam per os educit, maligna vlcera sanat, dentium dolores sopit, tumores digerit, & vitilignes, quas alphos dicunt: aurium vermes enecat: folia autem & fructus similem quidē sed imbecilliozem vim possident.

καψικόν

CAPSICON Arabici cardamomi genus videtur, recentioribus Græcis appellatum, quod semina in ordinē digesta, quibusdam thecis inuoluentibus cōgerantur ceu capsis. Aquarius, Dissedentes spiritus discutit, fructus

dīates concoquit.

CARDAMOMVM optimum est, quod *καρδάμωμον*
 ex Comagene, Armenia, Bosphoróque de- *Graine*
 uehitur. In India quoq; & Arabia prouenit. *de para-*
 Eligi debet plenum, frangenti contumax, *dis.*
 farctumq; quod enim huiusmodi nō est, ex-
 oletum iudicatur, & gustu acre, subamarū, &
 odore caput tentans. Cardamomum frutex
 est amomo non dissimilis, odoratus, oblon-
 go semine & anguloso. Quatuor eius fasti-
 gia, viridissimum ac pingue, acutis angulis,
 contumax frianti, quod maximè laudatur.
 Proximum è rufo candicans. Tertium breui
 us atq; nigrius. Degenerat variū, friabile, o-
 dorisq; angusti. quod verius est vicinius esse
 costo debet. Aeg. Acre quidē & ipsum est, ve-
 rum nasturtio inualidius. Compos est etiam
 nonnullius amaritudinis, qua lumbricos in-
 terimit, & scabiem cum acero exterit.

CARDAMOMVM aliud hodie Mauri- *Carda-*
 tanis proditum habemus duplici differentia. *momum*
 Maius alabastris rosę corticeis tradūt, in qui- *& sylue-*
 bus semina létis magnitudine, angulosa, pin- *stre caros*
 gua, odorata, suo mordaci gustu linguā vel- *Corda*
 licātia. Minus inuolucris seminū minoribus *perlis.*
 & filiquulis, cādida intus carne, minore odo-
 ris fragrātia, granulis obnigri ciceris ampli-
 tudine. Frutex ipse cubitalis est caule quadrā-
 gulo, leniter striato prodeuntibus, genitula-
 tum & furculis & frondibus, hortensi solano

non dissimilibus flore luteo, dependent ab alarum sinu alabastris rosarum crassiore pediculo, in mucronem sensim turbinati, per initia virētes, maturi quā ruberrimi, vetustate punicei, cute leui relucente, quæ semina includit candida, in vix modum cōuoluta, lenti similia: ea per se cū valvulis gustata, igneum feruorem repræsentant. Vtrunque calfacit, roborat, discutit, extenuat. Sacolla apud Arabes maius, hildebrandi minus.

σκόλυ-
μος.
artichaut
sauuage

C A R D V V S, Græci scolymon vocant folia chamæleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, & crassiora. caulem longum edit, foliosum, capite spinoso: radice nigra & crassa, quæ illita, graucolentiam alarum totiusque corporis emēdat. item si decocta in vino bibatur, copiosam autem vrinam foetidāque expellit. herba cum recens tenerescit, in olea, asparagi modo, transit. Aeg. Cal. sic. 2. Reliqua sunt eadem Dioscoridi.

καρπά-
σον

C A R P A S I succus soporem epotus, citāque strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remediis. Dioscorid.

καρπύ-
σιον.
cubebe
ou cōbe-
be offic.

C A R P E S I V M odoratum est & tenue, viscera obstructionibus liberat, vrinā mouet, & renes calculo laborantes purgat. Aeg.

C A R P I N V S tractabilis est, aptaque iugis, vnde Græcis *ζυγίαν* appellare libuit. Hanc

Hanc aliqui aceris generibus ascribunt, separant alii. In montibus nascitur, flava crispâq; materie. Et ipsa & acer amplæ sunt, platano in findêdo similes: sed carpinus est gracilior macilentiorq; longior atq; mollior, venis in longitudinem fluctuantibus, vndosa, fissilis, segmētis omnibus in acutum compressis: minus tamen quàm pro magnitudinis ratione nervis exūdāt. Auētū facillima, paulo antè æquinoctium germinat: post mensem & arcturū cæditur. Durissima eius materies spissâq; . Itaq; postquam terebrum experiatur, macerant, quo facilius mollescens perforari queat, lectis & sumptuosioribus fabricis iugisq; nascens. Nullum eius in medicamentis vsum legi.

CARYM semen est vulgaris notitiæ. radix cocta, pastinacæ modo, manditur. Aegi. *καρύος.*
Cari semen calefacit, siccatur 3. ferè gradu, flatu digerit, vrinam mouet, idque non semen duntaxat, sed etiam tota planta. Carui.

CARYOPHYLLON frutex in oriente nascitur sambuci forma, semine grano piperis grandiori fragilioriq; ex atro rufescente in clavi modum capitato. Sunt qui representent buxi caudice, lauri folio, sed rotundiore. Aeg. Non eam habet naturam quæ nomine prætenditur, sed ex India veluti flores cuiusdam arboris festucacei & nigri sunt, longitudine ferè pollicis, odorati, acres, subamari.

Cal. sic. 3. ferè gradu (vel vt Aëtius, 2.) Multus eorum erumpit vsus, non ad obsonia modò, sed ad multa quoque medicamenta. (Sic enim legit Rucl. Græca autem æditio habet, ἀπολύχεντ' αἰσιν ἐν ὅψατι καὶ ἐτέροις φαρμάκοις)

βαυία,
Cassc.

CASSIA, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiā gignitur, crassi corticis sarmento, foliis piperis, eligenda est fulvescens, pulchri coloris, coralii æmula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens, & cum aliquāto feruore astringēs, aromatica, vinoso odore, cuiusmodi est quæ ab incolis, achi appellatur: ab Alexādrīe negociatorib. daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir eognomine quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Muscletico blasto, id est, germi ni cognomen est. Reliquæ viles, & quæ apheum dicitur, nigra, insuavis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ darca & citto vocitatur barbaro nomine. Similior huic est, pseudocassia, quæ vt explicari possit. quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, heretemq; medullæ corticē habeat. Inuenitur etiā lata quædā fistula, mollis, lævis, surculosa. quæ antedictæ præfertur. Damnatur cādicās, scabra, hircinū virus redolens, & quæ tenui fistula ea scabra cute sit. Aeg. Cal. sic. 3. ferè abscessu, tenuis a-

bundè, acris & modice astringēs. incidit igitur simul & discutit, roburque instrumentis adiciit, postremò & menses euocat.

CASIA fistularis seu nigra recentioribus Græcis appellatur, quibusdam indica canna arbor magna, iuglâdis folio, fistulis prælongis ac teretibus, vtrinq; fastigiatis, colore rubro nigricantibus, duûm ferè pedum proceritate, nigra intus carne, gustu prædulci, ossibus siliquarum, ligneis distinguētibus membranis. Partim in India, partim in Aegypto nascitur, iam Asiæ communis facta. Deligere oportet pōderosam, collucētē, perplēnā, quā si concusseris, inclusa intus grana non obstrepant. Cal. hum. 1. flauā bilem per aluum detrahit. intemperati iocinoris calores ea refrigerantur. prodest eis, qui per naturam pallore decolorantur, anginis, laterum doloribus, & pulmonariis.

CASSAMYM aliqui fructum balsami interpretantur. Aeg.

CASTANEA. vide Glandes Sardinæ.

CASSYTHA Græcis recentioribus Plinio Syriaca voce cassytas dicta videtur, herbosus fruticibus circūuoluitur, opere topiario per vertices rotata, proxima quæque veluti clauiculis implicat, sine radice, foliis viduala, flore albo, semine scatens tenui, cirris purpureis. Cal. 1. siccat 2. Subamara est iniecta vino, temulentia causa traditur. abster-

καρία
συγγω
δης.
Casse fi.
stule off.
lignea

καρύτας
off. cuscutha.
goutte de liavulg.

git, substringit, roborat. iecoris & lienis impedimenta laxat. flauam bilem per aluum exigit.

κατανάγαν. Ex eo genere vna, folia corónopi habet, longa, radicem iunci modo prætenuem: capitula sena, septenárve, in quibus erui semen inest. Arescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem vnguium milui exanimati. Altera mali parux magnitudinem explet, radice exigux oliux magnitudine: foliis quoque oliux colore, & figura, mollibus, diuisis, humi inclinatis: semen, vt cicer, minutim in virgulis dependet, punicei coloris, multis foraminibus pertusum. Vtranque narrant in amatoria expeti. Thessalicæ mulieres his vti traduntur.

καύκαλις. C A V C A L I S, quam alii syluestre daucum vocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhirsuto: foliis apio similibus, fœniculi modo per extrema multifidis, hispidisque: candida in cacumine vmbella, suauiter olente. Crudum coctúmve olus estur. vrinam mouet. Aegineta, Dauçi modo calefacit, siccat, vrinam mouet, repositaque conditur.

αιδέρος. C E D R V S arbor magna est, ex qua picé colligunt, quæ cedria vocatur. iuniperi modo baccas parit, baccarum myrti magnitudinis, rotundas. Cedria optima est crassa, perlucida, grauis odoris. quæ dum effunditur gut-

ratim non dissipata coit. Cui ea vis inest vt defuncta corpora conseruet, & viuentia corrumpat, qua ex causa mortuorum vitam aliqui appellauere. vestimenta quoque & pelles, eximia calfaciendi & siccandi dote, corrumpit. Fit & oleum, à cedria separatū, dū coquitur, velleribus supra halitū eius expansis, vt in pice. Eiusdem ad omnia vsus. Cedrides Cedri fructus vocatur. Aeg. Cedrus & frutex iunipero similis & arbor est, ambo cal. sic. 3. Cōfectū ex eis oleū, quod cedreā, seu liquorē cedrinū appellāt, etiā quartū ordinē attingit, subtilis admodū substantiæ: hinc teneras carnes expedit, & citra dolorem exedit, duras aut præsertimq; demortuas siccāt, & à putredine asserit, pediculos, pulices, ascaridas, & auriū vermes interficit, aliāq; plura facit.

κεδρίδις

CELASTRVS æterna coma frondet, in planis exilit, inibiq; omniū tardissimè suos perficit fructus. Horret cultum, quē si quando patitur, degenerat. Summis gelidissimisque gaudet locis. Vsus eius ad baculos & scipiones. Theop.

κίλαστρος

CENTAVRIUM magnum folia habet iuglandis, oblonga, viridi brassicari colore ferrata in ambitu: caulē, ceu rumicis, binūm aut ternūm cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papauerū, in rotunditate oblonga: flos cœruleus: semē cnico simile, ceu lancis floccis quibusdā inuolutū,

κιντάνης

ον μέγα.

huiusra-

dixi offi.

rapōtici

noīe ostē

ditur ma

gno erro-

radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cum astrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue & apricum, ac syluas & colles. copiosissima est in Lycia & Peloponneso in Arcadia, Elide & Messenia, pluribúsque locis circa Pholoën, Lyciam & Smyrnam.

κένταυριον μικρόν CENTAURIUM, limnession aliqui vocant, cauere, quoniam rigua amet loca. herba officinaria, ganigi aut hyperici similis, caule ægulofo, palustria minus excedente: flore lychnidis, è puniceo. alijs in purpuram vergente: folijs rutæ, prælongis, si de ter & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, re, alijs læui, & superuacua, quæ gustanti amaritudinem adfert. Aegineta, Centaurij maioris radix acris, calida, & terreæ astrictiōis cōposita. Menses itaque promouet, fœtus corrumpit, mortuos eiicit, vuluera glutinat, sanguinem spuētibus & reliquis pectoris vitijs præsens est remedium. Minoris cetaurij radix inefficax est, coliculi validè & citra morsum ficcant, vnde nō solum ad quæ maius centaurium valet, sed etiam coxendice laborātibus ipsius decoctū inferius intestum biliosa vacuat, nonnunquam & cruenta, mirūmque in modum iuuat.

κερόμυον CEREA longa acrior est quàm rotunda, itè flaua quàm candida, & sicca quàm viridis, & cruda quàm cocta, aut sale condita. Aegineta. Cal. 4. Substantiæ crassioris est, quam ob-

re hæmorrhoidas appositum aperit: abstergit,
vitilignes, albos diſcas, cum aceto exterit.
deſſuos capillos ocyus olcyonio reſtituit.
Succus oculis ſuffuſis, aut craſſi humoris vi-
tio hebetibus auxiliatur.

CERAE a portulacæ ſimilis eſt, ſed nigrio-
ra habet folia, & radicem tenuem. Aeg. Folia
ipſius cōtra veſicæ ſcabiem vtiliter bibuntur:
Radix cum aſparago myacantho pota vri-
næ ſtilliciidia, quæ oppleto vrinario meatu
ſiunt, abigit.

CERASIA dulcia quidem citius dilabū-
tur, auſtero ſtomacho vtiliora ſunt: acida ve-
rò ob ſuā incidendi vim pituitosis excremē-
toſisq; ſtomachis proſunt. Gūmi verò ceraſi
arboris, faucibus exaſperatas leuigat, & calcu-
lo laborantibus cum vino potum ſuccurrit.
Aeg. (Chamæceralum infra dicemus.)

CERINTHE herba propter apes ſeren-
da quibus eſt gratiſſima, folio candido, in-
curuo, cubitalis, capite concauo mellis ſuccū
habente. Hanc Virgilius ignobile appella-
uit gramen.

CERRVS ægilops, quercus ſpecies eſt
populo ſimilis, caudice recto, excelfo, læui,
& per longitudinem robuſtiſſimo, materie
alioqui improba, nec niſi ærariorū officinis
carbone donata. Quod enim ceſſante flatu
ſtatim extinguitur illis compendio eſt, nec
niſi paucis abſumitur, ſic tamen plurimis

scintillis diffiliens. Glans illi tristis, borrida, echinato calyce castaneæ modo: itaq; à nullo præterquam à sue manditur, nec nisi aliorum inopia: cum alioqui solidam duramque gignat carnē. quare suem cerrea glans diffusam quidē sed grauē facit. E glandiferis vna fert panos arentes: muscofo villo, canos non in cortice modo, verum & è ramis dependentes, cubitali magnitudine, odoratos, sphagnum siue splachnum siue phascon appellat, item bryon: nostri penem, Syri vuam dæmonum. Eadem ferè omnia Theophrastus Macedonica cerro, quam asprida nominat, tribuit: quæ ægilopi cerro Plinius ascribēda existimat. Cerri folia, & cortex & glans siccant collectiones, fluxiones sistunt. Torpētes mēbrorum partes corroborat decoctum eius fortu: cui & insidere expedit siccandis astringendisque partibus. Radix aduersatur scorpiionibus.

χαμῖβα
τος.

CHAMAEBATVS, humi sparsus est rubus, radices quæ tellurem tangit agēs, vbi nihil est propè quod vncis aculeis subeat.

χαμῖβ
ρασος,

CHAMAECERASVS pumila est, in Bythinorum agro frequens, radice parua: neque arbor est, nec arbusculis ceraforum impar, baccis cætera omnia consimilibus. Copiose vefcentibus caput vini modo grauante. Sed hæc, vt Athenæus refert, de memæcylis intelligi possunt. Nam ex his, id est, arbuti

baccis: si quisquam plus septē cōstitit, caput eius dolore tentabitur.

CHAMAECYPARISSVS herba ex vi. χαμαικ
no pota cōtra venena serpentium omnium, παριος
scorpionūque pollet. Cypres
de iardin

CHAMAECISSOS, folio est hederæ, tenuiore, longiusculo. ramulis à radice quinis χαμαι-
senisve, dodrantalibus, foliosis, flore violæ κιος.
bæ simili, cādidiorē, ac tenuiore, gustu supra Licre
modū amaro. radice tenui, cādida, inutili. na terrestre
scitur in cultis. Aeg. Flos iecorum meatu ad-
aperit, item contra coxendicum dolores ex-
hibetur.

CHAMAEDAPHNE virgas emittit cubitales singulari ramulo constantes, rectas, χαμαι-
tenuēs, læues: folia lauri similitudine, lævia δάφνη.
ra multo, ac viridiora: semen rotundum, Laurcolæ
rubens, annexum foliis. Aegineta. Cōsimilem
laureolæ seu daphnoidi, & Alexandrinę lau-
ro vim habet. Chésnee

CHAMAEDRYS, quære Trissago.

CHAMAEDROPS, quidam & hāc cham- te ou ger
medryn, alii teucrion vocant: viribus chamæ mandree
dryi respondet. Aegineta. χαμαι-
δρως.

CHAMABPITYS. quære Aiuga.

CHAMAELION albus, ixia ideo ali- χαμαι-
quibus vocatur, quod quibusdam in locis vi- λείον
scum circa radicem eius inueniatur, quo pro λευκός
maſtiche vtūtur mulieres: folia habet ſylibo Carlina
aut carduo ſimilia, aſperiora, acutiora, ni- ou Car-
dina.

groque chamæleone validiora. caulem non promit, verum ex medio spinas, echini marini, aut cinaræ modo, erigit. flores purpureos, veluti papporum lanugines emittit: semen cnici simile: radicem in latis collibus crassam: in montosis verò graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graui odore dulcem.

Χαμα-
λέων μι-
λὰς.
Cardo.
nette

CHAMÆLEO niger, foliis scolymo similis esset, nisi minora, tenuioraque, ac rubro distincta viderentur. caulem emittit do-drantalem, crassitudine digitali, subrubrum: & in umbella flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, versicolores. radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ dissecta flavescit, & commanducata mordet. Prouenit in campestribus, siccis, & cliuosis tractibus, & maritimis. Quare chamæleo vocetur, à varietate foliorum euenit. mutant enim cum terra colorem: hic viridia, illic albicantia, aliubi cœrulea, nonnunquam rubra inueniuntur. Aegineta. Nigri radix cal. sic. 3. prope-modum ordine, abstergit, cutis labes exterit. duros tumores dissipat emollitque. Phagedænica vlcera illitu persanat. Si autem intra corpus sumatur, veneni loco est. Albi radix nigro proportionē respondet, sed amarior est: quæ si cū vino austero instar acetabuli bibatur, latos ventris lumbricos enecat: facit etiā ad aquam intercutem.

CHAMAELVCE lumborum dolori- χαμαί-
bus propitia est, herba virens, incurvis foliis, λίνκκ.
furculisque: flore rosaceo. Aeg. Cal. 3. sic. 1. Pas d'af;

CHAMAELVM. vide Anthemis. ne ou

CHAMAELATANI sunt coactæ bre pied de
uitatis pumilæ platani: quoniã arborũ etiam poullain
abortus inueniuntur.

CHAMAESYCEN aliqui sycen nomi- χαμαί-
nant. ramos emittit quaternũ digitorum, πλάτα-
teretes, succosos, in terram deiectos folia len- νοι.
tis, parua, peplum plane referentia, tenuia, χαμαισύ-
quæ à terra non attolluntur: semine sub fo- κκ.
liis rotundo, vt in peplo. neque caulem, ne-
que florem promit. radice firmatur tenui, su-
peruacanea. Aegineta. Absterforia & acti fa-
cultate pollet, quapropter & furculi ipsius &
liquor myrmecias verrucáque abolet: cras-
sas oculorum cicatrices cum melle abster-
gunt, hebetudini & suffusioni incipienti me-
dentur.

CHAMAELÆA furculosa fruticat, ramis χαμαί-
dodrantalibus. folia oleæ similitudinem ha- λαία.
bêt, tenuiora & amara, quæ gustata linguam Oliuella
mordent, & arteriam deradunt. Aeg. Abster- offic. me-
foria facultate sordida, vlcera, & crustas cum zereon
melle purgat.

CHELIDONIUM maius, caule est gra χελιδών-
cili, cubitali aut altiore, agnatis foliosis: fo- νοι.
liis ranunculi, multis, mollioribus tamen, μέγα
& colore cæsiis: flore violæ albæ, secun-

dum singula folia prodeūte. in eo succus croci, mordax, acris, & aliquātulum subamarus, grauitèr olens. radix supernè singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratur. filiqua, ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram longa: in qua semen papauere maius recluditur. Hoc nomē sibi videtur vendicasse, quod aduentu hirūdinum exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirūdines matres excecatis pullis, admota herba visum restituere.

Χελιδώ-
νιον μέ-
γρον.
offi. scro-
fula.

CHELIDONIUM minus, quod triticū sylvestre aliqui nuncuparunt, herbula pediculis ab radice pendens, sine caule: foliis herederæ, multo rotundioribus & minoribus, teneris, & suppinguibus. radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in granorum tritici modum aceruatim congestas, quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Aeg. Maius cal. 3. valentèrque abstergit: succus ipsius claritati oculorum utilis est. radix arquatos cum vino & aniso pota, obstructione liberat: manducata dentiū doloribus auxiliatur. Minus cal. 4. acre adeò vt illiū cutē vlceret. vngues scabros emendat. Succus per nares purgat.

Χονδρίλλ-
α.

CHONDRILLA, quam aliqui cichorion, alii serin appellant, caulem, flores, & folia habet cichorio similia. qua ex causa nonnulli sylvestris intubi speciem esse pronun-

ciarūt: verū tenuior tota est. in cuius ramu-
lis, gummi mastiches simillimum, tuberculo
fabæ inueniri solet. Aliud habetur chōdrillæ
genus, folium ferens oblongū circumrosum
humī sparsum, caulem succo madentem la-
cteo: radice tenui, rotunda, leui, vegeta, fla-
uescente, succosa. cuius & caulis & folia con-
coquendi vim habent. succus incommodos
palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in lætis
& cultis. Aeg. Chōdrilla intybi species sub-
amara gustu est, propterea etiā maiore sic-
candi vim quā illa obtinet.

CHRYSANTHEMON aut caltha, nō. χρυσάν-
θεμον.
Margue-
rites blā-
ches
nullis buphthalmos, herba est tenera, fru-
ticiosa, læues proferens caules, & multifida fo-
lia: flores supra modum splendentes, luteos,
orbem oculi imitantes, ynde buphthalmi no-
men traxit. propter oppida nascitur. Cuius
caules oleris vice manduntur. flores cum ce-
rato triti steatomata discutere prodūtur. Re-
gio morbo correptis colorem breui reddūt,
si sequēte longo balnei vsu, post exitum ebi-
bantur. (Aeg. non retulit.)

CHRYSOCOME palmi altitudine fru- χρυσόκο-
μη.
ticat. coma specie corymborum, hyssopo si-
mili. radice hirsuta, veratri nigri modo, te-
nui, cyperum æquante: gustu non iniucūdo,
ex austero dulci. in petrosis opacisque nasci-
tur. Aeg. Chrystitis etiā dicitur. radix acri si-
mul & astringente vi existit, quare nō multi

in medicina vsus est: quanquā peripneumonici, & iocinorosis in mulso elixa exhibeatur: ceterum menses educit.

χρυσογό-
νος.

CHRYSOGONVM densē fruticat, quernis foliis: flore coronarij verbasci. radix vt rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ trita cum aceto, atque imposita, muris aranei moribus auxiliatur.

χρυσολά-

χανον:

offic. mi

nor cras-

sula &

chryfola

num

κύανος.

Blaueo-

les ou au

bifoïs ou

bluetz

Cicerole

CHRYSOLACHANVM Plinius ab atriplice discreuit, in pineto foliis lactucæ nasci tradens, sanare neruos incisos. si cōfestim apponatur. Et alibi genus chrysolachani tradit flore aureo, foliis oleris. Coddū est ut olus molle. Stranguriam dissoluit si bibatur ex vino & aqua. Alium sistit.

CYANICOLOS est in nomine, qui honorem noménque dederit cœruleo. Rosam cyanus excipit, cyanum amaranthus. Plin.

CICERAM non tam leguminibus Columella quàm pabuli generibus adnumerat, eamque proximam fœnogreco & medicæ tradens. Eadem hominibus non inutilis, nec iniucunda est. Sapore certè nihilo differt à cicercula, colore tantum discernitur. nam est obsoletior, & nigro propior. Seritur primo vel altero sulco mense Ianuario, aut Februario, Martiôve: quibusdam tamen Italiæ locis ante calendas Nouembris. Lato loco & humido feri debet. Ea, ut volunt, stercoratur ager.

CICERCVLA est minuti ciceris in- cerresou
equalis angulos habens veluti pisum. Ea mul poys cer.
tis in locis vñtur, eiusq; cremorem phasolis re.
præferunt in alendo potentiorē.

CICI, lege Ricinus.

CICER consuetum legumen flatus cre-
at, valentis materię, aluum facilem reddit, vri
nam mouet, lacti seminique generando ac-
commodatū, idem menses elicit. At crios ap-
pellatum, hoc est arietinū, aliis magis urinæ
ciendæ est: decoctum ipsius præsertim nigri,
calculos quoque in renibus conterit. Quod
orobizum ab eruo vocatur, calidius his est,
& subamarum. Syluestria quouis modo do-
mesticis sunt validiora. Est autem syluestre
cicer foliis satiuo simile, odore acri, sed semi-
ne discrepat. Aeg.

οροβίζα
Ciche

CYCLAMINVS folia habet hederę,
purpurea, varia, in quibus sūsque déque albi
cant maculæ: caule nudo, quaternos digitos
æquante: floribus in eo purpureis, rosarū effi-
gie: radice nigra, & aliquantum lata, vt ra-
pum videri possit. Aegin. Cyclaminus varias
vires habet, etenim extergit, incidit, aperit,
attrahit, & dissipat. Succus ipsius hæmor-
rhoidas sedi admotus aperit, duritias cum a-
liis discutit. Cum melle suffusus proficit, per
nares purgat abdomini inunctus aluum sub-
ducit, foetus corrumpit. Radix autem to-
ta succo quidem est imbecillior, sed & ipsa

κυκλάμις
vos.

offic. cy-
clamen
messon,
ou pain
de por-
ceau vulg.

vehemens adeo est, vt cum mulsâ instar triū drachmarum pota, interanea expurget. Cutis etiam vitia exterit.

κυκλάμι
νος ἑτίρα
offi. sigil-
lū Mariæ

Est & altera CYCLAMINVS, quā cissanthemon aut cissophyllon vocāt: foliis hederæ, sed minorib⁹: geniculatis caulibus, crassisque circa uicinas arbores, capreleorū modo se voluentibus: flore candido, odorato: acinis hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua. nascitur in asperis. Aeg. Semen efficax est vt potum priori similia faciat.

κυκλάμι
νος τριή

CYCLAMINVM tertiā Plinius sibi demonstratā asserit cognomine chamæcisson, vno omnino folio, radice ramosa qua pisces necabātur, quod Dioscorides nomine tenus primæ cyclamino tribuit, ichthyotheron, à piscium venatu nominans.

κώναρον.
Cigue

CICUTA caulem ædit geniculatū, vt fœniculi, grandem in cacumine, ramosum: folia ferulæ, angustiora, graui odoratu. rami, mox umbellę in summo prodeūt: flores quoque albicantes: & semen aniso candidius: radice non alta, concaua. Cicutę letale venenū inest, suāq; vi refrigeratoria necat. Remedio est vini meraculi potus. Succus exprimitur contusis cacuminibus, priusquam semina & comæ siccescant. qui sole densatur in pastillos. Efficacissima vis Creticæ, Megarensi, mox Atticæ, & in Chio, & Cilicia nascenti.

Aeg. Cicutæ vires summè refrigeratorias esse omnibus constat.

CYMINVM, lege Cuminum.

κυννάμω-

CINNAMOMI genera plura, patriū ^{μον.} Canelle sibi nomen vendicātia. Præfertur tamen Mosyliticum, quòd cassiæ, cui Mosyliti nomē est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex vinoso in cinereum vergēs, læue, tenuibus ramulis, ac frequētibus nodis cinctum, perquàm iucunde olens. Optimi ferè indicium, iucundi odoris proprietate cōstat. Innenitur enim cum optimo, coque quod peculiare est, odor rutæ aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordēs, & cum calfactione quadantenus salsum, quòd non citò confricanti asperum, aut frianti lanuginosum, læuibus tamen internodiis appareat. Si certior fieri voles, vellito ab radice surculum. facilis est huiuscemodi probatio: nanque fragmenta miscellanea quædam esse videntur. Quæ autem melius spirant, suo halitu cum nares primum consuluntur, olfactum ex plentia, deterioris dignotionem impediunt. Est etiamnum montanum, crassum, pumilum, fuluescens admodum. Tertiū à Mosylitico, perquàm suauiter olet, nigrum fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fungosum, candicans, aspectu tuberosum, vile, ac friabile, magnam habens radicem, quæ cassiam planè representat.

Quintum genus, odore nares feriens, sub-
 rufum, & cortice fulvæ casivæ simile, tangen-
 ti firmum, minus nervosum, densa radice fir-
 matum. Iis quæ thuris, casivæ, myrti, aut amo-
 mi odorem spirant, minus suavitatis inest.
 Deligito scabrum, album, rugosum. at læve,
 lignosum circa radicem, vt inutile, reicito.
 Est etiamnum simile aliud, cui pseudocin-
 namomo cognomé est, vile inualidi odoris,
 solutarumque virium. Vocatur etiam Zingi-
 ber, cum tamen sit xylocinnamomum, præ-
 bens quãdam cinnamomi faciem. Est autem
 lignosum cinnamomum, sarmenta longa ro-
 bustaq; ferens, odore longe cinnamomo in-
 feriore. Sunt qui xylocinnamomum, à cinna-
 momo genere differre dicant, quod à natura
 eius abhorreat. Est & quoddã cinnamomũ,
 quod aliqui pseudocinnamomum appellât,
 perquã denso atque crasso sarmento, longè
 tamè inualidius cinnamomo, & odore & gu-
 stu. Aeg. Cinnamomi vis est summè tenuis,
 non item æquè calida, sed tertij ordinis, nihil
 autem ex iis quæ parem ipsi calorem referūt
 adeò siccatur, propter substantiæ tenuitatem.
 Cinnamomis autem vel pseudocinnamo-
 mum veluti inualidum quoddam cinnamo-
 mum est.

Lingue
 de chien

CYNOCEPHALAEA eadem potest vi-
 deri antirrhino, vt mihi quidem videtur.)

CYNIA aut cynocrambe, cauliculum bi- κυνό-
nūm dodrantum altitudine emittit, mollem, κράμβη.
subalbidum: folia mercuriali aut hederę simi off. 1yluc
lia, certis interstitiis subalbida. semen foliis stiris atrid
adheret. paruum, rotundum. Folia cum cauli plex
bus pota, aluum cient, oleribus commendan-
tur. Ius decocti & pituita & bilem aquamq;
detrahit.

CYNOGLOSSON folia latifoliae plan-
taginis habet, arctiora, minora, lanuginosa: κυνό-
caule vacat, & humi sternitur. prouenit in sa- γλασσόν.
buletis. Contrita eius folia cum vetere sullo Non est
adipe, rabidorum canū morfibus, alopeciiis hec lin-
& ambustis medentur. Herba cocta & cū vi- guacanis
no pota, aluum mollit. herba-

CYPIRVS, quem aliqui erysisceptrū, vt
aspalathū appellāt, folia fert porraceis pro-
xima, sed longiora & exiliora: caulem odo-
rati iunci, cubitalem aut maiorē, angulosum
in cuius cacumine minuta folia cum semine
exoriuntur: radices, quarum in medicina est
vſus, cohærentes inter se, oleis oblongis simi-
les, aut rotundæ, nigro colore, suauī odore,
amaro gustu. In lacunosis, palustribus & cul-
tis enascitur. Optima est grauissima, densa,
fractu contumax, plena & aspera, odoris
cum quadam acrimonia iucundi, qualis est
Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insu-
lis petitur.

κὺπαρος
ἰνδὶκὴ.

Aliud CYP I R I genus tradunt in India nasci, gingiberis effigie, quod manducatum crocivim reddit, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem psilothri vim exhibet. Aeg. Iuncus angulosus calfacit siccâtq; citra morsum, hinc etiam humidioribus vlceribus cicatricem mirabiliter inducit, ac oris vlcera per sanat: habet & vim quandam incisoriâ, qua calculos comminuit, urinâ & menstrua promouet.

κὺπαρος,
Troisne

CY P R V S arbor est oliuæ foliis circum ramos, latioribus, mollioribus, & virentioribus, flore candido, muscoso, odorato, semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope & Ascalone. Aegin. Cypri folia & surculi mixtis constant viribus, discutiète & astrictoria, tum ea quæ sine offendiculo & morsu sicet: ideoq; decoctum ipsorû ambustis superfusum prodest, ac igneis inflammationibus congruit. Itē oris eruptiones, aphthas vocâr, ipsa arbor commâducata per sanat: item medicinis lieni dicatis miscetur.

κίρκια.

C I R C A E A, quam & dircæam, aliqui vocant, foliis est hortensis solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine milij, nascente in quibusdam veluti corniculis: dodrantali radice, triplici ferme, aut quadruplici, candida, odorata, ex calfaciente. Nascitur in apricis, saxis, & vento perflatis. Aegin. Eius radix calida est, & odorata, quæ cum vi-

no pota foeminarum locos purgat: semen in
forbitione sumptum lac generat.

CIRSIUM, caulis est tener, duorū cu-
bitorum, triagulo similis: ab imo foliola, ro-
sæ speciem referentia: anguli spinosi, per in-
terualla molles: folia buglosso similia, maio-
ra, subcādida, modicè hirsuta, partibus extre-
mis aculeata: cacumen caulis orbiculatū, hi-
spidum, in quo capitula purpurea, quæ sol-
uuntur in lanugines. Radicem huius loco la-
boranti adalligatam, dolores varicum sedare
Andreas scripsit. (Aeg. non meminit.

κίρσιον
off. lingua
bouis

CISTVS, quem aliqui citharon, aut cis-
faron vocant, ramosus frutex est sed impro-
cerus, foliosus, saxosis locis nascens, foliis ro-
tundis, acerbis, hirsutis. flos masculo vt mali
punicæ, foeminæ albet. Hypocistis, erythra-
non, aut cytinus à nonnullis cognominata,
iuxta cisti radices nascitur, floris punici simi-
litudine. quædam flaua, altera virens, tertia
candida. Liquatur acaciæ modo. aliqui tamē
exiccant, fractamque macerant, & incoquūt,
reliquaque, vt in Lycio prosequuntur. Aegi-
neta, Frutex est astringēs, & modicè frigidus
virtute: folia ipsius & germina adeò siccant,
vt etiā vulnera conglutinent: at flores cum
in secundo ferè gradu sicciores sint, intesti-
norum torminibus, aliisque fluidis vitiis ac-
commodati sunt: extrinsecus illiti putrida vl-
cera compescunt.

κίσος
De gari-
cles

κὺτιςος.

Grand
neufle

CYTISVS, frutex est albus in totum, vt rhamnus, ramos spargēs cubito longiores, in quibus folia scæni-græci, aut loti trifoliæ, minora, dorso medio prominente. ea digitis tri- ta crucam olent, gustatâque cicer sapiunt. Fo- lia refrigerât. tumores inter initia discutiût, si cum pane trita illinantur, decoctum potu- urinam ciet. Nonnulli, quod a pes alliciat, prope aluearia ferunt. Aegineta, Folia discuti- entis leniter & tepide nostræ sunt quemad- modum & maluæ.

κίτρον.

Citron

CITRII medium acidum, aut qualitatis expers, in quo semen est, tertij refrigeran- tium siccantiûmque ordinis habetur. Cortex in secundo quidem abscessu siccatur, sed non item refrigerat, acri virtute præditus. Caro ip- sius crassi succi est, pituitæ generandæ apta & frigidæ, semen digerit & sic. 2. Folia arbo- ris siccandi discutiendique vim repræsentât. Aegineta.

ελύμα.

Tis

Peruëca

CLEMATIS humi serpit, læto, pinguiq; solo prouenit, viticulas spargens crassitudine iunci, exiguas: folia lauri figura & colore, multo minora. Gignitur in terrenis. Aeg. Ap- pellatur & daphnoides, myosinoides, poly- gonoides. Siccâdi virtute pollet, qua fluores alui quâ diarrhœam dicunt, intestinorû tor- mina, & dentium dolores finit. Cōtra vene- natorû morsus rectè imponitur. Est & altera off. Volu clematis, quæ viticulosum emittit ramulû, ru-

bescens, lentum: folium gustu admodum bilis ma-
acre, ac exulcerans. repit per arbores, vt smi. ior. & Cā
lax. Aeg. Huius fructus cū aqua potus pituitā panella
& bilem per inferiora educit. folia ad lepras
arcendas illinuntur.

CLEMATIS tertia Plinio recensetur, cē- κλημα-
tūculus Italis appellata, rostratis foliis ad si- τίστειν
militudinem capitis penularum iacēs, in ar-
uis. Est eius egregius, effectus, ad sistendam
aluum in vino austero. Idem sanguinē sistit
cū oxymelite, aut aqua calida. sic & ad secun-
das mulierum efficax. (Idem serè gnaphalij
effectus est, quod Romanis similiter centun-
culus appellatur, hinc fit vt quid differāt ad-
dubitem.

CLINOPODION frutex est foliis ser. κλινπό-
pyllo similis, surculosus, duūm dodrantum διον.
altitudine. nascitur in petrosis. flores matru- Forte q̄
bij modo, ex interuallis distincti speciem vulgo or
lecti pedum præbent. Aegin. Vis eius est ca- biculata,
lida siccaque, nondum vero adurens, sed ter- quā offi.
tij serè ordinis. montanū

CLYMBENVM caulem fert fabæ, qua- pulegiū
dratum: folia plantaginis, folliculis supra κλύμε-
caulem in sese inflexis, vt in polyporum cir- ρον.
rhis. Probatissimum est è montibus. Succus Sigiea
ex herba tota cum radice exprimitur refri- offi. Cy-
gerans, & omnes fluidas affectiones astrin- pria ou sa
gens. (Galenus & Aegineta indi&am reli- ponalis
querunt.)

κνίκος, C N I C V s foliis constat oblongis, per am
vel κνῆ- bitū diuifis, asperis, spinofis, caule fefquipe-
κος. dali, capitulo magnitudine grādis oliuē: flo-
off. carta re croci femine candido, alioqui rufo, longo
mus angulofo. Huius flore in obfoniis vtuntur.
Aeg. Cnici femine ad purgandā aluū dunta-
xat vtimur. Si quis extrinsecus eo vtatur, ter-
tij calefacientium ordinis erit.

κόκκος C O C C V M quo infectores vtuntur, frutex
βαφικός. eft furculofus, paruus. cui grana ceu létes ad-
Eicarlate harent, quæ electa congeruntur. Optimum
offic. gra gignitur in Galatia & Armenia, deinde Asia
na tincto & Cilicia: vltimum ex omnibus Hispanicū.
rū. narb. Nafcitur quoque in Cilicia, è quercubus, co-
vermillō chlearum exiliū fimilitudine, quod illius re-
gionis mulieres ore legunt, & coccum voci-
tant. Aeg. Granum tinctorium leniter ficcatur,
vnde magnis vulneribus, & neruorum iti-
dem cum aceto, aut oxymelite leuigatum cō-
modé imponitur.

κωδιάνιον. C O D I A M I N V M bis anno, vere & au-
vov. tumno emicat, & ftates hyemēsque fugit. Vocāt
& codianum bulbum fylueftem interpretan-
tes, & codion eius florem.

κοῖξ. C O I X Theoprafto folio arūdinis, angu-
lari, ad nexus vtilis, à quo fifcellæ genus At-
ticæ coix, vt inquit Pollux, apud Doros
Cois. fit & mentio de coicinis textis apud
Strabonem.

κολχικόν C O L C H I C O N, aliqui ephemeron, sunt

qui agrestem bulbum vocant, autumni exitu florem edit croci, candicantem: ab eo tempore, folia bulbi, sed pinguiora: caulem palmo altum, ferentem rufum semen: radicē foris è nigra rufescentem, quę delibrata, candida & mollis spectatur, lacteo succo madet, at quę gustatu dulcis inuenitur. bulb' eius mediam habet rimam, fissuramquę, qua flos erūpit, plurimum in Messenia, & Colchis enascitur. Ea comesa, fungorum more, strangulando enecat. Hanc autē depinximus, ne à quouam imprudēter pro bulbo deuoretur: mirum enim in modum saporis voluptate imperitos allicit. Remedio sunt eadem quę fungis. bubulum etiam lac potū auxiliatur. itaq; cum adfuerit, non aliud desideratur auxiliū. (Aegineta nihil adiecit quàm eius alexipharmaca.

Canine
ca. offic.
hermo
dactyli.

COLYCEA arbor circa Idam prouenit, alioqui rara inuentu, fruticosa, ramosaq;, & multis alis concaua. folio ulmi, longiore, satis ad latifolię laurus accedēte, sed ampliusculo & rotundiore, suprà viridi, infra cano, neruosoq; præ tenuibus neruulis fibrisq;, de medio callo in costarum speciem adductis, materię solida, cortice non læui & quasi vitigineo vestitur. Radicibus per summa gracilibus, & solutis, cæterum fibratis, & mirum in modum flauis. Sterilis & flore vidua, sicuti los tamen gemmāsque circa folia pingues,

κολυκία

laues, candidos, améntācea facie fundit. Præcisa, vel ignibus exusta, ab imis rediuiua resurgit.

COLYCEA alia est apud Theophrastum, folio sâlicis, comosa, ramosa, in totumque ampla, valuulis leguminum more non angustis, in quibus semen latum, paruum, durum non nimis, nec abundè pro magnitudinis ratione frutificat. (Hanc aliqui Plinio staphylodendrum dici existimât, de qua suo loco.

κολυτρία
Bague-
naudier.

COLVTEA Liparæ peculiaris à Theophrasto traditur. Arbor magnitudine præstās fructum ferens in siliqua, magnitudine lentis, qui mirum in modum oues saginet. Nasçitur semine & fimo præcipuè ouillo. Serendi tempus, cum arcturus occidit. Mādari solo debet præmaceratū, cum iam in aqua germinare cœperit. foliū mittit scenogræco nō absimile. Arbor primū vnicaulis emicat, tri-na cōcidendis scipionibus & baculis idonea. Si quis nimis decurtauerit mox emoritur, quippe quæ lateribus haud quaquā fruticet: spargitur deinde in ramos, quadrina prorsus abhorrescit. (Si hæc arbor est quā Mauritanî Sene vocant, siliquosus eius fructus denarii pōdusculo potus pituitam & bilem deiicit. Retorridā atramq; bilem earūmq; suffusiones ex gallinaceo iure depellit. Vetusto capitis dolori, scabiei, comitialibus, impetigini

succurrit. Sed ius potius seruefacti, quàm triti farina p̄pinatur. pulueris modò drachma, indecocto semuncia. interancorum obstructions explicat. (Actuarius.)

COMBRETVM baccari simillimū traditur, nisi quod procerius est, foliorum exilitate vsque in fila extenuata. Hoc totum cū axungia vulnera mirificè sanare.

COLOCYNTHIS sarmenta foliâq; satini cucumerisemittit, per terram repētia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer amarum: quem legere oportet, cum cœperit in pallidum colorem permutari. Aegineta, Cucurbita sylvestris validâ purgandi vim obtinet: viridis ipsius succus infricatus coxendicum doloribus auxiliatur.

κολοκυνθίς.
coloquite

CONYZA E duo genera, quæ parua vocantur, odore præstantior est. maior verò frutice altior & foliis latioribus, graui odore. vtriusq; folia oliuæ similia, hirsuta, pingua. in maiore caulis binâm cubitorum altitudine attollitur, in minore pedem equat flos fragilis, lutei aut fului coloris, qui in pappum abi, tradices superuacue. Est & tertium conyzæ genus, caule crassiore, ac molliore: foliis quàm paruz maiusculis, minimè pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & inuicundioris, sed inefficacior. Prouenit locis siguis. Aegineta, Conyza vtraque Cal. sic. 3.

κόνησα.
chasse pu
ce ou ci
micaria.

Hinc etiam oleum in quo decoquitur rigo-
res febrium circuitu remeantes discutit. Flo-
res idem præstant, quorum decoctum menses
citatur, & foetus extrahit, De tertia non aliud
tradit quàm Dioscorides.

Esponge **C O N F E R V A M** appellant à conferru-
de ruie- minando, spongiam aquarum dulcium verius
re ou tof- quàm muscum aut herbam, villosam densita-
se musc. tis atq; fistulosam. Frequens est in Alpinis flu-
minibus. Hanc præsentaneum esse remedium
ad ossa fracta Plinius est author.

Διάκρυον **C O N S I L I G O** ætate plinii herba in Mar-
Pulmo- sis reperta. Nascitur & Aequiculis circum vi-
naria Ve sis reperta. Nascitur & Aequiculis circum vi-
getii esse cum Neruesia. Radix eius suum & peco-
videtur. rum omnium remedium præfens est, pulmo-
Pomelee num vitio, vel traiecta tantum in auricula. Bi-
ou patte bi debet ex aqua, haberiq; in ore assidue sub
de lion. lingua. Superficies huius herbae an esset in a-
liquo usu, Plinio fuit incertum. Columella ad-
uersus pestilentiam ingruentem gregi præfens
remedium huius radiculae usum cognovit. Cō-
filigné mulomedicis pulmonariam dici co-
pisse testatur Vegetius.

off. volu- **C O N V O L V O L I** herbae nascentis per
bilis. du fruteta nullo odore flos est, nec crocis intus
liset, ou candorem tantum referens, ac veluti naturæ
de laveil. rudimentum lilia facere condiscens.
lere, ou **C V N I L A G O** siue cunila mascula, odo-
herbe ris est foedi, radicis lignosæ, folio aspero. tra-
aux clo- dunt manipulo eius abiecto omnes etiam à

tota domo blattas conuenire ad eam.

ches ou

CORIANDRVM aut corianum vulga-
ris est notitiæ. Aeg. Ex contrariis viribus cō-
positum est, tenuis substantiæ, terrenæ, ama-
ræ, aquosæque humiditatis tepidæ particeps.
Habet modicā vim astringendi, quapropter
inflammationibus, erysipelatis nō admodū
feruentibus cōuenit. Tumores molliusculos
cum aliquo in idem efficaci, discutit. Semen
modicè quidem cum passo bibitum, lumbrici
cos pellit, libeeralius autem sumptum men-
tem tentat.

des clo-

chettes.

herbe en

censiere.

κόριον.

coriandre

CORIS, quod aliqui hypericon vocant,
frutex est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac
minore, non altior dodrante, suavis, odora-
tus, acris. Aegineta, Semen eius ad vrinam &
menses ciendos bibitur. Succurrit & phalan-
giorum moribus, item ad opisthototon cū
oleo inurgitur.

κόρις.

Milleper

tuis, ou

herbe S.

lehan.

CORNVS dura arbor est, baccas ferens
oliuæ modo oblongas, quæ primum virent,
dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ co-
lorem repræsentant. Muria, vt oliuæ, condiū-
tur. Sanies quam virentia folia torrendo resu-
darunt, impetigini conuenienter illinitur.
Aeg. Corni fructus acerbis, si edatur, validè
vêtre astringit. Folia autem & germina a-
cerbitate vehementer siccant, ad cō vt maxi-
mis durorum corporū vulneribus glutinan-
dis sint.

κράνις

Cormier

ou corni-

er.

περωνό-
πας.

Capriole
ou fâgui-
naire, ou
dent au
chien.

κὶστός.

Du coq.
ou herbe
de nostre
Dame.

CORONOPVS oblonga herbula est, per terram repens, fissis foliis. coquitur in o. lere, radicem habet tenuem, abstringentem, quæ in cibo cœliacis facit. Pronenit in aggeribus, & locis incultis, & secus vias. Idem apud Paulum nisi quod *καλίκονος* pro *κοιλικονός* perperam legitur.

COSTVS præcellit Arabicus, candidus, levis, eximia odoris suauitate. Secundū locum sibi vendicat Indicus, levis, vber, vt ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abundè plenus, densus, aridus, à teredinibus non erosus, sine graueo-
lenxia, gustu calidus ac mordens. Sunt qui admittis helenii comageni præduris radici-
bus, adulterent. quod deprehensu facile est. siquidem neque gustu feruet helenium, ne-
que validum odorem vibrat, vt caput tenta-
re possit. Aegineta, Costus modicum qui-
dem amaritudinis, plurimum verò acris & calidæ qualitatis habet, idoneus si quam sit opus particulā calfacere, vel ex alto in sum-
ma humorem aliquem elicere. Vrinam & menses ducit, lumbricos enecat. Quum ve-
rò & flatulenti cuiusdam particeps sit, vene-
rem cum mulso potus stimulat. Coxendi-
cum doloribus, resolutis, febrium rigori-
bus ante accessiones, cum oleo infricatus,
conducit.

COTONEA mala & struthia frigido ac terrestri donata temperamento, ventrem sup primunt, vulnera glutinant. Aeg. κνδώνιο.
Coins.

CRATÆOGONVM, siue vt alii placet, cratægonon, foliis melampyro simile est, multis calamis ex vna radice emicantibus, multorumque geniculorum. semine milii. nascitur in opacis & frutetosis, summo opere acre. Eadem apud Paulum, sed frigidum semen esse adiicitur, corrupta, ni fallor, lectione: aliter enim apud Galenum legitur. κραταίονος.
Curage

CRITHMVM, seu potius, vt aliqui, crithmon, fruticosa & vndique foliosa herbulæ est, cubiti altitudinem ferè petens. Nascitur in maritimis, & petrosis: foliis pinguibus numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, latioribus, & longioribus, salso gustu. flores candidi sunt, & semen, ceu roris marini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur. habet intus tritici modo nucleum: radices digiti crassitudine tres aut quatuor, grati odoris & iucundi. estur crudum coctumve in oler. seruat in muria. Aegineta, Crethmon falsum est simul & amarum, sed modicè, quare & vis ipsius est absterforia & desiccans. κριθμός.

CROCODILION chamæleontis nigri figuram habet. Nascitur in syluosis, radicem longa, læui, aliquantum lata, odore, vt a carline κροκοδίων.
Séblable
a carline

Quintum genus, odore nares feriens, sub-
 rufum, & cortice fulvæ casiæ simile, tangen-
 ti firmum, minus nervosum, densa radice fir-
 matum. Iis quæ thuris, casiæ, myrti, aut amo-
 mi odorem spirant, minus suavitatis inest.
 Deligito scabrum, album, rugosum. at læve,
 lignosum circa radicem, vt inutile, reiicito.
 Est etiamnum simile aliud, cui pseudocin-
 namomo cognomé est, vile inualidi odoris,
 solutarúmque virium. Vocatur etiam Zingi-
 ber, cum tamen sit xylocinnamomum, præ-
 bens quãdam cinnamomi faciem. Est autem
 lignosum cinnamomum, sarmenta longa ro-
 bustaq; ferens, odore longe cinnamomo in-
 feriore. Sunt qui xylocinnamomum, à cinna-
 momo genere differre dicant, quod à natura
 eius abhorreat. Est & quoddã cinnamomũ,
 quod aliqui pseudocinnamomum appellât,
 perquã denso atque crasso sarmento, longè
 tamè inualidius cinnamomo, & odore & gu-
 stu. Aeg. Cinnamomi vis est summè tenuis,
 non item æquè calida, sed tertij ordinis, nihil
 autem ex iis quæ parem ipsi calorem referūt
 adeò siccat, propter substantiæ tenuitatem.
 Cinnamomis autem vel pseudocinnamo-
 mum veluti inualidum quoddam cinnamo-
 mum est.

Langue
 de chien

CYNOCEPHALAEA eadem potest vi-
 deri antirrhino, vt mihi quidem videtur.)

CYNIA aut cynocrambe, cauliculum bi-
nūm dodrantum altitudine emittit, mollem,
subalbidum: folia mercuriali aut hederę simi-
lia, certis interstitiis subalbida. semen foliis
adheret. paruum, rotundum. Folia cum cauli-
bus pota, aluum cient, oleribus commendan-
tur. Ius decocti & pituita & bilem aquamq;
detrahit.

CYNOGLOSSON folia latifoliae plan-
taginis habet, arctiora, minora, lanuginosa:
caule vacat, & humi sternitur. prouenit in sa-
buletis. Contrita eius folia cum vetere sinillo
adipe, rabidorum canū morſibus, alopeciis
& ambustis medentur. Herba cocta & cū vi-
no pota, aluum mollit.

CYPRVS, quem aliqui eryſſiceptrū, vt
aspalathū appellāt, folia fert porraceis pro-
xima, sed longiora & exiliora: caulem odo-
rati iunci, cubitalem aut maiore, angulosum
in cuius cacumine minuta folia cum semine
exoriuntur: radices, quarum in medicina est
vſus, cohærentes inter se, oleis oblongis simi-
les, aut rotundæ, nigro colore, ſuaui odore,
amaro gustu. In lacunosis, palustribus & cul-
tis enascitur. Optima est grauissima, densa,
fractu contumax, plena & aspera, odoris
cum quadam acrimonia iucundi, qualis est
Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insu-
lis petitur.

κνπρος
ινδινη.

Aliud CYP I R I genus tradunt in India nasci, gingiberis effigie, quod manducatum crocivim reddit, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem psilothri vim exhibet. Aegin. Iuncus angulosus calfacit siccâtq; citra morsum, hinc etiam humidioribus vlceribus cicatricem mirabiliter inducit, ac oris vlcera persanat: habet & vim quandam incisoriâ, qua calculos comminuit, vrinâ & menstrua promouet.

κνπρος,
Troisne

CYPRVS arbor est oliuæ foliis circum ramos, latioribus, mollioribus, & virentioribus, flore candido, muscoso, odorato, semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope & Alcalone. Aegin. Cypri folia & surculi mixtis constant viribus, discutiète & astrictoria, tum ea quæ sine offendiculo & morfu siccet: ideoq; decoctum ipsoꝝ ambustis superfusum prodest, ac igneis inflammationibus congruit. Itē oris eruptiones, aphthas vocât, ipsa arbor commâducata persanat: item medicinis lieni dicatis miscetur.

κνκκία.

CIRCAEA, quam & dircæam aliqui vocant, foliis est hortensis solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine milij, nascente in quibusdam veluti corniculis: dodrantali radice, triplici ferme, aut quadruplici, candida, odorata, ex calfaciente. Nascitur in apricis, saxis, & vento perflatis. Aegin. Eius radix calida est, & odorata, quæ cum vi-

no pota fœminatum locos purgat: semen in
forbitione sumptum lac generat.

C I R S I V M, caulis est tener, duorū cu-
bitorum, triângulo similis: ab imo foliola, ro-
sæ speciem referentia: anguli spinosi, per in-
terualla molles: folia buglosso similia, maio-
ra, subcâdida, modicè hirsuta, partibus extre-
mis aculeata: cacumen caulis orbiculatū, hi-
spidum, in quo capitula purpurea, quæ sol-
uuntur in lanugines. Radicem huius loco la-
boranti adalligatam, dolores varicum sedare
Andreas scripsit. (Aeg. non meminit.

κίρσιον
off. lingua
bouis

C I S T V S, quem aliqui citharon, aut cî-
saron vocant, ramosus frutex est sed impro-
cerus, foliosus, saxosis locis nascens, foliis ro-
tundis, acerbis, hirsutis. flos masculino vt mali
punicæ, fœminæ albet. Hypocistis, erythra-
non, aut cytinus à nonnullis cognominata,
iuxta cisti radices nascitur, floris punici simi-
litudine. quædam flaua, altera virens, tertia
candida. Liquatur acaciæ modo. aliqui tamē
exiccant, fractamque macerant, & incoquūt,
reliquaque, vt in Lycio prosequuntur. Aegi-
neta, Frutex est astringēs, & modicè frigidus
virtute: folia ipsius & germina adeò siccant,
vt etiam vulnera conglutinent: at flores cum
in secundo ferè gradu sicciores sint, intesti-
norum torminibus, aliisque fluidis vitiis ac-
commodati sunt: extrinsecus illiti putrida vl-
cera compescunt.

κίσος
De garis-
cles

κὺτισος. **Grand treuille** **CYTISVS**, frutex est albus in totum, vt rhamnus, ramos spargēs cubito longiores, in quibus folia scœnigræci, aut loti trifoliæ, minora, dorso medio prominente. ea digitis trita crucam olent, gustatâque cicer sapiunt. Folia refrigerât. tumores inter initia discutiūt, si cum pane trita illinantur, decoctum potu urinam ciet. Nonnulli, quod a pes alliciat, prope aluearia serunt. Aegineta, Folia discutientis leniter & tepide nostræ sunt quemadmodum & maluæ.

κίτρον. **Citron** **CITRI** medium acidum, aut qualitatis expers, in quo semen est, tertij refrigerantium siccantiũque ordinis habetur. Cortex in secundo quidem abscessu siccat, sed non item refrigerat, acri virtute præditus. Caro ipsius crassi succi est, pituitæ generandæ apta & frigidæ, semen digerit & sic. 2. Folia arboris siccandi discutiendique vim repræsentât. Aegineta.

κλήμα. **Peruëca** **CLEMATIS** humi serpit, læto, pinguique solo prouenit, viticulas spargens crassitudine iunci, exiguas: folia lauri figura & colore, multo minora. Gignitur in terrenis. Aeg. Appellatur & daphnoides, myosinoides, polygonoides. Siccâdi virtute pollet, qua fluores alui quâ diarrhœam dicunt, intestinorũ tormina, & denarium dolores finit. Cõtra venenatorũ morsus rectè imponitur. Est & altera off. Volu clematis, quæ viticulosum emittit ramulũ, ru-

befcentem, lentum: folium gustu admodum bilis ma-
acre, ac exulcerans. repit per arbores, vt smi- ior. & Cā
lax. Aeg. Huius fructus cū aqua potus pituitā panella
& bilem per inferiora educit. folia ad lepras
arcendas illinuntur.

CLEMATIS tertia Plinio recensetur, cē- κλημα
tūculus Italis appellata, rostratis foliis ad si- τίστειται
militudinem capitis penularum iacēs, in ar-
uis. Est eius egregius, effectus, ad sistendam
aluum in vino austero. Idem sanguinē sistit
cū oxymelite, aut aqua calida. sic & ad secun-
das mulierum efficax. (Idem ferē gnaphali
effectus est, quod Romanis similiter centun-
culus appellatur, hinc fit vt quid differāt ad-
dubitem.

CLINOPODION frutex est foliis ser. κλινοπό-
pyllo similis, surculosus, duūm dodrantum διογ.
altitudine. nascitur in petrosis. flores matru- Forte q̄
bij modo, ex interuallis distincti speciem vulgo or
lecti pedum præbent. Aegin. Vis eius est ca- biculata,
lida siccaque, nondum vero adurens, sed ter- quā offi.
tij ferē ordinis. montanū

CLYMBENVM caulem fert fabæ, qua- pullegiū
dratum: folia plantaginis, folliculis supra κλύμε-
caulem in sese inflexis, vt in polyporum cir von.
rhis. Probatissimum est è montibus. Succus Sigiea
ex herba tota cum radice exprimitur refri- offi. Cy-
gerans, & omnes fluidas affectiones astrin- pria ou fa
gens. (Galenus & Aegineta indicatam reli- ponalis
querunt.)

qui agrestem bulbum vocant, autumnū exi-
tu florem edit croci, candicantem: ab eo tem-
pore, folia bulbi, sed pinguiora: caulem pal-
mo altum, ferentem rufum semen: radicē fo-
ris ē nigra rufescentem, quę delibrata, candi-
da & mollis spectatur, lacteo succo madet, at
que gustatu dulcis inuenitur. bulb⁹ eius me-
diam habet rimam, fissuramque, qua flos erū-
pit, plurimum in Messenia, & Colchis enasci-
tur. Ea comesa, fungorum more, strangulan-
do enecat. Hanc autē depinximus, ne à quo-
quam imprudēter pro bulbo deuoretur: mi-
rum enim in modum saporis voluptate im-
peritos allicit. Remedio sunt eadem quę fun-
gis. bubulum etiam lac potū auxiliatur. itaq;
cum adfuerit, non aliud desideratur auxiliū.
(Aegineta nihil adiecit quā eius alexiphar-
maca.

Canine-
ca. offici.
hermo
dactyli.

COLYCEA arbor circa Idam prouenit,
alioquī rara inuentu, fruticosa, ramosa; &
multis alis concaua. folio vlmī, longiore, fa-
tis ad latifolię laurus accedēte, sed ampliū-
culo & rotundiore, suprà viridi, infra cano,
neruoso; præ tenuibus neruulis fibris; de
medio callo in costarum speciem adductis.
materiæ solida, cortice non læui & quasi vi-
tigineo vestitur. Radicibus per summa gra-
cilibus, & solutis, cæterum fibratis, & mirum
in modum flauis. Sterilis & flore vidua, surcu-
los tamen gemmasque circa folia pingues;

κολυκιάς

laues, candidos, amēntācea facie fundit. Precisa, vel ignibus exusta, ab imis rediuiua resurgit.

COLYCEA alia est apud Theophrastum, folio salicis, comosa, ramosa, in totumque ampla, valuulis leguminum more non angustis, in quibus semen latum, paruum, durum non nimis, nec abunde pro magnitudinis ratione frutificat. (Hanc aliqui Plinio staphylo dendrum dici existimāt, de qua suo loco.

κολυτρία
Bague-
naudier.

COLYTEA Liparæ peculiaris à Theophrasto traditur. Arbor magnitudine præstās fructum ferens in siliqua, magnitudine lentis, qui mirum in modum oues saginet. Nas citur semine & fimo præcipue ouillo. Serendi tempus, cum arcturus occidit. Mādari solo debet præmaceratū, cum iam in aqua germinare cœperit. foliū mittit scœnogræco nō absimile. Arbor primū vnicaulis emicat, tria cōcidendis scipionibus & baculis idonea. Si quis nimis decurtauerit mox emoritur, quippe quæ lateribus haud quaquā fruticet: spargitur deinde in ramos, quadrina prorsus abhorrescit. (Si hæc arbor est quā Mauritani Sene vocant, siliquosus eius fructus denarii pōdusculo potus pituitam & bilem deiicit. Retorridā atramq; bilem earūmq; suffusiones ex gallinaceo iure depellit. Vetus to capitis dolori, scabiei, comitialibus, impetigini

succurrit. Sed ius potius feruefacti, quàm triti farina p̄pinatur. pulueris modo drachma, indecocto semuncia. interancorum obstru-
ctiões explicat. (Actuarius.)

COMBRITVM baccari simillimū traditur, nisi quod procerius est, foliorum exilitate vsque in fila extenuata. Hoc totum cū axungia vulnera mirificè sanare.

COLOCYNTHIS sarmenta foliâq; satiuī cucumerisemittit, per terram repētia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer amarum: quem legere oportet, cum cœperit in pallidum colorem permutari. Aegineta, Cucurbita sylvestris validâ purgandi vim obtinet: viridis ipsius succus infricatus coxendicum doloribus auxiliatur.

CONYZAE duo genera, quæ parua vocantur, odore præstantior est. maior verò fructu altior & foliis latioribus, graui odore. ce ou ci-
vtriusq; folia oliuæ similia, hirsuta, pingua. micaria.
in maiore caulis binū cubitorum altitudine attollitur, in minore pedem equat flos fragilis, lutei aut fului coloris, qui in pappum abi, tradices superuacue. Est & tertium conyzæ genus, caule crassiore, ac molliore: foliis quàm paræ maiusculis, minimè pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & iniucundioris, sed inefficacior. Prouenit locis riguis. Aegineta, Conyza vtraque Cal. sic. 3.

tota domo blattas conuenire ad eam.

ches ou

CORIANDRVM aut corianum vulgari-
 nis est notitiæ. Aeg. Ex contrariis viribus cō-
 positum est, tenuis substantiæ, terrenæ, ama-
 re, aquosæque humiditatis tepidæ particeps.
 Habet modicā vim astringendi, quapropter
 inflammationibus, cysipelatis nō admodū
 feruentibus cōuenit. Tumores molliusculos
 cum aliquo in idem efficaci, discutit. Semen
 modicè quidem cum passō bibitum, lumbrici
 cos pellit, libeeralius autem sumptum men-
 tem tentat.

des clo-
 chettes.

Herbe en
 censiere.

κόριον.
 coriandre

CORIS, quod aliqui hypericon vocant,
 frutex est foliis ericæ, rubro, pinguiore, ac
 minore, non altior dodrante, suauis, odora-
 tus, acris. Aegineta, Semen eius ad vrinam &
 menses ciendos bibitur. Succurrit & phalan-
 giorum morfibus, item ad opisthototon cū
 oleo inungitur.

κόρις.
 Milleper-
 tuis, ou
 herbe S.
 Iehan.

CORNVS dura arbor est, baccas ferens
 oliuæ modo oblongas, quæ primum virent,
 dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ co-
 lorem repræsentant. Muria, vt oliuæ, condiū-
 tur. Sanies quam virentia folia torrendo resu-
 darunt, impetigini conuenienter illinitur.
 Aeg. Corni fructus acerbus, si edatur, validè
 vëtre astringit. Folia autem & germina a-
 cerbitate vehementer siccant, adeò vt maxi-
 mis durorum corporū vulneribus glutinan-
 dis sint.

κράνιος
 Cormier
 ou corni-
 er.

περών-
πες.
Capriole
ou sagui-
naire, ou
dent au
chien.
κόςος.
Du coq.
ou herbe
de nostre
Dame.

CORONOPVS oblonga herbulæ est,
per terram repens, fissis foliis. coquitur in o-
lere, radicem habet tenuem, abstringentem,
quæ in cibo cœliacis facit. Pronenit in agge-
ribus, & locis incultis, & secus vias. Idem a-
pud Paulum nisi quod κολινός πρὸ κοιλάκ-
κόςος perperam legitur.

COSTVS præcellit Arabicus, can-
didus, levis, eximia odoris suauitate. Secun-
dū locum sibi vendicat Indicus, levis, vber,
vt ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis,
colore buxus, & odore feriens. Optimus
est recens, albus, abundè plenus, densus, a-
ridus, à teredinibus non erosus, sine graueo-
lentia, gustu calidus ac mordens. Sunt qui
admittis helenii comageni præduris radici-
bus, adulterent. quod deprehensu facile est.
siquidem neque gustu feruet helenium, ne-
que validum odorem vibrat, vt caput tenta-
re possit. Aegineta, Costus modicum qui-
dem amaritudinis, plurimum verò acris &
calidæ qualitatis habet, idoneus si quam sit
opus particulā calfacere, vel ex alto in sum-
ma humorem aliquem elicere. Vrinam &
nientes ducit, lumbricos enecat. Quam ve-
rò & flatulenti cuiusdam particeps sit, vene-
rem cum mulso potus stimulat. Coxendi-
cum doloribus, resolutis, febrium rigori-
bus ante accessiones, cum oleo infricatus,
conducit.

COTONEA mala & struthia frigido ac
terrestri donata temperamento, ventrem sup
primunt, vulnera glutinant. Aeg.

κνδώνιο.
Coins.

CRATÆOGONVM, siue vt aliis
placet, cratægonon, foliis melampyro simi-
le est, multis calamis ex vna radice emican-
tibus, multorumque geniculorum. semine
mili. nascitur in opacis & frutetosis, sum-
mopere acre. Eadem apud Paulum, sed fri-
gidum semen esse adiicitur, corrupta, ni
fallor, lectione: aliter enim apud Galenum
legitur.

κραταίο-
γονος.
Curage

CRITHMVM, seu potius, vt aliqui, cri-
thamon, fruticosa & vndique foliosa herbu-
la est, cubiti altitudinem ferè petens. Nasci-
tur in maritimis, & petrosis: foliis pinguibus
numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, la-
tioribus, & longioribus, salso gustu. flores
candidi sunt, & semen, ceu rorismarini, odo-
ratum, molle, rotundum, quod siccatum rum-
pitur. habet intus tritici modo nucleum: ra-
dices digiti crassitudine tres aut quatuor, gra-
ti odoris & iucundi. estur crudum coctum ve
in olere. seruatur etiam in muria. Aegineta,
Crethmon falsum est simul & amarum, sed
modicè, quare & vis ipsius est abstersoria &
desiccans.

κριθμός.

CROCODILION chamæleontis ni-
gri figuram habet. Nascitur in syluosis, ra-
dice longa, lzui, aliquantum lata, odore, vt

κροκοδί-
λιον.

Séblable
a carline

nasturtii, acuto. Semē ei rotundum inest, duplex uti scutum. Aegineta, Semē & succus calidam, siccam, & discutientem vim præ se ferunt, urinas itaque & menses mouent. Radix excreationes ē pectore iuuat, item sanguinē per nares ducit.

κρόκος.
Safran.

C R O C U S, optimū in medendi usu Coryceum, recens, & boni coloris, paulum candidi gerēs in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile, plenum, à quo detractum est nihil, quod madefactū manus inficit, nec situm redolet, aut cariem sentit, subacre: si huius generis non est, aut vetus, aut humore perfusum creditur. Secundus locus datur Coryceo, ē tractu Lyciæ cōtermino. Tertius Lycio ē monte Olympo. dein ex Aegibus Aetolię: Cyrenaicū & Centuripinū in Sicilica omnia viribus infirmius est. Omnium natura oleracea. Itali tamē ob succi copiam, & coloris venustatem, tingendis mortariis dicauerūt, quibus de causis magno venditur. Vtilissimū in medicina quod ante descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuso, atque etiam sapæ sublitur: contrita, quò pondus adiciatur, simul argēti spuma, aut blumbagine. sed maleficium declarat insidens puluis, præsertim si defrutum in odorando subolet. Aeg. Crocus Cal. 2. sic. i. astringit & concoquit.

C R O T O N, quære Ricinus.

CYCVBRITA

EVCVRBITA humidi frigidique in secundo abscessu temperamenti est, unde tota si imponatur, calidas refrigerat inflammationes.

CVCNMIS esculentus quidē viridis refrigerat humectatque in 2. ordine, caro ipsius feruidas solatur inflammationes. Semen abstergendi incidendique virtute præditum, urinas mouet, & corpus nitidum efficit. Aridus siccatur in 1. ordine, vehemētiusque abstergit, & semen, & radix.

CVCVMIS sylvestris fructu solo distat à satiuo cucumero, quem longē minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem. folia atque sarmenta satiuum refert: radice candida, magna nascitur in sabuletis, & ruderibus, frutice in totum amaro. E fructu huiusce cucumeris, fit medicamentum quod elaterium vocatur, ad hunc modum: Decerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruantur nocte una: postridie imposito supra craterem rariore cribro, utrisque manibus prehensi, sigillatim supino cultro, sursum versus aciem habente, finduntur, atque per cribrum humor in subiectum vas exprimitur, simulque carnosum quod hæsit cribro, quod facilius excidat, eliditur. quod ita pressum est, residere finitur, atque in vicinam peluim demittitur. coaceruata autem in cribro segmina, dulci aqua perfunduntur, & denuo pressa abiici-

κολοκύν.

θη.

Courge,

ou co-

hourde.

σίκνος.

Cōcōbre

σίκνος

αγριος.

bitaticus

ελατόρι.

ον.

untur. humor in pelui agitur, & linteo oportus, soli exponitur. dumque steterit, tota supernatans aqua cum humore concreto, effunditur. hoc verò identidem fieri solet, donec existens aqua liquecat: qua stillatim exhausta, sedimentum mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam, cribratos cineris humi inspargant, & medium cauantes, triplicatum linteum obtendant, per quod elaterium cum sua humiditate diffundunt, siccatumque, in pila, ut dictum est, conterunt. Aliqui pro dulci aqua marinam perfundentes, ita eluunt. Alii in nouissima lotionem, mulsam aquam respergunt. Elaterium optimū esse constat, laue, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quodque lucernarū luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum tamen scabrumque, si turbidum spectetur, atque erui cinerisque plenum sit, graue & vitiosum esse solet. Nec desunt qui cucumis succo amyli immisceant, ut candorem ipsum & leuitatem imitentur. A bimatu ad decennium deiectionibus vtile est. Aegineta. Cucumeris syluatici radix detergit, dissipat, emollit. Succus sic candi vires habet, qui videlicet radice & foliis expressus elaterio similis, sed imbecillior est. Elateriū autē cal. 2. menses prouocat. fœtus appositus propter summam amaritudinē

necat. euacuationē ex naribus cum lacte instillatum molitur. Clystere iniectum pituitā nonnunquam etiam sanguinem extrahit.

CUMINUM satium ori gratum est: sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates regiū appellauit. secundum locum tenet Aegyptium: reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisque aliis tractibus.

Sylvestre **CUMINUM**, plurimum effiaciūsq; in Lycia & Galatia, Asia, atq; Carthagine Hispanię gignitur: fruticē paruo: drantali caule, ac tenui, quaternis aut quinis foliis tenuibus, veluti serratis, & gingidii diuisura in cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda, in quibus est semē acerosum, gustu satiuo acriore. nascitur in colibus. Est & aliud sylvestris cumini genus, satiuo non dissimile, quod à singulis floribus pensilia promit cornicula, in quibus semen est melanthio simile: quod porum omniū serpentium moribus præsidio est. calculosis & iis qui vrinæ stillicidio vexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur. sed apii semen feruesfactum postea bibendum est. Aegineta: Cymini calefacit tertio. Vrinam mouet, flatu discutit.

CYPRESSVS refrigerat & astringit. Aegineta: Cupressi galbuli & turiones siccati viribus pollent, nullo calore conspicuo:

quapropter vulnera magna in duris corpõ-
bus conglutinant, & in flaccidis putridisque
vulceribus in alto fixas humiditates citra no-
xam depascuntur, intestinorumque ramici-
bus opitulantur.

Sariete, C V N I L A mollis ramis ac foliis, hispida
ou chen- lanugine obducitur, tritæque mellis habet o-
dree faul dorem, digitis tactu eius cohærentibus.

uage, ou
cunilage

Δαφνισ-
δης.

Laureole

D

A P H N O I D E S cubiti altitudi-
ne fruticat, ramis flexilibus obse-
quiosisq; multis, inde sursum ver-

sus foliosis. cortex supra modum viscosus ra-
mos vestit. folia lauri, graciliora, & mollio-
ra, fractu contumacia, quorum gustatu os
& fauces incenduntur: flores candidi: bacca
cum maturuit, nigra: radix inutilis. nascitur
in montosis. Aëg. Laureola eiusdem faculta-
tis est cum laure Alexandrina.

D A M A S O N I O N, quære Alifina.

δαυκος.
Carote
fauluage
oupanez

D A V C V M aliqui Daucium vocant. Cre-
ticū foliis fœniculo simile, minoribus & te-
nuioribus: caule dodrantali: umbella corian-
dri, flore albo: semine acri, candido, hirsuto,
suauissimi odoris in mandendo. radix digi-
tali crassitudine & dodrantis longitudine a-
dolescit. in saxosis nascitur, & locis sole illu-
stratis. Aliud eius genus, sylvestri apio simi-
le, acre, odoratum, aroma olens, feruētis gu-
stus. Probatissimū Creticum. Tertiū assigna-

tur genus foliis coriandri, floribus albis, capite & semine anethi, muscario pastinacæ: semine oblōgo, ceu cumini, acris. Aeg. Daucus qui & staphylinus dicitur, hortensis quidem radice flatulenta est, & venerē mouet itemq; semine. Syluestris autem semen minimē flatuosum est, sed vrinam & menses citat, vt & herba ipsa, inefficacius tamen. Sed hæc magis ad pastinacam Dioscoridis quàm daucū faciunt.

DELPHINIUM, surculos emittit à radice vna sesquipedales, aut maiores, à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, prælonga, quæ delphinorum effigiem repræsentant, unde tractū nomen est. flos violæ albæ nō dissimilis, purpureus: & semen in siliquis, milio proximum, quo nō aliud vtilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta herba, scorpiones resolui, atque ignauos torpescere: semota verò ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis, Alterū est delphinium, quod Romani bucinum vocant, superiori simile, sed foliis & ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus. (Non habetur apud Aeginetam.)

DICTAMNVM, aliquibus syluestre pulegium vocatur. Cretensis herba est acris, leuis, pulegio similis, sed maioribus foliis, quæ tomento quodam spissaq; lanugine pubescunt, florem nullum aut semē profert.

Δελφίνιον.
ov.
fili^o ante
patrē, a-
liis bucci-
naria.

Δικταμνον.
Diptera ou-
gingēte
du iardin

ψευδοδι Quod pseudodictamnium vocant, multis in
αμνος. terris nascitur, antè dicto simile, sed minus
 quàm illud acre. Eisdem effectus præbet, sed
 inefficacius multo. Defertur à Creta alterum
 dictamni genus, foliis sisymbrii, ramis maio-
 ribus: in quibus flores sylvestris origani, ni-
 gri, molles. odor foliorum inter sisymbrium
 & saluiam iucundissimus. Efficax ad eadem,
 sed minus nares ferit. miscetur emplastris, &
 & medicaminibus quæ aduersus serpentium
 iniurias confinguntur, theriaca vocant. Aeg.
 Tenuius est partibus pulegio, cætera simile.
 imbecillius autè est pseudodictamnion.

διόσπυ- D I O S P Y R O S vel diosporos arbor
ρος. fructum habet ceraso similem, duro intus nu-
 cleo. Theophrast.

διψακος. D I P S A C V M aculeatarum generis est,
chardon caulem habet altum, spinis horridum, foliis
ε foullon lactuæ, spinosis, binis, genicula singula cõ-
 plectentibus, prælongis, ceu quasdam bullas
 intus & extra aculeatas, in dorso medio habé-
 tibus, cõcauo alarum sinu, in quo imber aut
 ros asseruetur. vnde dipsaci, quasi sitiétis, no-
 men traxit. in cacumine caulis, singula surcu-
 lis capitula insunt, oblonga, echinata spinis.
 quæ arefacta, candida spectantur, dissectâq;
 medulla tenuis, vermiculos ostendunt. Aegi-
 neta: Huius spinæ radix ficcatur secundo, cum
 aliqua abstergendi vi.

δωδεκά- D O D E C A T H E O folia septem lactucis
ρος.

similia exeunt à radice lutea. in aquā potam omnibus morbis mederi tradunt, item malis quæ membratim sentiuntur: neq; non iis quæ totis corporibus grassantur.

Moly hō
meri.

DORYCNION Crateuas halicacabon, aut calcā vocat. frutex oleę nuper prodeūtis, similis. nascitur in petris, non procul à mari, ramis cubito minoribus, foliis oleę similibus colore, minusculis, firmioribus præter modum scabris: flore candido: siliquis in cacumine, ceu ciceris densis, rotundis, quinis intus aut senis seminibus, exigui erui magnitudine, lævibus firmis, versicoloribus, radix ad digiti crassitudinem & cubiti longitudinem adolefcit. id somniferum esse constat. Copiosius haustum mortē adfert. Nec defuere qui dicerent, semen in amatoria expeti. Aegineta, simile temperamēto est papaveri & mandragoræ, immodicè refrigerās. Quod si parcè sumatur torporem inducit: copiosius, interimit.

δρυκνιον
ov.

DRABA herba ad cubiti altitudinē assurgit, tenues spargens ramos, & ex utroq; latere folia, ceu lepidii, sed molliora, & cādidiora in cacumine verè sambuci umbellam gerit, candidos flores habentem. Herba hæc cū ptisana coquitur, in Cappadocia maximè. semen aridum pro pipere obsoniis admiscetur. (Aegineta præterit.

δραβη
draue ou
cumin
sauuage

DRACUNCYLUS folio constat he-

δρακον
τιον.

offi. serpe- deraceo, magno, candidis notis insigni: cau-
 taria & co- le recto, bicubitali, versicolore, maculis re-
 lubrina, sperso purpureis, ita vt angue planè referat,
 aliis lin- baculi crassitudine. fructus summo caule ra-
 guacerui cematim cohæret, colore primum herbaceo.
 & cum ematuruit, croceo, gustu feruens,
 mordaxque. radice aliquantulum rotunda,
 bulbosa, aro nō absumili, tenui obducta cor-
 tice. Nasctur in sepibus vmbrosis. Aeg. Simi-
 le quiddam aro habet, sed eo acrius, amarius
 calidius, tenuiùsq; est, cū adstrictione nōnul-
 la. Radix ipsius pota viscera purgat, & perui-
 caciū seu malignorum vlcera excellentissi-
 mum est remediū: ex æquo etiam folia, fru-
 ctus valentior est.

δρυόφο-

vor.

offi. myr-
 tus nemo-
 ralis, cusi-
 nes rura.

D R Y O P H O N Y M olus sylvestre filiculā
 siue dryopterim specie æmulatur, ramulis si-
 ue cauliculis tenuibus sesquipedalibus, quos
 circūdant vtrinq; folia, pollicari amplitudi-
 ne rusco similia, nisi quod teneriora sunt &
 candidiora, flore sambuci lacteo, semine gu-
 stu mordaci, vnde eo vice piperis vtūtur, co-
 quūntq; cauliculos in cibis admodū gratos.

δρυόπτε-

ρις

Arborea
 osmūdu-
 la.

D R Y O P T E R I S nascitur in veterū ro-
 borum musco, filici similis, multo minore fo-
 liorum incisura: radicib⁹ inuicem implexis,
 hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem vergē-
 tibus. Aeg. Dulcis, acris, & leniter amara est:
 cæterum vim habet exedentem, qua & pilos
 abolet.

DYLCIS radix plurima gignitur in Cap padocia & Ponto. fruticosa est ramis binum cubitorū altitudine assurgentibus: foliis lentisci, densis, pinguibus, tactūque gummosis: flore hyacinthi: fructu pilularū platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas lentū modo habet, rufas & paruas: radicibus longis, vt gentianæ, coloris buxci, subacerbis & dulcibus, quæ desantur in succum, lycii exemplo. Aeg. Tepidi humidique, temperamenti est, ali cuius etiam astrictionis particeps, eoq; non modò fauces exasperatas lauiat, sed etiam vesicæ scabiei medetur: eadem sitim arceat.

E

BENVS optima habetur ethiopica & nigra, nullos habens venarum discursus, factitii cornu læuore. cū frangitur densa apparet, mordens gustu, atq; astringens. suffitur iucundo odore supra carbones sine fumi tedio. recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinē accenditur, & trita ad cotē flauescit. Altera est indica, internatis segmentis candicantibus, & modicè fuluis, item frequētibus maculis. cæterū prior bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna cōsimilia pro ebena vaneunt. quod discernitur ex eo, q̄ fungosa sunt, & in purpureas assulas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentiz in suffitu præferētia. Aeg. Ebeni ligni vis

γλυνεῖ
ρίξα.
off. ligui-
ritia rigo
lisse ou
erculisse

ἔβινος
Eucne

similes, & semina eiusdem: florē subluteum: radice ternum digitorum longitudinis & crassitudinis vnius, candida, dulci, esui apta. Caulis tener pro olerē manditur. contra serpentium iactus datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo, ceruas serpentium moribus resistere. Aegineta, Cal. sic. 2. Substantia est tenui.

ELATINE folia habet helxine, minora, ἐλατίνη
 rotundiora, pilosa: dodrantalibus ramulis, Capestro
 quinis senisve, à radice foliosis, gustu astringentibus. nascitur in segetibus & cultis. Aegineta, Mediocri est frigiditate, & astrictione donata. ραπίστρου

ELEOSELINVM in humidis nascitur, ἐλεοσέλα
 satiuo grandius, & ad eadem efficax. Aegineta, Palustre apium idem potest quod hortense. νον.

ELICHRYSON quidā chrysanthemon, Egrun
 nonnulli & id amaranton vocāt, quo deorū perfil
 simulacra coronant: ramulum habet candidum, virentem, rectum, firmum: folia intercedentibus spatiis angusta, abrotono similia: ἐλίχρον
 comam aureæ lucis, in orbem, umbella rotunda veluti siccis corymbis dependentibus, radice tenui. nascitur in asperis, & torrentium alueis. Aeg. Eius coma cum vino pota urinæ angustis, serpentium moribus, coxarum dolori, & ruptis accommodata est: menses educit, sanguinem coactū ex mulso pota σος.
Chanosū
maius.

dissoluit, & destillationibus auxiliatur.

ἑμπέτρον
Saxifra-
ga.

EMPETRON aliqui phacoides vocant, nascitur in montibus, & maritimis, falso gustu. sed quo propius terreno fuerit, amarius sentitur. Aeg. Pituitam & bilē purgat. Est etiā falsum, quare absterisionibus accommodatur. (Cognomen eius prassoides apud Paulū legitur, non phacoides.)

ἑννεάφυλλον.
λόν.

ENNEAPHYLON herba Plinio folia longa nouem habet, causticæ naturæ. in lumborū doloribus, & coxendicum imponitur vtilissimè: continuò enim pustulas excitat.

ἑφῆμερον.
Μούσγετ

EPHEMERON, aliqui syluestrem irin appellant, folia habet lilij, sed tenuiora: caulem parem, florem candidum, amarū: semen molle: radicem vnā digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam. nascitur in syluis & opacis. Aegineta. Mistæ potestatis est & repellentis, & discutientis per halitum. (Ephemerum venenosum in Colchico depingetur.)

ἑπιμήδιον.
Epime-
dic

EPIMEDIUM, caulis est non magnus, hederæ foliis, denis atq; duodenis, neq; florē neque fructum ferēs, radice tenui, nigra, graui odorē, gustu fatuo. nascitur in humidis. Aeg. Virtus eius est mediocriter frigida cum humiditate aquosa: quod si illinatur, mammas rectas conseruat. dicitur etiam sterilitatē potu facere.

ἑπιπакκίς.
τίς.

EPIPACTIS ab aliis helleborine, par-

uā herba, fruticosa, exiguis foliis. Iocinoris vitiis utilis, & contra venena pota. Idē Aeg.

EPITHYMON, flos est è thymo durior. *ἐπίθυμον*
re, saturiæ simili, capitula habet tenuia, & le-
uia, & in eis caudiculas, quasi capillamenta.
plurimū in Cappadocia, & Pamphylia gi-
gnitur. Aeg. Cal. sic. 3. thymo efficacius. *ἱπποστι-
κάμῃλλα*

EPIROTICA mala, quæ latinè orbicu-
lata dicuntur, stomacho utilia, sistūt aluum,
vrinas euocant, malis tamen cotoneis inua-
lidiora.

EQUISETVM in riguis, & scrobibus na-
scitur. cauliculi prodeunt inanes, geniculati,
in se facti, rubescētes, scabri, & iuncea circa
eos folia, crebra, exilia. in sublime equisetū
attollitur, vicinos arborū caudices scandens,
obuolutūmq; depēdet, comis multis, nigris,
vt equorum cauda. radix lignosa, dura. Alte-
rum equisetū caulis est rectus, cubitalis, aut
maior inanis. comis per intervalla breviori-
bus, candidioribus & mollioribus. Id cū ace-
to tritū vulneribus remedio est, eadēmq; fun-
gitur facultate. Aeg. Hippuris astringentē cū
amaritudine facultatē possidet, eōq; valēter
simul & sine morfu desiccet. vulnera maxi-
ma committit, intestinorum ramicibus opi-
tatur, & vitiis fluore infestantibus cū vino
pota medetur.

ERICA fruticosa arbor, myricæ similis, *ἑρική*
longè minor. cuius flore apes reprobum mel Bruiyge

efficiunt, tam flos quàm coma serpentiũ iſti-
bus illitu medetur. Aegineta, Vi pollet discu-
tiente citra roſionem, flore ipſius potiſſimũ
& foliis vtendum.

ἑρῦγγιον
Centum
capita.

ERYNGION aculeatarum generis eſt.
Cuius folia in principio, ſale cõdita, in cibos
recipiuntur. lata autem ſunt, & extremo am-
bitu aſpera, guſtu aromatica. Eryngio, cum
adoleuerit, complures ramulorum ſtrix ſu-
bêt, in quorũ ſummitatibus globosa capitu-
la, durarum acutiſſimarũque ſpinarum am-
bitu ſtellarim circumuallantur, quorum co-
los aliàs viridis, aliàs albus, interdum cœru-
leus inuenitur. radix oblonga, lata, foris ni-
gra, internè candida, pollicis craſſitudine,
odorata. Naſcitur in aſperis & campeſtri-
bus. Aegineta, Calfacit quidem non manife-
ſtò, ſiccitatis autem haud obſcure nec modi-
cè particeps.

ἑρινος.
Herbe a
λακτοῦ
ocimum
aquatile.

ERINVS naſcitur apud fontes & fluuios,
foliis ocimi, ſed minoribus, parte ſuperna di-
uiſis, quinis, ſenĩſve, dodrantalibus ſurculis.
flore candido, ſemine nigro, & acerbo. folia
& caules lacteo ſucco turgent. Aeg. Eius ſemi-
nis denarij duo cum mellis denariis quatuor
illiti, oculorũ fluxiones ſiſtunt: ſuccus aurũ
doloribus benefacit. Alibi de echino ſcribit,
herba repellente & ſiccante ob ſuam acerbĩ-
tatem, eadem autem erino videtur.

ἑριφία.

ERIPHIA ſeptem lanuginofis ramuliſ

apii modo foliat, purpureo flore, & eo quidem perenni, semine fabaceo, totidem radiculis quot ramis. Hanc magi prodidere in a uena scarabum habere, sursum deorsumque decurrentem, cum sono hædi unde nomen accepit. Hac ad vocem præstantius esse nihil tradiderunt.

ERYSIMVM cereale, vel irio, culmo cō ἐρύσιμον
surgit ferulaceo, foliis sesamæ similibus san- σιτῶδεις
guineis, flore sesamæ foliaceo, prorsus idem Ircon ou
erat, nisi pinguis esset. Fruges est æstiuæ, & ante velaron
te Vergiliarum exortum seritur. Italiæ ritu, alioqui in Græcia & Asia earundem o. casu. Recēs sato irioni pluuus imber nocet, quam reliquis frugibus pdesse credatur: quo virēte sicuti sesama, nullum animal vescitur, quod amarus sit. Gale. Erysimū corporis coalitu sesamo vicinū, sed insuauius longe esu, tenuis alimenti, in omnibus ipso deterius, ut panicum milio. Vtrunq; tamen calidum est, sitimque cibo concitat.

ERYSITHALE foliis est acanthi, luteo ἐρύσιθα-
flore. datur in vino contusis & euersis. λίσ.

Cruda **ERVCA** venerem largiore cibo ἐρυκαμορ
concitat. semen eodem effectu prodest. urinā Erucque
cit, cōcoctioni prodest. aluo perquam cōmo ou ro-
data. semine ad cōdimenta vtuntur. quod, uti quette
in longū tempus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum syluestris cruca, maximè in Iberia, que

occidentem spectat, cuius semine pro sinapi incolæ vtuntur. urinam vehementius pellit, multo satiuâ actior. Aeginetæ. Eruca similis erysimo est, temperamēto flatulēta, ob quod ad venerē instigat. semen ipsius urinā quoque mouet. Sylvestris domestica valentior est.

ωχρὸς.
Non est
hæc du-
rille vul-
garis

ERVILIA genus est leguminis, folio quæ faba longiore, flore apibus gratissimo, ideo circa alucaria feri præcipiunt. Eisdem quibus lens pinsetur modis. At eruilia sylvestris herba est, amaritudinis eximia, colore & folio cicerculæ, quanquam minore.

ῥεβος.

ERVUM paruus frutex omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in valuulis habēs, è quibus farina fit, nomine eruina, ad medendi vsus conueniens. Parandæ farinæ ratio hæc est: vberiora grana candidaque deliguntur, permiscendoque aqua resperguntur, donec sufficienter combibant. postea torrentur, vsque dum hians cortex disrumpatur. molitæque, farinatio cribro incernuntur. postremo farina recōditur. Aeg. Eruum cal. 1. sic. 2. cum amaritudine, quapropter incidit, detergit, obstructa aperit: liberalius sumptū, sanguinem per urinam expellit.

πλατύ-
φυλλος.

ESCVLVUS, vel æsculus inter glandiferas folii amplitudine præstat. Hinc Græci platyphyllon, id est latifoliam vocāt, vt quibusdam placet fago proceritate & glande inferior est. Galla visu quidē quernæ nō dissimiliss

nisi quod lenior, sed ad rem nullam utili: verum alteram nigram habet, qua lanæ inficiuntur. Fert glandem hispido calyce, grandæ, bonam, fungosam, carnem fieri ea tradunt. Folium graue, carnosum, procerum, sinuosum lateribus. Quantum corpore eminet, tantum radice descendit. Autumno reddit fructum, si Vergilio credimus. (Per multa quæ assignantur latifoliae tam à Theophrasto, quam Plinio, in esculo etiam inueniuntur: quapropter si non eadem sit, ab ea tamen non multum diffidet.)

E V O N Y M O S, aliqui anonymon vocant, quum alibi, tum in Lesbo insula proueniens, punicae mali magnitudine, atque folio eiusdem, maiori quam vinca peruinca, & ut punica tenero. flore albæ violæ proximo, odore graui ac pestifero, folliculis sesami, in quibus acinus quadrangulus, solidus, siue spissus, qui in versus quaternos digeratur, pecori gustatu letalis, sed & capris præcipue mortifera sunt & folia, nisi præcipiti alui deiectione succurratur. Germinat mense septembri, floret vere. Arbor est infelix.

E V P A T O R I V M, fruticosa herba est, vnicum efferens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitale, interdum ampliorem: foliis per intervalla quinquefolii, aut cannabidis magis similibus, quinquepartito aut amplius diuisis, nigricantibus, herbari-

orū q̄ est per ambitū serratis. semen medio caule erū-
 hydropi pit pilosum, deorsum spectās, quod siccatum
 per vestibus inhæret. Nec desunt qui aberrantes,
 argemonei hanc appellarint, cum tamē lon-
 gē alia sit, vti exposuimus. Aegin. Tenuem
 vim & incidentē sine cōspicuo calore habet,
 qua iecur obstruētum expurgat, est & nōnul-
 lius astrictionis particeps.

*in phis-
 6107.*

EUPHORBIA Libyca arbor est, ferulæ
 speciem habens, quę in monte Atlante iuxta
 Mauritaniā inuenitur. ea acerrimo succo tur-
 get, cuius eximium feruorem expauescentes
 incolæ, ouillos vêtres elutos, arbori circumli-
 gant, & eminus caulem contis incidunt, con-
 festimque ē plaga, perinde atque vase quo-
 dam, in ventriculos copiosus lactis humor ef-
 fluit, præter id quod humi sparsum, vulnus
 eiaculatur. Duo succi genera, vnū orobi ma-
 gnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterum
 in ventriculis concrefcit, atque vitreū specta-
 tur. Eligendū est translucens, & acre. Euphor-
 biū adulteratur sarcocollæ & glutini mistio-
 ne, sed difficile quidem experimentum, quip-
 pe cum leui gustu, os accēsum diu detineat,
 adeo vt quicquid ori obiiiciatur, planē eu-
 phorbium resipiat. Eius inuētio tempore Lu-
 bæ regis Libyæ cognita extitit. Aegin. Adu-
 rentem vim sortitum est subulēmque, aliis hī
 quoribus similiter.

F

FABA non multū à medio tēpe-
ramēto recedit, siue refrigerādo κνῆμοσι
siue siccādo: caro ipsius nōnul- Fœtus

lius etiā absterforiæ qualitatis est, excreatio-
nibus è thorace & pulmonibus utilis. Quū
autem cortex fabæ nonnihil quoque astrin-
gat, tota ipsa in posca decocta cœliacis & dy-
sentericis conducit, illita verò inflammatio-
nibus & tumoribus medetur, lac in mammis
extinguit.

Aegyptiā FABA, quam aliqui Ponticam κνῆμοσι
vocant, in Aegypto plerunque prouenit. in ἀιγύ-
πτιος.
Asiæ etiam Cilicięque lacubus inuenitur. Fo-
lia habet ampla, etiam si ad arborū frondes
comparentur: caulem cubitalem, digiti crassi-
tudine: florem roseum, dupla papaueris am-
plitudine. & vbi flore exuitur, fert folliculos
vesparum fauis similes, in quibus faba supra
operculum, bullantis ampullæ modo, pro-
minet. Cibotium ideo nominant, id est arcu-
lam, quoniam seratur ipsa, humenti glebæ
mandata, & ita in aquam demissa. Radice fir-
matur harundine crassiore. quę cruda coctā-
ue estur. ei colocasiæ nomen est. Faba vi-
rens manditur, & exiccata nigrescit, vul-
garem magnitudine superat. Aegineta, Ae-
gyptia faba humidior nostra est, & excre-
mentitia.

FAGVS eandem quercui vires habet, sed φνῆσι

Fou, intensiones vt etiam ilex. tenera eius folia il-
 faux, fou lita non instrenuè siccant. (Alterû fagi genus
 teau, ou quòd Latini sciscimâ vocant) in oxya quere.
 hestre **F E R V L A.** caules, si edantur, capitis dolo-
 res faciunt. muria condiuntur. Ferula itaque
 vâ, p. 1. f. caulē profert ternū sæpe cubitorum: folia
 Ferule fœniculi, longè asperiore & latiora. qua ab
 imo caule vulnerata sagapenū efficitur. Aeg.
 Ferule semen extenuat calfacitq; medulla ip-
 sius viridis adhuc astringit, eoq; sanguinem
 spuentibus, & cæliacis accommodatur. (De
 Sagapeno suo loco dicemus.)

σῦκον. **F I C V S** arbor calidi tenuisq; temperamē-
 ti est, adeo vt liquor & foliorum succus non
 rodat modò aut abstergat vehementer, sed e-
 tiam exulceret, ora venarum aperiat, & myr-
 mecias exterat. quin etiā purgandi vim obti-
 net. At syluestris ficus quam caprificum vo-
 cant, in omnia efficacior est domestica. Fi-
 cus fructus aridi in secūdo ferè ordine siccāt.
 (Galenus habet, cal. 2. nō autem sic. 2. videli-
 cet principio secundi, aut fine primi calefa-
 ciunt) pingues autem, duos tumores magis
 maturant, acriores detergunt discutiuntque.
 Decoctum ficuum mellis speciem referens,
 quod iam nonnulli siræon appellāt, viribus
 melli respondet. Virides quidem ficus imbe-
 cillioris virtutis sunt, vt æque tamen & viri-
 des & aridæ aluum subducunt. At ficus ca-
 prifici acres & discussoria sunt, quemadmo-

dum ex domesticis grossi.

TRICHOMANES nascitur eisdem in τριχομα
νίς.
locis quibus adianton, filici simile, sed exili-
us: foliis lenticulæ, tenuibus, in ordinē vtrin- capillus
veneris
que digestis, aduersis in se, in ramulis tenui-
bus, acerbis, fusco colore splendentibus. Ea-
dem quæ & adianton præstare posse constat.
Galenus, Trichomanes, quæcunque adiant-
um, efficit.

FILICULA nascitur in muscosis petris, πολυπό-
διον.
& vetustis arborum caudicibus, præsertim
quercu, palmi altitudine, filici similis, sub-
hirsuta, non tenui perinde diuisura. radix pi-
loso, in qua continentur cirri, ceu polyporū,
crassitudine digiti minimi, coloris intus her-
bacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis,
Aeg. Sic. abunde citra morsum. potum, infe-
rius purgationem molitur.

FILICI folia sine caule, sine fructu, sine πτίς.
Feugiere
flore, ex vno pediculo, cubitali longitudine
exeūt, multifida, & lateribus pinnata, subgra-
ui odore: radice per summa cespitum nigra,
oblōga, filices multas fundente, subastringē-
te gustu nascitur in mōtibz & saxosis. Filix θυλύπτι-
ς.
fœmina foliis est filicis, furculosis, altiori-
búsque, & quæ non singulari, vt illa, pediculo
fulciantur: radicibus longis, pluribus, obli-
quis, quæ ex nigro in luteum flauescunt. ali-
quæ etiamnum rubræ inueniūtur. Aeg. Vim
siccandi & amarā representat, eaq̃ue fœtus

corrumpit, latòsque lumbricos enecat, instas quatuor drachmarū cum mulsā pota. Quoniam verò modicè cōstringit, vlcera citra rōsionem desiccare potest.

FLAMMEAM violā in scopā regia describemus.

μαράθρον **FŒNICVLVM** in Iberia quæ ad occidentem spectat, succum reddit gummi similem. Caulem medium, dum herba floret rustici demetunt, ignique admouent, quo facilius vi coloris exudans, gūmi remittat. quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum. Est & syluestre fœniculum, magnum. fert autem semen cachryi simile, cuius radix iucundè olet. Traditur aliud hippomarathri genus, longo, exili, & angusto folio, semine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excalfaciendi naturam habet, & viribus fœniculo respondet, ad omnia infirmius. Aeg. Cal. 3. sic. 1. Hinc etiam lacti generando est, & suffusis auxiliatur.

τῆλιν **FŒNYMGRÆCYM** ex secundo ordine calidum est è primo siccum, idcirco feruidas inflāmationes irritat, minus autē calidas & induratas magis discutiēdo persanat.

Frax **FRAGA** gerēs herba sine caule spargitur humi, multis à radice lanuginosis pediculis, flore candido folio trigemino, per ambitum serrato atque venoso. fructu exiguis quidem moris haud absimili, exterum sui generis,

solido calloso, tenero, rubente, tū gustu tum etiā odore suauiss. radice foris atra, intus candida, multo fibrata capillitio. fronde perpetua. Cultus diligentia non magnitudine solum proficiunt, sed interdum etiam ē rubria in candida degenerant. Herba cibo sumpta medetur lienosis, itē succus ex melle potus. Idem cum pipere candido datur suspiriosis. Fraga sitim sedant, stomacho prosunt, præsertim bilioso. Succus fragis exprimitur vetustate vires accipiēs, præsentaneo remedio ad faciei vlcera, oculorū suffusiones, epiphorāsque. Radicis decoctū iocinoris feruores mulcet matutino & meridie potum. Cal. sic.

FRAXINVS arbor nota est. Agin. Folia eius pota viperarū moribus succurrūt. Cortex crematus illitusque ex aqua lepras separatur. Ligni verò ramenta si bibantur, letalia esse ferunt.

μυλία
Fresne

ERYCII marini generibus quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens. tertium candidum nascens in Creta, floridum valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Hoc fūco quidam putant mulieres suum colorem mentiri, cum tamen sit radícula eiusdem nominis qua sese fucant. Aegineta, Refrigerat siccātque in secundo abscessu, ac mediocriter etiam astringit.

φύκος
θαλάσσιον.

FVMARIA. vide Capnos.

FVNGORVM differentia duplex. aut
g iiij

enim māduntur, aut perniciales sunt. Multis de causis venenosi gignūtur, vbi videlicet clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit, aut si iuxta serpētis cauernam, arborésve, quę priuatim pariunt noxios fructus, erumpant. Continent qui tales sunt, nescio quod strigmentum concretamque puitam, terraque cruti quàm celerrimè computrescunt, atque marcote vitiantur. Sed qui veneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent: largius tamen sumpti nocent, & ægrius concocti strangulant, aut choleram morbum citant. Aegineta, Frigidi & humidi admodum téperamento sunt: nōnulli ipsorum manducati etiam exitium adferunt, præsertim qui inter ipsos natura constant putridæ qualitatis participes.

G

γαλβάν

G

A L B A N V M succus est nascentis in Syria ferulæ, quod nonnulli metopium vocant.

Maximè laudatur cartilaginosum, merum, thuris effigiem præbens, pingue, minimè lignosum, retinens nōnihil adiecti seminis & ferulæ, graui odore, neque valde humidum, neque nimis aridum. Adulteratur faba fresa, resina & ammoniaco. Si putgare galbanum voles, in feruentem aquam demittito, namque cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt, quas hoc modo facile

separabis : mundo linteo raroque alligatum in fictili aut ærea pyxide ita pendeat, vt imum vasis nō tangat : opertoque vase in feruidam aquam demittito : sic enim sincerū veluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit. Aeg. Calfacit 3. sic. 2. Mollendi & discussoria vi. donatum.

GALION, nomen ex eo traxit, quod in contrahendo lacte, coaguli vicem impleat. ramulum foliūque habet aparinæ simillimum, rectū : florem in cacumine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratū. radix vernerem cōcit. nascitur in palustribus. Aeg. Siccandi vim, mediocremque acrimoniā habet : flos eius ad sanguinis ex naribus eruptiones & ambusta congruit.

Γάλιον

GALIOPSIS, frutex in totum caulem & folia habet vrticæ, leuiores, & quæ grauem odorem trita reddant : flore purpureo tenui. nascitur circa sepes, ædificiorum areas, ac semitas vbique. Aeg. Scirrosos tumores dissipat & emollit. item ad vlcera serpentia facit emplastri modo imposita.

γαλίopsis
Videēt cē
agripal-
ma offic.

GALLA fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidē, sed tuberosa, solida, nullo foramine peruia. altera plana, leuis, perforata. Eligi debet omphacitis, quæ efficacior est. Aegineta. Omphacitis, id est immatura medicamentum est affatim astringens, cāmque ob causam siccatur, fluxio-

γκίσις
Noix de
galle.

nes repellit contrahitq; laxa stringit, & partes imbecillas firmat, fluidisq; omnibus affectionibus accommodata est. Frig. 2. sic. 3. Altera quæ flauo colore inanis magnâq; est, non tantam in siccando & astringendo habet efficaciam, sedis inflammationes, & procidentias excocta iuuat. Gallæ vero combustæ, & aceto restinctæ, sanguini supprimendo sunt.

γλαῦρος.

GALLICA, genus est aceris campestre, præcipuo candore, minus crispa, rariorq;.

GALANGAE magnus vsus apud recentiores medicos tã Græcos quàm Latinos erupit. Radix vulgò etiam notâ, quamuis aliunde procul comportetur. Deligenda ponderosa, rubenti cortice, gustu per quàm acri, odorata. Sunt nebulones, qui in tortis iunci radicibus in aceto piperato maceratis galangæ mentiantur acrimoniam: sed impostura detegitur, cortice derafo, qui hunc saporem ebiberat. Cal. 3. coctionem iuuat. stomachi ex frigida causa dolores finit. spiritus digerit cocta ex vino. Cerebrum roborat naribus indita. Os commendat. Ex succo plantaginis datur quibus cor palpitans micat. Cœliacis, & coli doloribus noxiis spiritu conceptis auxiliatur. acidis subuenit ructibus.

GENTIANAE inuentio prima assignatur Gentio Illyriorum regi, à quo cognomen Géciane. foliis partim proximè radicem,

iuglandi plantaginive similibus, subrubris, partim à medio caule, & præsertim iuxta cacumen, paulum dissectis: caule cauo, & leui, digiti crassitudine, geniculato, & ex intervalis maioribus foliato, binum sæpe cubitorum: semine in calycibus lato sine pondere, aceroso, satis ad spondylii semen accedente: radice longæ aristolochiæ, crassa, amara. Nasctur in sublimibus montium iugis, vmbrosis locis, aquosisque. Aegineta, Gentiana radix efficax admodum est extenuare, perpurigare, abstergere, & meatus infarctos aperire.

GERANION foliis anemones, diuisis longioribus: radice sub rotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in vino pota, vuluæ inflationes discutit. Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus: foliis maluæ. in summis alis sursum spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina vsus. Aeg. eadem.

GERONTOPOGON, id est, senilis barba: foliis est hirci barbulae, tenuioribus, longioribusque, instar capillorum prælongis: caule paruo, super quæ calyx longus, & barbula quæ summo vertice senum more incana funditur. flore luteo nitet, qui involucres barbulae euuaneſcat. lacte manat. radix est amara. iocinorosus & stomachicis succus decocti potus

γεράνιον.
Duplex,
vna offi.
acus pastoris
alt. pesco
lumbin^o.

γερτό-
πων.
vulg. bar
be de p-
stre, ou
barbe de
Dicu.

conuenit. Renum vitijs & vesicæ succurrit. Ex aceto ciet vrinas. Semen singultus sedat, aluum sistit, & intestinorū inferctum explicat. (Quantum ab hirci barbula differat ex Græci nominis descriptione, id est tragopogonis, conferendo discere potes.)

γέθυον.

Siboule
oucebule
ou ciuôs.

GETHYVM Theophrasto penè sine capite est, ceruicis tantum longæ, & ideo totū in fronde, sepiusque resecatur, vt porrū: quapropter & illud serunt, non deponunt, mensibus Martio, Aprili, & Maio. Secunda semente post æstiuum solstitium defigitur. Decimo aut duodecimo die prosilit, sed è recenti semine maturius. Nō anniculum modo, sed & bimum quoque fructificat. Germinat è latere, vno caule consurgit, sed quo radix ipsa deficiatur, foliis intus cauis. Condimentarium est, & ceparum generis. Minimè autem durat. Plinius à Latinis pallacanā vocari tradit. Sunt è Græcis qui gethyllida pro gethyo acceperunt, quod & epithyllida vocauerunt. Didymus gethyō simile fecit ampelopraso. Epænetus capitatum porrum gethyllida tradit appellari.

γέρον.

Mors a
diable.

GEVM radículas habet odóratas, & iucū di saporis ad discutiendas cruditates, pectorisq; & laterum dolores.

GINGIBERIS sui generis planta est, γιγγίβη in Troglodytica Arabia magna ex parte na gingēbre scens. qua virente, ad multa, perinde atque

nos ruita, vtūtur, & primis potibus & edulis
admiscent. Huius radices, cyperti modo, par-
uæ sunt, candicantes, & odoratæ, atque piper
sapore imitātur. Eligi debent quæ teredines
non nouerunt. A multis tamen ob id cōdiūn-
tur, quòd celeriter cariem sentiant. Fætilibus
in Italiam asportantur. Gingiberis cibo con-
ueniens est, & cum condimento assumitur.
Aegineta. Impensè quidem calefacit, sed nō
primo statim occurſu, quod ineuictæ cuius-
dam & crassioris humiditatis particeps sit,
propter quā etiam facile perforatur, firmam
autem conseruat caliditatem.

GINGIDIVM, aliqui lepidion, in Sy-
ria & Cilicia plerunq; nascitur. herbula syl-
uestri pastinacæ similis, tenuior, & amarior;
radice parua, candicāte, subamara. Olus hoc
crudum, coctum, conditūmve estur. Aeg. Ca-
lorem non ad eò manifestum sortitū est, cate-
rum siccat in abscessu tertio & astringit, qua-
de causa & stomacho vtile est.

GITH exilibus surculis fruticat, sæpe bi-
nos dodrantes excedens: foliis, vt senecionis
minutis, sed multo tenuioribus: capitulo in
cacumine tenui, paruo, cœu papaueris, oblo-
go, intercurſantibus intus membranis, quib;
semē includitur nigrum; acre, odoratū quod
panibus inspargitur. Aeg. Calefacit, siccat
tertio. tenuis est substantiæ, vnde destillatio-
nibus in nares olfactu prodest, intus assum-

γγίδιον.

Non est
hec fuma-
ria, sed
cherefo-
lium.

μελάνθη-
ον.

Nyelle.

pta discutiendis flatibus singularis est: quin-
etiam amari particeps deprehenditur, quo
lumbricos interficit: abstergit & incidit, hinc
quoque recta ceruice spirantibus commodè
exhibetur. item lepras extergit, myrmecias
eiicit, & menstrua incitat.

ξιφίον. XIPHION, alii phasganon, alii machæ-
offic. spa- ronion, Romani gladiolum, vocant. nomen
thula for- inde accepit, quod foliū gladii præbeat spe-
rida. ruri- ciem. indi simile erat, nisi minus & angustius
gladius. us videretur, & gladii modo mucronatū, ner
falso lon- uosumque in caulem exit, cubitalem, in quo
chitis exi- purpurei flores, in ordinem digesti, inter se
stimatur. distant: rotundo semine: radicibus geminis,
vna, bulborū modo, super alteram insiden-
te. quarum inferior gracilis est, superna vbe-
rior. nascitur in aruis. Aegineta, Gladioli ra-
dix trahit, discutit, & siccatur.

GLANDES, in quercu indicabuntur.

καστανά, GLANDES Sardianæ, quas aliqui casta-
Chaistai- neas, aut lopima, aut glādes Iouis appellant,
gnes. similisque effectus præbent, præsertim tunica
quæ carnem & corticem media intercurSAT.
caro his qui ephemerum biberūt, conueniēs
est. Aegineta, Castanæ omni ex parte reli-
quis glandibus præcellunt.

βάλανος GLANS vnguētaria, fructus est arboris
μυριφύ- myricæ similis, in magnitudine auellanz nu-
κίου cis, cuius nucleus græcarum nucu more tri-
tus, humorē reddit, quo ad preciosa vnguen

ta pro oleo vtuntur. nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudæam. Prefertur plena, recens, candida, quæ facillè delibretur. Aeg. Quæ intra vnguentariam glandem ceu carnosæ sunt, abstergerendi incidendiq; cū astringitione vim habet, eamq; ob causam denarii vnus pondere cum mulsâ pota, facile vomitiones cient, & inferiorē ventrem subducūt, cum posca verò laxandis extis accommodata sunt. Item cutis vitia cum aceto peruncta exterunt. Cortex alioquin egregia astringendi virtute pollet.

SATIIVM glastum quo infectores la-^{ioartes} narum vtūtur, folium habet plāragini simile, Guedum verū pinguius nigriusq; . cuius caulis duūm ou guel- cubitorum altitudinē excedit. Syluestre gla- dum ou glastū satiuo simile est, folia fert maiora, la- lherbe de- caceis proxima. caules prætenues multos- S. Philip- dos, quadam tenus rubentes: in quorum ca- pe. ou In- cumine folliculi multi dependent, quandam dicū à co- linguarum effigiem referentes, in quibus se- lore. pa- men, flore tenui, luteo. Eadem quæ & suprà stilli ab- dicta præstat. potu & illitu lienosis auxilia- effigie. tur. Aegineta, Isaris domestica qua tinctores vtuntur, siccandi vires & astringendi habet. hinc est quod magna vulnera in duris glutinat corporibus, sanguinem erumpentē compescit, laxos tumores discutit, ac omnibus malignis vlceribus resistit. Syluestris autem cum magis rodat, magisque ideo siccet,

valentius aduersus humidas putredines pugnat, ad cætera deterior, vt quæ immoderatus mordeat. Cæterum ob virium vehementiam lienosis quoque vtiliter adhibetur.

γλαυκίον
memitha
offi.

GLAUCIUM, succus est herbæ quæ ad Hierapolim Syriæ nascitur, foliis ferè corniculati papaueris, pinguioribus tamen, in terrâ sparsis odoris tetri, gustus amari. tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clibanis calfaciunt indigenæ, vsque dū flaccescant, deinde contusis succum exprimunt. Aegineta. Glaucium astringit, gustanti nonnihil ingratum, manifestè refrigerat, eaq; vi sacris ignibus non validis succurrit.

γλαύξ.

Nomen
vulgo nō
habet.

GLAUX cytiso & lenticulæ foliis similis, quæ supernè virent, auersaq; candidiora spectantur, ramuli à terra exiliunt quini senive, tenues ab radice, dodrantē alti. flores ceu violæ albæ, purpurei exeunt, minores tamen. nascitur iuxta mare. Aegineta, Calidi & humiditatem temperamenti gratia lacti generando idonea est.

γναφαλίον.

Vulg. cru
ciata.

γοανύπιον.

ἄγρωσις.

GNAPHALII foliis mollibus minutisque pro tomento vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino austero, ad dysenteriam. Sunt enim calida & modicè astringentia. Aeg. (Vide Clematis tertia.)

GOSSIPIVM in Xylo declarabitur.

GRAMEN geniculatis serpit ramulis, à quibus

quibus crebro radices spargit dulces, articu- Dent an
lis præcinctas. folia dura, & ut arundinis par chien.
uæ, lata, in exilitatem fastigiantur, eaque iu-
menta & boues pascunt. Est & arundinaceū
gramen, priore multo maius, quod iumenta
necare traditur, præsertim in Babylone: idq;
iuxta vias nascitur. Quod in Parnaso monte
gignitur, densius fruticat: foliis hederaceis:
flore odorato, candido: semine paruo, non
inutili: radicibus quinis aut senis, digitali
crassitudine, candidis, mollibus, & admodū
dulcibus. Natum in Cilicia gramen, quod
incolæ cinnam appellant, boues inflammāt,
si eo virenti sæpe pascantur. Galenus: Gra-
minis radix mediocriter frigefacit & siccāt.
Parū aliquid mordax habet ac subtile. Her-
ba frigefacit primo, inter humidum & siccū
media. Huius semen alibi quidem imbecillū
est, in Parnaso autem inuentum siccāt, sub-
tile, subacerbūque est.

GROSSI, quæ crinei nonnullis vocan- ὀλυνθοί.
tur, acres & discusstorii sunt, liquoris gratia
qui in ipsis cōtinetur. Cocti igitur duros tu-
mores dissipant: crudi myrmecias & thymos
exterunt. Aegineta.

GUMMI siccante vi & emplastica pol- κόμμη
let, & nimirum asperitatibus medetur.

b

H

ἄλμος.
Blanche
putain.

H

ALIMVS frutex est sepimentis idoneus similis rhamno, sine spinis, foliis oleæ, sed latioribus. nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Aeg. Dissimilarium parvum est, salsum gustu, & leuiter astringens, maxima ipsius pars calore temperata cum humiditate insuperabili est, & lactis ubertatem conciliat.

καλαμος
Câne ou
arunde.

In **HARVNDINVM** genere quædam nastos, id est farctior, vocatur, ex qua sagitte factitari solent, alia foemina, qua tibiæ arum ligulas efficiunt, alia quod fistulis addita sit, syringias: cui multum inest carnis, crebris cinctæ geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. alia crassa, concaua, apud amnes nascens: quæ à quibusdā cypria, ab aliis donax appellatur. alia phragmites seu vallatoria, gracilis, cædicans, vulgò cognita. Aeg. Calamus phragmites extergit, folia ipsius viridia mediocriter refrigerant. Cortex crematus calfacit, siccatur tertio. Radicem cum bulbis illitâ spicula & aculeos extrahere asserunt.

ἀσφόδε-
λος.
haste roy
alle. offi.
asrodili.

HASTVLA regia vulgaris notitiæ est, foliis maioris porri: caule læui, ferente in cacumine florem, quem anthericon appellant. radices subiacent oblongæ, rotundæ glandibus similes, gustu acres. Aeg. Asphodeli radix vim habet detergentem discutientemque.

Concremate autem ipsius cinis calidior, sic-
cior, & tenuior euadit, quo fit ut pilorū de-
fluuiis medeatur.

HEDERA differentias multas in specie κιστός.
fortitur, summas autē genere treis. Nam quæ Lierre.
dā candida est, altera nigra, tertia helix can-
dida, fructū fert candidum: nigra nigrū, aut
croci emulum, quā vulgus Dionysiam vocat,
helix fructū non gignit, sed albas habet viti-
culas, & folia parua, angulosa, & concinnio-
ra. Aeg. Hedera contrariis constat viribus, ut
quæ astringat & refrigeret. Item acris est &
calida, aqueæ substantiæ & tepidæ, cum viri-
dis est, particeps. Eius folia vino incocta vul-
neribus glutinandis, ambustis & lienosis sa-
lutariter adhibetur. Succus ipsorum naribus
ad pituitam educendam iufunditur. diutur-
nis aurium defluxionibus succurrit. Lachry-
ma hederæ, ut quæ actior sit, pediculos ene-
cat, & pilos abolet.

HEDYSARON, vide Securidaca.

HELENIVM folia habet verbasci angu-
stioris folii, asperiora, oblōga: caulem qui-
busdam in locis non emittit: radicem subal-
bidam, interdum subrufam, odoratam, suba-
crem, vegetam, magnā, ex qua agnatæ pro-
pagines liliorū aut ari modo seruntur. Mon-
tibus in umbrosis, siccoque solo prouenit. Fo-
ditur æstate radix, particulatimque dissecta
siccatur. Alterum helenii genus in Aegypto

ἡλένιον.
offi. enu-
la. rur. cā
pane, ou
cnula cā,
pana.

gigni Crateûas tradit. herba est cubitalibus ramulis, serpilli modo per humum repentibus: foliis, lenticulæ circa ramos, sed longioribus crebrisque: radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, supernè crassa cortice nigro. Nascitur in maritimis collibusque. Radix vna in vino epota, contra serpentium ictus auxiliatur. Aeg. Heleniû calidum est & siccum cum excrementitia humiditate. quare & eclegmatis temperatû infarctos thoraci humores educit: ac particulæ ex eo ruborem contrahunt.

ἡλιότρο-
πιον.

herb. flos
câcri. fal
lûtur, qui
soulisiz
putêt, aut
offi. calê.
dulâ, aut
solis spô-
sam.
Siue scor
piuron.

HELIOTROPIO magno flos est effigie scorpionis caudæ, vnde scorpiuro ei nomen. & quoniam folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. folia ocimi habet, hirsutiora, candidiora, & maiora. ramuli à radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliûr, multis alis concaui: flos in cacumine candidus, aut subfuluus, incuruatur vt scorpionis cauda. radix tenuis est, & inutilis. nascitur in asperis. Heliotropion paruum nascitur in palustribus, iuxta lacus, foliis antedicto proximis, rotûdioribus: semine acrochordonum verrucarum modo, pensili rotundo. Aegineta, Maius calidam, siccam & abstergentê vim præ se fert, cui^o decoctû potu educit pituitâ, bilémque. Illitu fructus ipsius myrmecias & huius notæ vitia perficcat. Minus autem heliotropium & hæc abolet, & lumbricos in-

terimit, si cum fructu, nitro, hyssopo, & cardamomo bibatur.

HELXINE nascitur in parietinis, sepibus & maceris, folia ei mercurialis insunt, Parietaria hirsuta: cauliculi subrubentes, & circa eos verticillati semina aspera, adhærentia vestibulis. Aeginaeta, Hanc alii aliter nuncupant, perdicium, parthenium, sideritum, heracliam. abstergit, leuiter astringit cum humiditate subfrigida,

HELXINE cognomēto cissampelos, foliis est hederæ, minoribus: ramulis exilibus, quibus complectitur quodcunque contingit adminiculū. nascitur in sepibus, vinctis, & vinearum, segetibus. foliorū succus potu deiecit aluum. Aeg. Vim habet discutiendi.

HEMEROCALLIS foliū & caulem habet lilii, porraceo colore. flores in caule per singulosexortus terni, aut quaterni erumpunt, lilii diuisura, quoties dehiscere cœperunt, colore per quā pallido. radix magna est atque bulbosa. Aegineta, Radix eius viribus lilio respondet, similiter illi ambustis opitulatur.

HEMIONITIS, quam aliqui splenion vocant, folium emitit dracunculi, lunatum. radicibus cohæret multis, tenuibus. nunquā flores, neque semen, neque caulem gignit, in petrosi nascens, austero sapore. Ea ex aceto nonnullis pota lienem absomit. Aegineta, Astringens

simul & amara est, idcirco lienosis cum acetoto pota succurrit.

Ἑρμολάκων HERMODACTYLI radix per se, & **κτυλοι.** ipsius decoctum, vim habet purgandi: arthriticis priuatim cum humores defluunt ex chilio vomitur. Stomacho vehementer aduersatur. **cant.** Aegineta.

Ἑκκινθός HYACINTHVS folia habet bulbi: drantalem caulem, minimo digito tenuior. Vacitum, rem, herbacci coloris: comam procumbentem, oignonem, florum purpureorum plenam, incuruam: **σαυλαγέ** radicem bulbaceam. Aeg. Radix siccatur primo, frigefacit secundo. Pueros itaque impuberes diu conseruare cum vino illita creditur. Semen leuiter abstergit astringitque, idcirco atquatis cum vino datur, vt quod desiccet magis quam refrigeret.

Ἑδραλός HYDROLAPATHVM rumex est in **παθόν.** aquis nascens. **docques.**

Ἑδροπί HYDROPIPER apud aquas nascitur **πρι.** quæ stagnat, aut pigro lapsu repunt. caulem off. & me edit geniculatum, prædurum, multis alis codici per cauum: folia menthae, maiora, molliora, canpatonio didioraque, gustu piperis, acri, citra tamen falso vtuntur vllam odoris gratiam: fructum acrem, in surquemad. culis paruis, prope folia racematim coherentem. Folia cum semine illita tumores veteresque curage duritias discutunt. sugillata delent. quæ post & pficare quam inaruerunt, tusa pro pipere in obsoniis velint esse. admiscuntur. Radix parua, nullius in medi-

cina momenti Aegineta. Herbula est calida, sed non piperis modo. Facultates similiter Dioscoridi docet.

HIERACIUM magnum, caulem emit-
tit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: *ἱεράκιον*
folia ex interuallis rariusculè diuisa, similia *μίσχα.*
soncho per ambitum: luteos flores in oblon- *cichoree*
gis capitulis. Vim refrigerandi habet, & mo- *iaulne.*
dicè substringendi. vnde illitum, stomacho
æstuâti, inflammationibûsq; prodest. succus
erosionem stomachi sorbitione mitigat. her-
ba cum radice illita, vibratis à scorpione icti-
bus auxiliatur. Hieracium paruum, folia *ἱεράκιον*
ex interuallis habet, diuisa in ambitu: cauli- *μικρόν.*
culos teneros, virentes, in quibus lutei flores *cichoree*
orbem circinâtes emicant. Vim suam ad ea- *faulua gē*
dem ad quæ superior impendit. (Aegineta
non habet.)

HYOSCYAMVS vide in litera, a. fo. 24

HYOSIRIS intubo similis traditur, sed *ὑόσιρις*
humilior & tactu asperior. Vulneribus con-
tusa præclare medetur.

HYPEROON, aliqui hypopheon vocât. *ὑπέρκον.*
nascitur in segetibus aruîsq;, foliis rutæ, exi-
libus ramis. Aegin. Frig. 3. papaueris viribus
proximum.

HYPERICVM, alii androsæmon, alii
corion, alii chamæpytyn appellant, quoniâ
semén odore resinâ imitatur, surculaceo fru-
tice, dodrantali, rubente, folio rutæ: flore al-
b. iiii

ὑπέρικον
mille per
tuisou p-
forata.
vulg. ou
herbe S.
Iehan.

hę violę, luteo, q̄ digitis tritus sanguineū suc-
cū remittit, qua ex causa androsēmon cogno-
minatur: subhirsuta filiqua, & tereti hordei
magnitudine, semine intus nigro, resinosi o-
doris. gignitur in cultis & asperis. Aeg. Hype-
ricum duplex est. Alterū, quod androsēmon
& ascyrrhon appellatur, expositum est: alte-
rum verò calefacit & siccet, tenui substantia
præditū, eóq; vrinas elicit, & menstrua citat.
Totum ipsius semē si cum foliis illinatur vi-
ride, cicatricē vulneribus obducit. Arida ve-
rò folia oblita vlceribus medentur. dantur
etiam potioni aduersus coxarum dolores.

Al. hypo **HIPPOGLOSSON**, frutex est folia ha-
glosson. bēs rusci tenuis figura, & spōsam comā, & in
υπόγλωσ- summo ceu linguas ē foliis exeūtes. Capitis
σος. dolorem corona ex comis imposita minuit.
malagmatis radix succūsq; admiscetur. Aeg.
Frutex est pusillus, cuius radix & succus e-
molliendi virtute pollent.

ἵππολᾶ- **HIPPOLAPATHON** olus est ma-
παθον. gnum in paludibus nascēs. easdem habet vi-
offi. pari- res quas supradicta rumicis genera. Aëtius:
celle, ou Consimile est facultate lapatho, sed imbe-
grāde o- cillius.

zeille. **HIPPOMANES**, secundum Crateiam,
vulg. pa- planta est fructu cucumeris syluestris, folio
relle, autem nigriori, tāquam papaueris spinoso.
Hęc Theocriti interpretes. Sed apocynon
etiam hippomanes cognominatur.

HIPPOPHAES, quo fullones vestes in- ἵπποφαές
terpolât, in sabulosis maritimisque nascitur, Lappago.
surculaceo frutice, vndiq; denso & largo, fo seu lap-
lius oleæ longioribus, mollioribusque: inter pula
quæ candicantes spinæ emicant, siccæ, angu-
losæ, interstitio quodam distantes. flores he-
deræ corymbis similes, racematim cohæret:
minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte
rubescences. radix lacteo succo madet, crassa
mollis, amara gustâti. ex qua, perinde ac tha-
psia, succus eximitur, qui per se, & cum erui
farina subactus, siccatur, & ad vsum recondi-
tur. Aegineta, Alij hippophyes vocant. Radi-
cis liquor cum erui farina instar denarii da-
tus, bilem ac pituitam purgat. Item totus ip-
se frutex siccatus, ad purgationes accommo-
datur.

HIPPOPHÆSTON, id quod aliqui hip-
pophæes appellât, nascitur eisdem locis qui-
bus hippophaës, estq; spinæ fulloniæ genus,
humilis herba, sine cauliculo, sine flore: ina-
nibus tantum capitulis: foliis parvis, spinosis
radiculas habens molles, crassas. Succus radi-
ce, foliis, & capitulo exprimitur, & exiccatur
Aeg. Succus trium obolorum pondere, cum
aqua multa ad pituitam & aquâ vacuandam
exhibetur: maximè congruit non nisi subre-
cta ceruice spirantibus, comitialibus, & ner-
vorum affectibus.

Al. hypō
phæston.
ἵπποφα-
στον.
Lappago
seu mol-
lugo

HIPPOSELYNIM, Latini olusatrum Ache ou
hacche

appellât, aliqui smyrnion. quamuis aliud sit, quod propriè smyrniō dicitur, vt paulò pòst referemus. Est autē maius, & satiuo apio candidius: caule alto, cauo, molli, habēte veluti lineas: foliis latioribus, in puniceum vergentibus: coma roris marini, florum plena, dependentibus in cacumine corymbis, antè quàm deflorescat. ea semine turget nigro, oblongo acri, solido, aromatico. radix dimittitur tenuis, odorata, candida, quæ os commendat. In vmbrosis & palustribus enascitur. olerum generis, vt apium. radix cruda coctāve estur. folia cum caulibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur, crudæque muria condiuntur. Aegineta, Cum apio domestico virtute cōuenit, nisi esset imbecillius.

H I R C I barbulam in Tragopogone describemus.

ὑσώπος.
Hysope

H Y S S O P Y M, herba nulli non cognita, duūm generum est, montanum & hortense. Optimum est Cilicium. Aeg. Calefacit, siccatur. 3. tenuisq; substantiæ est.

ὄλκός.

H O L C Y S in saxis nascitur siccis, aristas habet in cacumine tenues, culmo quale hordeū restibile. Hæc circa caput adalligata, vel circa lacertū educit aristas è corpore: quare nonnulli Aristidam vocauerūt. Multis eam esse contendunt inter saxa proueniētem. Alij syluestrem esse volunt aucnam.

MOLOSTION quadrátalis herbula est, *Al.ólo-*
 humi repens: foliis viticulisq; coronopo aut steum
 graminí proximis, gustu astringentibus: *ra-δλόσιον.*
 dice alba, pretenui vsque in capillamenti spe Herb.
 ciem, longitudine quatuor digitorū. nascitur mollegra
 in collibus terrenis. Carnes coguntur, deco men.rurí
 ctionibus addita. Aegni. Siccat, astringítque, canisdēti
 hinc eo ad rupta vtuntur. culus &

HORDEVM optimum est, candidum duua. nō
 purúmque. Aegineta, Frigefacit, siccat pri- est hęc pī
 mo. Nonnihil etiam extergit. Caterum faba losella
 rum lomento siccitate præcellit, minus flatu *κρητή.*
 lentum est. Polenta hordeo multo magis sic- Horge
 cat. Prísana præter quod largius humectat,
 etiam abstergit vehementius.

HORMINVM herba est, foliis marru- *ορμινον.*
 bio similis, caule semicubitali, quadrangulo, Satiuū,
 circa quem eminentię siliquis similes prode- oruale
 unt, quæ ad radicem spectāt, in quibus diuer- toute bō.
 sum semen recluditur. siquidem in syluestri ne
 rotundum, fasciúmque inuenitur: in altero, ni offic.gali
 grum, & oblongum, cuius est vsus. Syluestre tricum
 magis viribus pollet: quare vnguentis, præ herb. cen
 sertim gleucino, permiscetur. Aegineta, Cali trūgaline
 dum est mediocriter siccum & abstergens, vulg.sal-
 venerem igitur stimulat. oculorum crassities uia trans
 cum melle repurgat, tumores laxos discutit, marina
 & extrahit aculeos. Syluestre domestico est
 valentius.

I

Nō mul-
tū differt
à liferon
ou lifer-
rotte

I

A S I O N E olus est sylueſtre, hu-
mi ſerpens, copioſo lacte, flore
candido, & in hoc nobili quòd
ſingulari folio conſtet, ſed ita implicato, vt
plura videantur, floris margine in angulos
exeunte. Plinius florem Cōcilium ait appel-
lari: ſed quę Theophraſtus de folio floris, ea
Plinius de folio herbę ſcribit. Commēdatur
herba ad ſtimulandos coitus. Cruda, & ex a-
ceto pota, lactis vbertatem præſtat. Salutaris
eſt tabem ſentientibus. infantium capiti illi-
ta, nutrit capillum, tenaciorēq; eius cutem
efficit.

iβνις.

Lepidiū
ſylueſtre
fortē. her-
ba. pratē-
ſis Vale-
riana

I B I S C V S, quęre Althæa.

I B E R I S, ſiue cardamantica, folia habet
naſturtij, vere virentiora: caulem cubitalem,
aut minorem. in incultis naſcitur. æſtate la-
ctem florē promit: quo tempore efficacior
eſt. Radices duas naſturtio ſimiles habet, cal-
facientes & adurentes, ipſe enim iſchiadicis
cū ſalfa axungia emplaſtri modo vtilis, qua-
ternis horis alligatæ, vt dein in balneas deſcē-
datur, & poſtea oleo cum lana locus perun-
gatur. (Aeg. omiſit.)

*ιδαια
ρις.*

I D A B A E radici folia ſunt ea quę ruſco
adhærent his veluti exigui pampini, in qui-
bus flos. Aegineta, Guſtu acerba, & viribus
ſanguinis eruptionibus & reumaticis affecti-
bus tum pota, tum extrinſecus impoſita ac-

commodatur.

I L E X similes quercui vires habet, sed multo ea est validior. Galen.

I L E X est gemina Colūmelle, minor apibus quæ sita: & proluxior, omnibus improba ta mellificio.

I L L E C E B R A, vide semperuiū tertium. ἀνδρά-

I L L E C E B R A, quæ Græcis andrachne χρη.
agria nonnullis minus semperuium, sylue- ἀγρία.
stris est portulacæ genus, maiori semperuiuo Pourpie
simile, nisi quod folia habet, pusilla, sed latiora, sauuage
maculosaque: item breuius cacumē, fuluis
cauliculis, gustu salsum, lacteo succo, radice
tenui, candida. Nascitur in petris, & in ster-
quiliniis. Colligitur cibi causa, esturque cum
ficibus. Succo bilem regio morbo laborāti-
bus per aluum exigit. Rustus compescit aci-
dos. Vētris tumores, & iocinoris vitia leuat,
vrinam ciet. Eodem ægilopas Aesculapius
curauit.

I M P I A Plinio vocatur incana, roris mari offi. Chri
ni aspectu, thyrsi modo vestita: inde alij ra- stoculus
muli adsurgunt, sua capitella gerentes. ob id
impiam appellauēre, quoniam liberi supra
parentem excellāt. Alij potius ita appellatā,
quod nullum animal eam attingat, existima-
uēre. Hæc inter duos lapides trita feruet, præ-
cipuo aduersus anginas succo, lacte & vino
admixto. Mirūmque traditur, nunquam ab
eo morbo teatari, qui gustauerit: itaque &

suibus dari, quæque medicamentum id no-
luerint haurire, eo morbo interire. Sunt qui
& in anium nidis inferi aliquid ex ea puter,
atq; ita non strangulari pullos avidius deuo-
rantes. Floret vere, tuncque decoquitur ad ser-
pentium morsus. Succo eius, vel etiam cine-
re, fistulas impleri tradunt.

INTYBUS. Quære Seris.

ῥιόςαν.

ῥος.

Coque-

lourdes

ῥεῦσιμον

Icon, ou

bruca ge

ratina,

outorte-

la

IOVIS flos inodorus est, nec nisi coloris
gratia coronamentis additus: æstivus est, co-
lore purpureo.

ERYSIMON, Latini irionem vocant, iu-
sta vrbes, rudera, hortosque nascitur, foliis
crucę sylvestris: cauliculis in lori modū lētis,
& obsequiosis: floribus luteis: siliquis in cacu-
mine gracilibus, ut scænogræco, corniculatis:
semine nasturtij, exiguo, vrentis gustus. Ae-
gineta, Erysimi semen igneū calefactorium-
que est, nasturtio similiter: quare in fermētō
tostum, thoracē purgat in eclegmatis assum-
ptum, duritiāsque emollit, & cæcos cancos
illitu adiuuat.

ῥις.

Herb. cœ

leste lilū

rur. flāme

ou glain

IRIS à cœlestis arcus similitudine no-
men accepit. Folia fert gladioli, sed maiora,
latiora, & pinguiora. Flores à caule æquali-
bus inter se spaciis distāt, varij: siquidem can-
didi, pallentes, lutei, purpurei, aut cœrulei
conspiciuntur: qua diuersi coloris specie,
quædam cœlestis arcus imago representari
videtur. Radices subiacent geniculatæ, du-

ra, odorata: quæ frustatim dissectæ, in umbra siccantur, & traiectæ lino reconduntur. Melior est Illirica, & Macedonica: & inter has laudatissima, quæ pumila ferè & densa constat radice, frangenti contumax, subrufo colore, gustu amaro, odore perquam sincero, ita ut nullum prorsus situm redoleat. quæ dum tunditur, sternutamenta mouet. Secundum locum habet Africana, candicans, gustûque amara. Teredines in vetustate sentiunt, tûc tamen odoratiores reddi solêt. Aegineta, Affatim calfacit, extergit, & maturat, tenuis substantia, tussi utilis. humores in pectore contumaces extenuat, torminibus medetur, fordida vlcera purgat, cum mulsâ pota aluum inanit.

ISCHAMON serpit in terra milio simili *ἰσχαμον*
les, foliis asperis, & lanuginosis. Thracia eâ Miliû syl
inuenit, qua ferunt sanguinem sisti, non a uestre q-
perta modò vena, sed etiam præcisa. Farci- dam esse
tur in nares ad cohibendum inde sanguinis volunt
profluium. Quæ in Italia nascitur, & sanguinem sistit eadem adalligata vnde cruor
manat.

ISOPYRON aliqui Phasiolon ob similitudinem vocant, quoniam folium, quod est aniso simile, in pampino torquetur. capitula sunt in summo caule tenuia, plena seminis, melanthii gustû imitantis. Aeg. Semen amarum ac modicè acerbum est, ob quod crassos *ἰσὶ πυρον*

glutinososque humores abstergit & incidit, sic vt corpora contrahat stringatq;. hinc etiã quæ altè defident expurgat, excreationibus sanguinis non inefficax.

σχάινος, I V N C I duo genera. vnũ læuis nominati, alterum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera. Vnum sterile. reliquum fert semen nigrum, rotundum: & crassiore constat calamo, carnosioreque. Tertius est iuncus qui vocatur oloschœnos, prioribus carnosior, asperiorque. is similem supradicto fructum in cacumine parit. Aethiopici iunci semine somnus allicitur. sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat. Aegin. Oxyshœni, id est, acuti iunci semen est somnificum: holoschœni autem dicti, minus, idem & capiti dolorem facit. Vtriusque semen frixum si cum vino bibatur, alui fluores desiccant, & mulierum fluxiones cohibet.

σχάινος ἀρωματικός. Odoratus I V N C V S, in Africa & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa: proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus repletus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odorem emittit. igne mordacitatis ad linguam. floris, culmorum, radicis que est vsus. Aegine. Flos modicè calefacit, minus astringit, tenuem naturam sortitus, quæ urinam mouet, & menses trahit,

offlsguinatiū vulgo pestil liis camelorum

obstru&aque referat in fomentis, potu, & cataplasmatis adhibitus: radix adhuc magis flore astringit, sed ille calidior.

I V N I P E R I genera duo. altera maior, ἀκινυβος altera minor. Baccarum nonnullæ nucis iuglandis magnitudine nonnunquam grande. ou genere scere, aliæ nucem Ponticam æquare inveniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, subamaræ: quæ arceuthides etiam, id est, baccæ iuniperi, nominantur. Aeg. Cal. sic. 3. fructus autem cal. 3. sic. 1.

L

ὀκναύθην.

A B R V M Veneris, Dipsacus.

Vigne

L

L A B R V S C A duorū generū

sauuage

est, alterius vua non maturefcit,

viorne

sed flore tenuis œnanthen nominatam perducit. altera ad frugem peruenit, paruis acinis, nigra, & astringens. Folia, caules, & clauiculæ, quibus repunt, vim habent cultæ viti similem.

ouhardie

L A B V R N V M arbor alpina Plinio, nec vulgo nota, dura & candida materia, cuius florem cubitalem longitudine apes non attingunt. odit aquas, nec nisi in siccis provenit.

L A C T O R I S nota vulgò, secundum Plinium, plena lactis, quod degustatum vomitiones cōcitāt. Eandem hāc aliqui esse dicūt, alii similem illi quam militarem vocāt, quo-

Lactaria

ou ana-

bula

niam vulnus ferro factum, nullum non intra dies quinque sanat, ex oleo imposita.

θρίδαξ.

Laiſtue

LACTUCA olus est non summè frigidū humidumque, sed pro fontanæ aquæ temperamento, quapropter calidis inflammationibus cōuenit: præterea sitim potu restinguit, & genituræ fluorem cohibet.

θρίδαξ

ἀγριος.

Videi et

se off. en.

diuina

SYLVESTRIS lactuca satiuæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora. amaro gustu est, & viribus aliquantum papaueri similis. vnde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aegineta, Superiori minus & refrigerat, & humectat, verum succulentior existit.

λᾶδανον

Strobon

recentio-

res vocāt

Est & alterū cisti genus, LEDONÀ nonnullis appellatum, frutex simili modo nascentis, longioribus foliis, & nigrioribus, quæ verno tempore quiddam cōtrahunt pingue. Fit ex eo quod ladanum dicitur. Siquidem cum cisti frondes pascuntur capræ, hircique, pinguitudinem conspicuè barba carpunt, & suo lentore villosis cruribus adhærescentem reportant. quam depeccantes incolæ, colantesque cogunt in offas, & ita recondunt. Alii vero attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantque in ladanum. Maximè probatur odoratum, subuiride, facile mollescens, pingue, quod arenas nō collegit, nec squalore oblitum est,

resinosum, quale, in Cypro gignitur. Arabicum verò, Libycumque, vilius. Aegineta, Ladanon medicamen est præstantissimum, in secundo ferè abscessu calidum, natura tenuè, emolliens mediocriter, discutiens & maturans: eòq; vteri affectionibus peculiariter cōuenit. habet præterea nonnullas astringendi vires, quibus defluos capillos confirmet.

L A G O P Y S herba sistit aluū in vino pota: aut in febris, ex aqua. eadē inguini alligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus. Siccæ facultatis est. Aeg.

λαγώ-
πυς.

Vulg. trinitas

L A M P S A N A sylvestre olus est. plus alit quàm rumex, & stomacho vtilius. cuius folia caulésque coquuntur in cibo. Aeg. Manducata prauum succum gignit, illita verò nonnihil abstergit, discutitque.

4. trifolii
genus sit

λαμ-
ψαν.

Sanūte

L A N A R I A, memorabitur in Radicula. blanche,

Ex generibus rumicis, oxylapathum vocant, quod in acutum tendit. prædura habēs extrema, nō nisi in palustribus nascens. Alius est satiuus, illi dissimilis. tertium genus sylvestre, paruum, plantagini proximum, humile & tenerum. Quartum est quod alii oxalida, alii anaxyrida, aut lapathon vocant. folia eius sylvestri ac, exiguo rumici similia, zeille me caule nō magno, semine subacuto, rubente, nūc Ace acri, in caule & agnatis appendicibus emicā- tosa nūc, te. Aegin. Rumex mediocriter discutit. Oxy oze ille lapathū præter id etiam pauxillum repellit.

blanche,

raucla q

ou pou

rette

λαπαθον.

offi. lapa

tiū acutū

surelle o-

folia eius sylvestri ac,

zeille me

nue Ace

tosā nūc,

te. Aegin. Rumex mediocriter discutit.

Semen autem, præsertim oxylapathi, astringens, alui profluuiâ (diarrhœas dicunt) & intestinorû tormina per sanat. Folia verò semini contraria faciunt: hæc etenim comesta aluum mouent, illud potum ipsam cõprimit.

σιλφιον.

L A S E R P I T I V M in Syria, Armenia, Media & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem maspetum vocant: foliis apio similibus: lato semine. Radix in cibis ægrè coquitur, os commendat cibis aut salî permissa. Laser è radice atque caule scarificatis colligitur, præfertur autem rufum, translucens, myrrhæ æmulum, non porraceum, odore valens, suauis gustu: quod dilutum facîle albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet. blandissimo odore, adeò vt ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virosûm reddunt odorem. Laser omne antequam siccescat, adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento: quod maleficium deprehenditur gustu, odore, visu, & dilutione. Caulem aliqui silphion, radicem magudarin, & folia maspeton vocauêre. Efficacissimum laser, mox folia, postremò caulis. Fertur & altera magudaris in Libya nasci, radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua non profluit succus: eiusdem cum lasare facultatis. Aegineta, Prohè calefacit, flatulentum est, & cõcoctu per-

uicax. à foris corpori applicatū efficacius deprehēditur, magisq; liquor ipsius, extrahendi potēs, item & superexcreſcentia amoliēdi.

LATHYRIS, quam aliqui tithymalū, λαθυρίς
offi. cata
putia ma
ior, vulg.
espurge appellant, eamque tithymalorū numero adſcribunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digitali craſſitudine, inanem. gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & læuiora. quę autem in ſummis ramulis exierunt, minora conſpiciuntur, ariſtolochię, aut oblongę hederę figura. In cacumine fructū ſummis ſurculis gerit, triplici loculamento inſignem, rotundum, ceu capparin, in quo grana intercuſantibus membranis inter ſe diſtincta continentur, cruſis maiora, rotunda. quę dum corticibus exuuntur, candida ſunt, & guſtu dulcia. Nullus radicis uſus. totus frutex lacteo ſucco turget, vti tithymalus. Aeg. Succus eius inſtar tithymali purgat, ſemen autem præcipuam purgandi vim habet.

SION in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, foliis latis, olusatro ſimilibus, ſed minorib⁹, & odoratis. Quę cruda coctāq; viriū σιον
Lauer lat.
off. beru-
la. berle
ou. laber
le vulg. ſuarum gratia eduntur. De Sio Crateuas tradit, herbam eſſe fruticis ſpecie, pauca folia ſerentem, rotunda, maiora quàm menthę, nigra, & ad crucam accedentia. Aeg. Sion calidum eſt, vrinam ciet, digerit per halitum, renum calculos terit, menſes euocat.

ῥάφνη. L A V R V S quædam tenui folio cõstat. al-
Laurier tera latiore. Aegin. Lauri arboris folia siccât,
 & calefaciunt insigniter, magis quoque fru-
 ctus. Radicis cortex amarus, & leuiter astrin-
 gens, calculos comminuit, & iocinorosis o-
 pitulatur cum uino odorato triobolari pon-
 dere potus.

ῥάφνη L A V R V S Alexádrina, folio est rusci ma-
ἀλιφάν iore, molliore, & candidiore: semine inter fo-
ῥεα. lia rubro, ciceris magnitudine, ramos spar-
 git in terra dodrãtales, interdum longiores:
 radice syluestri myrto simili, maiore, molli-
 ore, odorata. inuenitur in montosis. Aegin.
 Calida, acris, & subamara est, idcirco menses
 & vrinas commouet.

φακή. Aeg. L E N T E S in 2. ordine siccant, medio
Lenticle caloris & frigiditatis temperamẽto donatæ:
 sed astrictionis quoque nonnihil habent. To-
 tum quidem lentis corpus siccât, aluũque
 sistit: decoctum vero ipsius proritat, ideoque
 prior aqua defunditur, quum astringẽdi gra-
 tia lentes assumantur.

φανός ἐπὶ L E N S palustris, inuenitur in aqua non
τιλμά. fluente, muscus lenticulę similis. Aeg. Hume-
των. rat, refrigeratq; in secundo abscessu.

Λέτικυ L E N T I S C V S nota arbor est. Aegine-
de d'caue ta, In omnibus sui partibus siccât secundo
σχίνος. absolutè, calefaciendo autem & refrigeran-
Λέτισχε do medius est, adeò astringens, vt ad hypo-
 cistidis succum astrictione accedat.

Lenciscus resinam gignit, quę lentiscina cognominatur, & ab aliquibus mastiche. Optima & copiosissima in insula Chio prouenit. præfertur nitedulæ modo resplendescens, & candore Tyrrhenicæ ceræ similis, adulta, retorrida, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, resinæq; pincæ nucis mistura. Aegin. Ma μασθίμη
stiche, Chia quidem calefacit & sic. r. Cæterum compositæ est facultatis, astrictoriæ simul & emollientis: hanc ob rationem stomachi, ventris, intestinorum, & iocinoris inflammationibus rectè accommodatur. Aegyptia, nigriore colore quodammodo, siccat magis & discutit, minus astringit, hinc furunculos quoque dissipat.

LEONTOPE TALON, caulem emit tit dodrantalem, aut altio rem, plurimis al lis concauum, & in cacumine semina parua duo! aut tria, in filiquis, ciceris modo: flores anemonæ similes, punicei coloris: folia brassicæ, sed papaueris diuisura. radicibus nigris, rapæ similibus, strumosis. nascitur in aruis, & segetibus. Aegineta, Radix cal. sic. 3. discutitque. λεοντοπέ
ταλον.
offic. &
herb. pat
taleonis

LEONTOPODION duum digitorum herbula est, folia forēs angusta, longitudine ternū quaternūve digitorū, hirsuta, quę iuxta radicē lanosiore flocco canescūt, capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri; λεοντοπό
διον.
Videat ef
se quę cru
ciata

semenvsq; adco spissa lanugine inuolutū est, vt sæpe fallat: radice parua cohæret. quā tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere. Aeg. non habet.

LEONTOPONTIVM à superiori differre videtur, alii liceron, dorypetron, & toriuetoron vocant, radix eius aluum sistit. Purgat bilem in aqua mulsā addito pōdere denariorum duūm. Nascitur in campestri & græili solo. Semen eius lymphatica somnia facere dicitur, & tela omnia infixa corpori extrahe re tritum cum polenta, & cū eadem spicula sagittariorum elicere.

λεπίδιον
offic. &
herb. ra
phanūvo
cant,

LEPIDIVM aliqui gingidium vocant. herbula vulgō nota. muria cū lacte seruatur. Aegin. Aliqui hyperiadem vocant. cal. 3. Nasturtio proximum viribus, minus autem co desiccatur.

λευκά-
κανθα
Rham-
nus est.

LEVCA CANTHA prædita est radice cyperi, valida & amara. quæ māducata dolo rem dentium sedat. veteri laterū dolori, atq; ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex vino poto. eadem ruptis & cōuulsis medetur. radicis epotus succus eosdē præbet effectus. Ag. Alii polygonatum, alii ischiada vocant. radix incidit. Cal. 1. sic. 3.

λευκάς

Attriplex
rustica
esse videt

LEVCA S mōtana, latioribus quā vrba na foliis, semine acriore, amariore, ori in gra to, efficacior tamē quā satiua habetur. vtra que ex vino contra animalium venena, præ-

cupuè marinorum opitulatur. Aeg. Cal. sic.3.
acrimonia præpoller.

LEUCOION vulgaris est notitiæ, sed in-
floribus differentia quædam. nanque aut cœ
rulei, albi, purpurei, aut lutei inueniuntur. Lu-
tea verò præcipui in medicina vsus. Aegineta,
Lecoi totus frutex abstergendi extenuan-
diq̃ue vires possidet: magis autem flores, &
ex eis, sicciore. iccirco & menses stimulant,
fœtus corrumpūt expelluntq̃. Quod si quis
aquæ mistura vim ipsorum obtundat, etiam
inflammationibus conducent, præsertim vte-
ri. Radices eadem præstant, crassiore magis-
que terrestri natura præditæ: ex aceto inflam-
mationibus in scirrhum coalescentibus im-
ponuntur.

LICHEN qui saxi est familiaris, aliqui
bus bryon appellatur. asperginosis petris ad-
hæret, vt muscus. Aegineta, Vis ei est exteren-
do purgare, mediocriter siccare & refrigera-
re. impetigines sanat, inflammationes arceat.
sanguinis eruptiones sistit.

LYCHNIS coronata, flore est albæ vio-
læ simili, quo corollæ factitatur. Contra scor-
pionum ictus semen in vino potum auxilia-
tur. Lychnis sylvestris, omnia vrbanae simi-
lis. Aegineta, Lyncnidis coronariæ semē Cal.
sic.2. absolutè.

LYCIVM, quod aliqui pyxacanthan vo-
cant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorū

λευκόιον.
violette
ou giro-
flee.

λαχύν
off. herb.
hepatica.

λυχνis.
châdelle
de N. Da
me. altera
flore pur-
purco,
Mariæ ro-
sa ou Me-
lon blanc.
λύκιον.

aut longioribus: foliis buxi, densis: fructu piperis, nigro, leui, amaro, densoque: cortice palido, non dissimili lycio madefacto: radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisque aliis locis. aspera loca amat. Succus extrahendi ratio hæc est: Rami cum radiculis tusi, & ante per multos dies macerati coquuntur, tū abiectis lignis itidem liquor, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctioni amurca, aut absynthii succo, aut felle bubulo. Innatas spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamentis additur. reliquo ad alia utitur. Simili modo fit lyciū, semine expresso & insolato. Optimum quod vri potest, restinctumque rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus cum freris rufis, odore minimè viroso, cū amaritudine adstringēs, crocino colore. cuiusmodi Indicū est, cæteris præstātius. Tradunt Indicū fieri lycium, ex frutice lonchitide appellato. ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos habens, ternū cubitorū longitudine, maiore sive, rubo crassiores, à radice numerosos. fractus cortex rubescit, folia oleę similia. Herba in aceto decocta proditur lienis inflammationibus & regio morbo mederi, & foeminarū purgationes elicere. Assueuerant etiam crudam in potu eosdem effectus præstare: semen cyatho dimidio potum, pituitā expur-

gare: venenis quoq; auxilio esse. Aeg. Lyciū ex diuersis genere substantiis cōstat, calida, tenui & discutiente, terrestri verò frigida & leuiter astringēte, vt in secundo abscessu desiccet. Calefaciēdo refrigerandóq; medium est: hac de causa ceu abstersorio in oculis obsecratis eo vtuntur: tanquā astringenti, in cœliacis, torminibus intestinorum, & maleficis vlceribus: at contra inflammationes, vt discutienti. Cæterū primas obtinet Indicū.

LYCOPSIs, quæ à nōnullis anchusa vocatur, foliis lactucæ longiorib. asperioribus, latioribúsq; crassis, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis, multis, cubitalibus: flore paruo purpureo: radice rubra, & adstringente. nascitur in campestribus. Aegineta, Lycopsis quàm onoclea anchusa, astringit quodammodo efficacius, similiter erysipelatis cum polenta illita cōuenit. Si læuis cum oleo inungatur, sudores elicit. Meminit Aegineta primū inter anchusas, & iterum suo loco.

LYCOPVS herba marrubio syluestri similis est, folio lupini pedis effigie, dissecto, grauis odoris, caule anguloso geniculatōq; fungosa intus medulla, radice frequenti capillamento fibrata. folia trita præsenteanco remedio imponuntur dissoluto stomacho.

LIGVSTICVM, quod alii panaceā, alii panaces vocant, plurimum in Liguria nasci-

λνκοψις.

4. genus
anchusæ
Gal. her.
lague de
chien.

λνκοπυς

Patte de
loup. ou
pectora-
le, ou
main de
S. Marie.

λινυσικό

Non est tur, in monte Apennino, Alpibus contermi-
 hoc offi- no: vnde nomen traxit. Panaces incolæ non
 cinorum ab re appellant: quoniam & radice & caule,
 Icuisticū. heracleotico panaci simile sit, & viribus ei-
 dem præditum. Gignitur in altissimis aspe-
 risque mōtibus, ac vmbrosis, maximè iuxta
 fluēta. cauliculum fert anethi geniculatum,
 tenuem, & in circuitu folia fertule campanę,
 molliora, odorata, propè verticem gracilio-
 ra, & longè magis diuisa: in cacumine musca-
 rium, in quo semen dependet nigrum, solidū
 & oblongum, sceniculo proximum, gustan-
 ti acre, & aroma olens: radix candida hera-
 cleotici panacis similis, odorata. Aeg. Eius &
 radix & semen adeò calefaciunt, vt menses ci-
 tent, flatūsque probè discutiant.

φιλυρία.
 Troescne
 ou druy-
 ne. offic.
 halcanne
 ou hēne.

LIGVSTRVM arbor est cypri magnitudine,
 foliis oleę, nigriorib⁹ & lationibus, fructu lē-
 tisci, nigro, subdulci, racematim coharēte. a-
 speris nascitur. Aeg. Tiliæ arboris folia sylue-
 stri oleę similiter astringūt, quibus cōmādis-
 catis oris vlcera iuuātur: eorūq; decocto col-
 luūtur: quod etiā potū vrinā & mēses trahit.

κρίνον.
 Lys.

LILIA coronamentis se dedunt, Liria à
 quibusdam vocata tradunt & rubra esse lilia.
 Aegineta, Lili flos temperamēto mixtus est
 ex tenui substantia, terrestri & nonnulla a-
 quosa temperata: quapropter oleum quoque
 ex eo cōfectum discutiēdi vires molliendiq;
 representat, vuluę inflammationibus accom-

modatum. Radix ac folia siccāt, abstergunt discutiuntq; mediocriter, quo sit vt ambustis conferant: succus ipsorum & neruorum vulneribus cum oxymelite prodest.

LIMONION, folia habet betæ, tenuiora & longiora, decem, sæpe plura: caulem tenuem, rectum, lilio æqualem, seminibus rubris scatētem, quæ gustata adstringunt. Semē tritum, & ex vino acetabuli mensura potum dysentericis celiacisq; prodest. rubra foeminarū profluuia sistit. Nascitur in pratis & palustribus. Aegineta, Semen eius austerum cū vino, celiacis, dysentericis, & sanguinē spuētibus datur, item ad fluorem muliebrem acetabuli mensura. λαμώνιον
Limoine
ou bette
de pre.

LINI semen ex primo gradu calidū est, inter humectantia siccantiaq; medium. Manducatum flatus creat, etiamsi frictū fuerit. λινόσπερμον.

LINGVA herba Plinio nascitur circa fontes. Radix eius combusta & trita cum adipē suis, alopecias emendat vnguentiū in sole. (Eandem alibi lingulacam vocat.)

LYSIMACHIA, quā aliqui lytron appellant, caules emittit cubitales, altioresve, fruticosos, tenues, prodeūtibz geniculatim foliis, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus: flore rufo, aut aureo. gignitur in aquis & palustribus. acerrimum nidorem suffita reddit: qua de causā serpētes fugat, & muscas interficit. Aegineta, Vm habet excellēter a- λυσισμάχιον.
Corneol
le, soucy
deauē,
ou pelli-
bosse.

strictoriā, qua & vulnera glutinat, & sanguinem cōpescit, tum ipsum, tum ipsius succus: intestinorum tormina & potum, & ab inferioribus partibus iniectum sanat.

λιθόσπερμον.
offic. &
med. oī.
b^o Moliū
solis.

L I T H O S P E R M O N à seminis duritia nomē accepit, foliis est oleæ longioribus, & latioribus, mollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt ramulis surculosis, rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iūci, in quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent foliis longis, inter quæ paruum semē, rotundum, crui magnitudine, duritia lapidea. Nasitur in asperis & æditis locis. Aeg. Alii diosporon, alij heraclion vocāt herbæ ætonichi dictæ semen est lapideum, album, quod cum vino albo potum calculos frangit, & vrinam pellit.

κίση.
Iuraicou
gasse.
λογχίτης
Nigri ca
petti.

L O L I V M, quod inter segetes nascitur. Aeg. Calfacit, siccatur, tertio fermē ordinē, iridi facultatibus simile.

L O N C H I T I S folia habet porri, latiora, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, veluti in terram procumbentia, pauca in caule, in quo flores ceu galericuli, hiantibus comicis personis similes, nigri, & è rictu albam exerentes velut linguā, quæ ad labrū inferius spectet: semen involutris clausum lanceæ simile, triangulum: vnde sibi cognomen tum arrogavit, radix dauci. Nasitur in sitietibus & asperis. Radix ex vino pota vrinam

ciet. Altera est lonchitis, quam aliqui asperā lonchitin dicunt. folia scolopendrii emittit, sed asperiora maioraque, ac multo magis diuisa. Folia viridia. Vulneribus mirum in modum profunt, in eisq; inflammationes excitari non patiuntur. arida pota ex aceto lienem absumunt, vel indurato medentur. Aeg.

LOTVS arbor est vastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibus gratā, stomacho facilem. Aegineta. Extenuat, siccat, & mediocriter astringit: qua de causa ad fluxū muliebrem, alui fluores si cū vino aut aqua bibatur, aut etiam infundatur clystere, salutaris est. pilos defluos cōfirmat.

Est & in Aegypto **LOTVS**, quæ in campis flumine inundatis prouenit, caule fabæ: flore paruo, candido, lilio simili, quem tradunt occidente sole comprimi, occludique: ad ortum autem aperiri. adduntque, caput ipsum vespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale papaueris, maximum: & intus grana ceu milii, quæ Aegyptii exiccant, & in panes cogunt. Radicē lotos hæc habet mali cotonei similitudine, quæ cruda coctāque manditur, decoctāque lutei oui qualitatem exhibet. (Aegineta nihil præterea.

LOTVM urbanū alii trifoliū vocant. nascitur in hortis. extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, cæterasque

λωτός.
Alysiæ
& bacca,
alyse.

λωτός ἁγία
γυπτία.

λωτός ἁγία
μικρος.

caligines discutit. Aegineta, Abstergit, modicè sic. calore temperata est.

λωτὸς ἄ.

γείος.

forte hæc
off. anda
cocha, &
corona
regia.

θίεμοι.

Lupin.

Sylvestris L O T V S nascitur plurimum in Libya. Caulem fert bicubitalem, aut etiã maiorem, multis alarum cauis. folia loto trifol. in pratis nascenti similia: semen fœnogræco, multo tamen minus, sapore medicato. Aegineta, Semen eius cal. secundo, habet nonnihil etiam absterforium.

Satiuus L V P I N V S non est. Gignũtur & sylvestres lupini, satiuus similes, sed omnino minores, qui eadẽ quẽ satiuus possunt. Aegineta, Lupinus esculentus quidẽ obstruendi viribus pollet: amarus abstergit, dissipat, & sine morfu deficcat, lumbricos occidunt illiti, & poti. Viscera purgant cum ruta & pipere potui. Cutis vitia extergunt. tumores dissipant cum oxymelite illiti. Sylvestres autem lupini amariores sunt, & omni ex parte satiuo valentiores.

offi. lupu
lus. gall.
houblon

L V P V M salictarium Plinius inter oblectamenta verius quàm cibos numerat. Caulibus aculeatis longissimis quia in vepribus & salictis reptat, foliis vitis albæ, hispidis & nigrioribus, flore cinereo ac multis exilibus folliculis squamatim compactili. Hoc frugibus admisto Germani suam condiunt cervisiam. Teneris eius turionibus in acetariis utimur. Refrigerat, & collectionum impetus lenit. Sedat stomachi inflammationes ex sero potus.

potus. Bilem regio morbo laborantibus detrahit. Pituitā in aqua intercutem exigit per aluum. in capitis dolore, qui medium capitis occupet, eius succus illinitur; item quoties immodicos æstus mitigare necessum sit.

LUTEAE herbæ Vitruuius meminit. Qui nō possunt, inquit, chrysocolle propter charitatem vti, herba quæ luteum appellatur, cœruleum inficiunt, & vtuntur viridissimo colore. (Luteam sunt qui lysimachium interpretentur.)

M

MACER ex Barbaria aduehitur, μακίσ.
offi. Macis.
M cortex flauescens, crassus, gustu perquam astringens. Aeg. Cortex est qui ex india importatur, sic. 3. inter calorem & frigiditatem medium obtinet. Est etiam astringens, tenuisq; unde cœliacis & intestinorum torminibus auxiliaris habetur. Porro macer, siue macis Arabum, quære in Moschocario.

MALABATHRYM arbitrantur aliqui esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris cognatione. permulta enim nardum olent, quemadmodum phu, asarum, niris, secus autem res se habet. Namq; malabathrum folium sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, lentis palustris modo innata s aquis, sine radice. Id collectum statim lino transluitur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis æstiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus vti: quod vbi

μαλαβάρθρον.
 offi. folium Indicum cinnamomi est, nō malobathri.

non euenerit, ne amplius quidem renasci. laudatur recens, ex candido nigricans, integrum, nec fragile, odore caput feriens, quod diu insuani odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmū verò & minutim contusum, præsertim si cariosum virus olet, vitiosum est. Aeg. Malabathri folium æquales spicæ nardi vires repræsentat.

μαλακό-
ριστος.
off. sigil-
lū D. ma-
rix.

MALACOCISSVM Democritus aquilex mollibus hederæ foliis depingit, caule tenero, sese cuiusq; quod fuerit nactus inuoluente. Subesse aquam ubi reperitur affirmat.

MALICORIVM in punica malo dicitur.

μαλάχην.
Mauluc.

MALVA satiuā cui longè aptior syluestri. Aeg. Syluestris mediocriter discutit, & emollit. Hortensis autem ceu humidior, etiā imbecillior est. Semen tanto viribus præstat, quanto & siccior est.

μολόχην.
trāsmari-
na rosa.

MALVAM maiore Græci molochen vocant, hāc Apulcius hastulā regiā dixisse mihi videtur: quāuis eadē sit asphodeli appellatio.

μύλα.
Pomicr.

MALIS omnibus frigida & excrementitia inest humiditas, quæ in eorū censu tenera & aquosa sunt, frigiditate cæteris & humiditate præstant. Dulcia aquosa quidem, non tamē manifestè frigida sunt. Austera dulcibus quidem frigidiora, sed minus humida. Acida frigida quidem & ipsa, verū incidendi humores ventriculo inhaerentes vim testantur.

Acerba, cuiusmodi cotonea & struthia sunt, frigido & terrestri donata téperamento, ventrem supprimūt, vulnera glutinant. Pari modo folia succi, & cortices arborū inter se differunt. Aegineta.

MAMIRAS veluti radiculae herbae cuiusdam est ceu geniculis frequentibus nodosis, quae cicatrices & albugines extenuare creditur, exterendi nimirum facultate praedita. Aegineta.

μαμίρας
Videñ cē
doronī-
cū offi. &
herbas.

MAMDRAGORAM, aliqui antimalū, alii circæam vocāt, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera. niger, quæ scēmina existimatur, thridacias appellatus, angustioribus foliis, ac minoribus quàm lactucae, graueolentibus, in terra sparsis. mala gerit sorbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorū radicibus inheret bene magnis, binis ternisve, inter se cōuolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis. verū is mandragoras caule viduus est. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis norion vocitatus. huius folia, magna, alba, lata, læuia, vt betæ: mala quàm alterius duplo maiora, colore in crocum inclinante, iucundè cum granitate quadam olentia: horū pomorū cibo aliquantum opiliones soporantur. radix, alterius similis, maior & cādidior, orbata caule. Succus fit è cortice recētis radicis tuso, & praelis subiecto: qui insolatus vbi

μανδρα-
γόρας.
Mandra-
gore.

concreuit, fictili reconditur. Malis quoq; succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad vsum suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias coquunt, & defæcatum ius seruât, cynthia quoque vno vtuntur, in peruiigiis, & doloribus, & ante sectiones vstionésque, ne sentiântur. Scarificata punctisq; multifariam aperta radice, erumpens lachryma, cauo vase recipitur. liquamentum autẽ succo lacteo præstantius est: sed non vbiq; vt experiëntia docet, radices lacteum succum delachrimant. Alium tradunt esse mādregoram, nomine morion, in opacis iuxta specus enatū, foliis albi mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, radicē ambientibus, quę mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Tradūt eam in pane, ossa, obsoniõve, drachmę pōdere deuoratā, vsum rationis intercipere. Obdormiscit enim homo, eo ferẽ quo comederit habitu, sensus impos, ternis quaternisve, ex quo data est, horis. Hac medici vtuntur, cū scindendi, vrēdīq; necessitas adest. Antidotū esse volūt radicē, cū manico salano potā. Aeg. Mandragoras frigefacit 3. Mala ipsius etiā caliditatē quampiam cū humiditate id referunt, vnde soporem grauē homini possunt accersire. At radicis cortex vehementissimus, nō refrigerat modò, sed etiā siccatur interior eius pars imbecillior est.

MARRVBIUM, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis. foliū pollicem equat, subrotundum, hispidū, rugosum, gustu amaro. semē in caulibus, & ex interuallis. flores verticillato ambitu, asperi. Nascitur propter ædificia, ruinas, & rudera. Aeg. Cal. 2. amplius autē siccat, iecur lienemq; obstructionibus liberat, excreationes è thorace & pulmonibus, mensesq; promouet. Illitum extergit, discutitque, præcipua extersoria incisoriaque vi præditum.

κεράσιον.
Porcum.
Marrou.
off. prassi
on viride

MARVUM herba cognita vulgò, surculo sa, flore origani, foliis multo candidioribus, flore odoratiore. Vim habet sisymbrio consimilem. substringit enim, & modicè calfacit. qua de causa illitu serpētia vlcera sistit, & in calidas illitiones additur. iuxta Magnesium & Tralleis copiosissima gignitur.

μαρρον.
herb. forte
mētha
syluestris

MASTICHE, vide Lentisci resinam.

MEDICA cum recenter prodiit, foliis & caule trifolio pratensi similis est. procedens verò folia contrahit, caules edens trifolii, & filiquas corniculorū modo intortas, in quibus semen lentis magnitudine dependet. Id siccatum, iucundi saporis gratia, conditaneo sali admiscetur. viride, quibus refrigeratione opus est, illitu suffragatur. Herba tota pro gramine vtuntur, qui pecora alunt. (Aegineata non habet.

μηδική.
grād tref.
fle ou foi
de Bour-
gongne.

μελίλον.

MEDION in saxis & opacis nascitur. folia habet iridis: caulem tricubitalē, & in eodem florem grandē, purpureum, rotundum: semine cnici, minuto radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Aeg. Medii radix vires semini contrarias præ se fert. est enim austera, & fluxiones comprimit, idcōq; muliebrem fluxum sistit. Semē quum tenuis incidentisq; sit facultatis, menses quoque proritat.

MELAMPYRO in Myāgro describitur.
MELANTHIVM, vide Gith.

μελίλων.

offic. &
vulg. melilot.
alii pratellā,
ou courō
ne royal.
le.

μενθός.

mos.
Menthic.

SERVULA Campana landatissima in Attica & Cyzico & Chalcedone nata. cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nolam, colore in luteum languescente, odore infirmo. Aeg. Diuersis facultatibus pollet: astringendi, discutendi, & concoquendi.

MELISSOPHYLLON, vide Apiastrū.

MENTHA, cognita herba est. Syueltris mentha, Latini menthastrū vocāt, hirsutior est folio, & prorsus maiore quā silymbrii, grauiori odore: quare minus ad sanorū vsus expetitur. Aegineta, Mentha Cal. 3. tenuis, acris, cum humiditate semicocta existit, cuius causa etiam in venerem incitat. Amari quoq; nonnihil obtinet, quo lumbricos enecat. Quæ verò acerbæ est, recentes sanguinis eruptiones coëxcer.

LEINOZOSTIS, aliqui parthenion, alii λινόζωσις
 hermubotanion appellant, foliis cōstat ocy. Mercuri-
 mi, minoribus helxinæ cognatis: ramulis du ale
 plici geniculorum nodo cinctis, alarū cauis
 multis: fructu foeminæ copioso, quandam ra-
 cemorū speciem præbente: mari è foliorum
 sinu depédente, paruo, rotundo, ceu binis te-
 sticulis vnà cohæréntibus. frutice dodrantali,
 aut maiore. vtraq; in oleribus manditur, ad
 aluū ciendam. Aeg. Aluum liberaliter subdu-
 cit illita discutit. Sciendūmq; est, eius semen
 infricatum corporis excreſcentias præter na-
 turam, quas vulgus vocat naphia, abolere,
 sicut experientia comprobatum est. Sed vi-
 ride semen esse oportet, & frequenter tuber-
 culis illis infricari.

MESPILVS, quæ à nōnullis Atonia vo- μίσπιλος 16
 catur, spinosa arbor est, folio acutè spine: fert Neflier,
 pomum suaue, exiguum, tribus intus ossicu- meslier.
 lis. qua ex causa id nonnulli tricoccon appel-
 lauere. tardè matureſcit, esu adstringit, sto-
 macho gratum est, aluumq; suppressit. Alte-
 rum mespili genus in Italia nascitur, quod a-
 liqui setanium, alii epimelida vocant. arbor
 foliis mali, sed minoribus: pomū fert rotun-
 dum, esui aptū, vmbilico latiore: quod astrin-
 git, seròque matureſcit. Aeg. Mespila, alii tri-
 cocca vocant, fructus est affatim acerbus, &
 vix esculentus, aluūmq; continens. Germina
 foliāque mespili impensè acerba sunt.

μῆλον. **M E O N**, quod Athamanticū vocant, in
 offi. anet Macedonia & Hispania plurimū gignitur,
 faulua ge anetho folijs & caule simile, sed eo crassius bi
 ber. anet nūm fermē cubitorum altitudine attollitur,
 tortu. sparsis in obliquum rectūmq; radicibus, lon
 gis, tenuibus, odoratis, linguam excalfacien
 tibus. Aeg. Mei radices Calefa. 3. sic. 2. idrōq;
 yrinam & menses cient. Liberalius meon as
 sumptum, capitis facit dolores.

μύαγρος. **M Y A G R O N**, aliqui melampyron vocāt
 Cameli- herba est surculacea, foliis rubiæ, pallidis, tre
 ne ou ca- pidanea. semen oleosum, scænogreco simile.
 maminc. Quod contusum igni torrent, per unctis que
 virgis ad lucernarum lumina vtuntur. hoc
 pingui, scabritias corporis leuigari, atque
 expoliri, constat. Aegineta, Quod in semine
 oleosum habetur, viribus est opplendi. Per
 peram apud Aeginetam duobus in locis, pri
 mum in Myagro, dein Myaro, eadem de re
 tractatur.

M Y L E S radix paruo bulbo similis est,
 constringit, itaque cum lolii farina apposita
 vterū apertū sanat. Galenus: (Eandē esse ap
 paret Dioscoridi dictā Moly. itaq; illius de
 scriptionem hinc emendare poteris.

M I L I A R I A herba milio gentilis est: no
 mien habet, quod milium implicādo enecet.
 Hæc trita, & cornu cum vino infusa, poda
 gras iumentorum sanat.

M I L I T A R I S, vide Lactoris.

MILIVM in panes coactum, minus cæ- κίχρεος,
 teris frugibus alit, Aeg. Miliū frig. 1. sic. 2. Ha Millet
 bet etiam modicam extenuandi facultatem:
 extrinsecus igitur in sacculis ad fouendū ad-
 habitum, & illitum desiccare consuevit.

MILIVM Indicum in Italiam Neronis κίχρεος.
 principatu conuectum, nigrum colore, am- ινδικός.
 plum grano, arundineo culmo: Adolefcit ad Miliū sa-
 pedes altitudine septem, prægrandibus cul- racenicū
 mis, lobas vocant, omnium frugum fertilissi- .i. pēgri-
 mum. Ex vno grano terni sextarij gignūtur. num
 Seri debet in humidis.

MYRIOPHYLLVM, siue millefolium, μυριόφυλ-
 caulis est tener, singularis, vnica nixus radi- λον.
 ce: plurimis foliis, læuibus, fœniculo simili. Mille
 bus: vnde nomen accepit. caulis flauescit va- feuilles
 rius, ac veluti ex industria delimatus. nasci-
 tur in palustribus. Aegin. Adeò siccatur, vt vul-
 nera glutinet.

MYRICA, seu tamarix, arbor vulgò co- μυρίκη.
 gnita est, cū apud pigras & stagnantes aquas Bruyre.
 enascatur, fructum quasi florem ferens com huius ra-
 page muscosum. Aegyptus Syriæque alteram dix casia
 gignunt mitiorem, syluestri cætera similem. off. vocat̃
 Fructum parit gallæ proximum, inæqualiter & pro o-
 astringentem gustu. Aegin. Tamarix incidit, dorata ca-
 extergitque, ita vt manifestè nō siccet, sed a- sia virtut
 strictiōnem quoq; nonnullam obtineat, qua
 de causa decoctū ipsius potū lienes adiuvatur,
 dentiūmque doloribus medetur. Fructus &

cortex ipsius, gallæ virtute proximus est. Cinis arboris vehementius exiccat.

μύρρα.
Myrrhe

MYRRHA lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ nõ dissimilis. è cuius vulnere defluit lachryma in subiectas tegetes. alia circû caudicem cõcrescit. Dicitur ex his aliqua pediasimos, præpinguis qua expressa, statte emittitur. alia gabirea, pinguißima, læto & pingui solo nascens: ea copiosam sudat stattem. Omniû prima est, quæ troglodytica appellatur, accepto cognomine ab loco, in quo prouenit, splendens, subuiridis, ac mordens. quinetiam legitur tenuis quardã, quæ à troglodytica secunda est, bdelij modo mollis, verû odore grauiuscula, aprie nascens. Alia caucalis cognominatur, prætermo- dum exoleta, nigra, & retorrida. Omnium deterrima, quæ ergasima dicitur: pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gûmis imaginem vergens, & viribus eius proxima. improbatur aminnea cognomine. Ex iis pãstilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odorati: è siccioribus haudquaquã pingues, & inodorati. minus odore pollet, quæ oleum non admisit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gûmi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, squallore obsita, leuis, vndique concolor, quæ confracta venas vnguium modò candidas & læues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata

caſſaciens. ſupernacua & inutilis eſt ponde-
roſa, coloris picej. Fit ē myrrha, perinde at-
que thure, fuligo, & (v̄ poſtea oſtendemus)
ad eadem cōueniens. Bœotica myrrha, diſſe-
cta radix eſt arboris cuiuſdam in Bœotia na-
ſcentis. Melior eſt quæ myrrhâ odore repræ-
ſentat. Aegineta, Cal. ſic. 2. Capitis vulnera ſi
illinatur glutinat. item amarâ vim obtinet,
qua ventris lumbricos & fœtus occidat. ad
hæc abſtergit, coq; oculariis medicinis tem-
peratur. humores pectori infixos expurgat,
ita vt fauces nō aſperet. Bœotica myrrha vi-
res habet calefaciendi, emolliendi, & diſſol-
uendi.

MYRRHIS, ſimillima eſt cicutæ, cauſe μυρρίδα
foliisque. radix ei oblonga, mollis, rotun- cicutaria
da, cibo non inſuauiſ. Aegineta, Calid. 2. ac
non nihil etiam extenuat. radix illi odora-
ta dulciſque eſt, menſibus mouendis, & hu-
moribus ē thorace ac pulmone repurgandis
idonea.

MYRTVS ſatiua nigra vtilior eſt medici-
næ quàm cādida, & in hoc genere multò ma-
gis montana ſemen tamen imbecillius parit. μυρτίνα
Murte

MYRTIDANVM dicitur myrti adna-
tum inæquabile, verrucoſum, intumeſcēſq;
& cōcolor. quod perinde quaſi manus myrti
caudicem amplectitur. magis quàm myrtus
adſtringit. tuſum addito aſteto vino repo-
nitur, coactumque in paſtillos ſiccatur in μυρτίδα
vōv.

ymbra. multo efficacius & folio & semine, cerato, pennis, infessionibus, cataplasmatibus admistum, ubi adstringendum aliquid est. Aeg. Myrtus ex diuersis composita est substantiis, pollet in ea terrestris frigiditas, qua valenter siccatur. Myrtula verò, seu myrtidanium, maiore vi in astringendo & siccando scaturit. Folia etiam aridiora viridibus magis siccant. Fructus succusque, tum foris applicati, tum intus assumpti, persimiles vires præ se ferunt.

μυθριδά-
τον.

M I T H R I D A T I O N folia habet, inquit Plinius, duo à radice acantho similia, caulibus inter utraq; sustinens florem roseum.

μύξα.
Myxaria
fructus
offi. & se-
besten

M Y X A arbor Damascenæ pruno popularis, in Syria & Aegypto olim gignebatur, nunc est familiaris Italiæ. Fructus etiam myxa, vel myxaria dicuntur, olim Sebastii, in Augusti honorem, ut verisimile est. Aegin. Arboris fructus est minor quidem prunis, facultate verò consimilis.

μύλν.

M O L Y folia habet graminis latiora, humi sparsa. florem albæ violæ similem, sed minorem, lactei coloris: caulem candidum, quaternum cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid quod alij speciem referat. radix parua, bulbosa, quæ mirum in modum valet ad aperiendas vulvas, si trita cum irino unguento in pello subiiciatur. (Aeg. non habet, præter rutam sylvestrem.) Vide Mylen.

Aliud M O L Y in ruta sylvestri describitur.

MOLYBDAENA herba, id est, plumbago, Plinio in aruis nascitur, folio lapathi, radice crassa, hispida, qua commanducata, oculisque subinde religata, plumbum (quod est genus vitij) ex oculis tollitur.

μολύβδαινα.
offic. maior perficaria

MOLLIGO hippophæstum est.

συκάμι-
νος.
Mercur

MORI fructus maturus quidem aluū subducit, & medicamentis stomaticis alijs, quæ moderatam requirunt astringtionem, vtiliter miscetur: immaturus ubi exaruerit, perquam astringens fit medicamentum: cortex autem radices arboris etiā amaritudinis cuiusdam particeps, purgare potest, eoq; latos lumbricos occidit. foliorum autem surculorumque vis subducentium & comprimentium media quodammodo existit. Aeg.

MOSCHOCARYON, vel moschocarydion Græcis recētionibus appellatū India mittit (nos ea imitatione nucem moschatam nominamus) Hic fructus dum recēs est, totus succo pingui & oleoso madet, sic ut in vnguentum exteri possit. vnde multis myrsica, seu myristica, id est, vnguentaria nux dici cœpit. Probatur recens, quæ nullam senserit cariem, ponderosa, præpinguis, colore in rubrum inclinato. Aluum astringit, distendentes stomachum spiritus discutit, oris suauitatem commendat, stomachum & iecur roborat. Létigines in facie, & impetigines emendat. lienem incremento laborātem reprimat.

μοσχακάρυον.
Noix muscade

Apud Aëtium Caryon hoc aromaticum (sic enim vocat) calefacit ficit. 2. Arabes macis nomine extimā intelligūt huius nucis membranā vel folliculū. Antefertur is qui colore ruffo vel flauo rutilat, odore suauis, cum leui acumine. improbatur nigricās. Sic. 3. partiumq; tenuitate præstat, cæteras habens suæ nucis dotes. Arbos autem ipsa vulgari Persico similis traditur, roseo flore, & nuce, quam declarauimus, eiusdem propē effectus cuius & caryophyllon.

Βεϋον.

Bryon, id est *mvsvs*, à quibusdam spiachnon appellatur. in cedro arbore, populo alba, & quercu inuenitur. Optimū est cedrinum: proximum populneum. in quo genere candidum & odoratius præstat, nigricans improbatur. Aeg. Inuenitur etiam in piccis. Discutiendi simul & molliendi vim moderatam obtinet.

Βεϋον θαλασσιον.

Marinus *mvsvs* nascitur in scopulis, testaceisque, haud procul à mari, gracilis, capillaceus, caulis ex pers. Aegin. Refrigerat simul & astringit, coque feruentes inflammationes illitum adiuvat.

Βεϋονισι

N

N

Aper cocta radix inflat, modicum alit semen ciustorum venenorum vires heberat. antidotis admiscetur. Conditur sale radix. Aeg. Napus

& rapa si bis coquatur, nihilominus quàm reliquæ stirpes alunt: continuè autem assumpta, crassum succum procreant.

N A R C A P H T H Y M ex India deferitur, Nabach. corticosum, simile sycomori libro, quod in- Lasahatè cūdi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis compositis. Aeg. Naocāthon, sunt qui nacaphthon dicunt, Indicum est odoramentum, quod ad astrictos fœminarum locos suffitu vaporatur.

N A C I S S Y M sunt qui, ut lilium, hrium *vāpētatos* appellarint. folia porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora: caulis vacuus, & *Narccs.* sine foliis, supra dodrantem attollitur. flos albus, intus croceus, in quibusdā purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen velut in tunica, nigrū, longū. probatissimum nascitur in montibus, suau odore. cæteri porrum imitantur, atque herbaceum virus olēt. Aegineta, Radix eius adeò desiccat, ut maximis vulneribus sit glutinandis: imò etiam tendinum præcisionibus confert. Cæterum abstergendi & attrahēdi vim quandā habet.

Duo **N A R D I** genera: vnum Indicum, alterum Syriacum appellatur, non quòd in Syria proueniat, sed quòd mōtis in quo oritur, *vāpētatos* pars vna ad Syrios, pars altera ad Indos fletur. Ex hoc Syriaci genere præcipuum est recens & leue, largam gerens comam, flavum colore, perquàm odoratum ac cyperum

redolēs, breui spica, amaro sapore, linguam
 siccate, quod diu in sua odoris gratia perma-
 neat. Ex indicis autē nardum quoddā Gan-
 gitis vocatur, à fluuio Gange, apud quē ena-
 scitur, montem præterfluente, quod genus ob
 multam loci, in quo prodit, vligit. ē, viribus
 infirmius est, atque procerius adolescit, plu-
 res ferēs spicas ab vnica radice comosas, vnā-
 que conuolutas, ac grauiter olentes. Monta-
 num autem odoratius, spica breui ac mutila,
 odore cypero vicino, cæteras habens Syriaci
 dotes. Est & genus quoddam, cui Samphari-
 tico nomē locus indidit, frutice breui, in ma-
 gnas se spargens spicas, candidiore interim
 medio caule, hircorum virus supra modum
 redolente: quod improbatur. Madefactum
 vendi solet. quod vitiū ex eo deprehenditur,
 quod candida sit spica, & squalida, nulloque
 puluere obsita. Adulteratur stilbio cum aqua
 aut palmeo vino, inspissationis ponderisque
 causa inspirato. Intueri autem oportet si lutū
 radicibus insideat, & incerniculo puluerem
 excutere, eluendis manibus vtilem. Aeg. Spi-
 cæ nardi radix cal. 1. sic. 2. particeps est etiam
 astringētis cuiusdam qualitatis, acris & suba-
 maræ. Iocinori prodest & stomacho, extrin-
 secus admota & ebibita. Vrinā mouet, & in-
 terancorum fluxiones desiccatur. Indica valen-
 tior est quàm Syriaca, & nigrior.

νάρδος

κελτική

Celticū N A R D V M nascitur in Liguria

Alpibus, siliuca patrio nomine appellatum, prouenitq; in Istria. Exiguè fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido, florem luteum. Cauliculorum & radicum duntaxat vsus est, & odoris suauitas: vnde pridie fasciculos aqua abluerè expedit, & exempta terra paulo solo atque humenti subiecta charta reponere, post die repurgare. siquidem vtile, cum aceroso alienoque propter humoris vim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus vocatur, ab odoris grauitate: sed facilis cognitio. namque herba candidior est, sine cauliculo, minoribus foliis, radice neque amara, neque odorata, vti verum nardum est. Itaque radices atque cauliculi, abiectis foliis triti secernuntur, vino excipiuntur, digerunturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asseruari debent. Laudatur maximè recens, iucundi odoris, radice numerosa coherens, plenum, nec fragile. Aegineta, Nardus Gallica superiori vires habet æquales, sed imbecilliores, præterquam ad urinam ciendam, calidior enim est quàm illa, minúsque astringit.

Montanum NARDVM, quod ab aliquibus thylacitis & niris appellatur, in Cilicia & Syria nascitur, surculo & foliis eryngio similibus, minoribus, minimè tamen spinosis

νάρδος
ορεινός

asperisq;. Radicibus binis nititur, aut pluri-
bus, nigris, odoratis, ceu hastulæ regię, sed
longè gracilioribus, & lōgè minoribus. Ne-
que caulem, neq; fructum, neq; florem pro-
fert. Ad eadem, ad quæ Celticū, efficax. Aeg.
Nominatur etiam pyritis, iam commemora-
tis est infirmior.

ἄσπερς

μῶν.

Nasitert
ou cresō
de iardin

N A C A P H T H V M. Vide Narcaphthum

N A S T V R T I V M optimum constat es-

se Babylonicum. Aegineta, Semen eius fina-
pis modo vrit, vnde etiam illitum cutem ex-
asperat. Crassos humores cum aliis potum
incidit. Herba quidem arida semini viribus
respondet humida moderatior est, ideoque
crudam ipsam assument.

ῥιόνιον

ῥιόνιον

ῥιόνιον

Rosages

N E R I O N aliqui rhododaphnen, alij
rhododendron vocāt, frutex est vulgaris no-
titiz, longioribus quàm amygdala foliis, a-
superioribusque: flore in rosam conformato:
fructu nuci græcæ simili, corniculato, qui pa-
tesfactus quandam lanosam naturā ostendit,
spinarum pappos repræsentatē: radice lon-
ga, acuta, lignosa, gustanti salsa. nascitur in a-
mœnis, maritimis, & secus amnes. Aegineta.
Nerion extrinsecus illitū discutit: in corpus
assumptum occidit.

N I G E L L A quære Gith.

νύμφαια

offic. Ne

puphar

N Y M P H A B A nascitur in paludibus &
stagnantibus aquis, foliis fabæ Aegyptiæ, mi-
noribus, & longioribus. aliis in summa aqua

aliis demersis, pluribus ex radice eadem pro- vulg. iaul
deūtibz: flore lilio simili albo, & in medio net deau,
crocos habente, cum defloruerit, vt rotūdum ou chou
malum, aut papaueris caput, extuberat. ni- deaue
gro semine, denso, & lato, lenti gustus. caulis
est læuis, niger, minimè crassus, ciborio co-
gnatus. radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ
autumno sequatur. Nymphææ nomen sibi
vendicasse videtur, quoniam aquosa amet.
plurima inuenitur in Elide, in Anygro ame-
ne, & in Bœotia Aliarto. Est & altera nym-
phæa, cuius flos blephara dicitur, foliis ante-
dictæ, radice alba, scabra, flore luteo, niten-
te, rosæ simili. Nascitur in Thessalia, amne
Peneo. Aegin. Nymphæa vires habet, sine ro-
sione ficcas, quibus & ventrem reprimat, &
genituram arefacit. Quæ radicem albam ha-
bet, valentior est, eoque fluxum muliebrem
cū vino nigro & austero pota persanat. Quæ
verò nigram, deterforia quoque vi nonnulla
pollet, eaque vitilignes, alphas dictas, cum
aqua exerit: pilorum defluuia cū pice liqui-
da illita replet.

N V C E S auellanæ, quas & leptocarya vo- Noysette
cant, stomacho infestæ sunt. Aeg. Vocant & ou auc-
ponticas. frigidiores sunt, & austera: in cæte laine
ris, iuglandibus æquales. κάριον βα

N V C E S iuglandes, quas nonnulli Persicas σιλικόν,
vocāt. Aegin. Nucis arboris coliculi aliquid ή περισ-
habent quod astringat, plurimum iuglan- νόν, ποικ

dium calyx puluinatus. succus itaque eorum decoctus cū melle, stomaticū fit medicamentum. Interius inde putamen carinatū vstum extenuādi vim acquirit, & sine rosione siccatur. Quod in eo clauditur edendo aptū, natura oleosum, facilè bilem auget. Confectum ex eo oleum extenuandi tumores, & putredines quas sepedonas dicunt, discutiendi vim obtinet. Flaccescences itidē vetustate nucis membranæ, cutis vitia abstergunt.

κάριον
ινδικόν.
La grāde
noix

N V X Indica à recentioribus Græcis recensetur. Fructus palmæ cuiusdam Indicæ præmagnus atque pinguis, cuius oleum butyro quoque præferunt, bonitate succi. Calefacit secundo, humidat primo. Biliosis eo vsu interdicitur. Tineosis ventris animalia pellit. Oleum quod ea exprimitur, cum sentit vetustatem, flatus digerit. Lumborum & genuum dolores mulcet. Sanguini à spiraculis venarum sedis mananti sublinitur ex oleo, quod nuclei malorum Persicorum rediderunt. Vesicæ quoque malis opitulatur, & aluum sistit oleum quod recens nux stilauit.

O

ὠκίμοις.
Oc.
offic. &
herb. al.
ba cacia

O

CIMOIDES, Latini ocimastrium vocāt, folia fert ocimi, & ramos dodrantaes, hirsutos: si- liquas hyoscyamo similes, semine vt gith nigro, prægnantes. Aeg. Sunt qui philetarion

vocent. Inutilis quidem radix est: semē verò vulg. potuliculis tenue, citra rofionem siccans. *potularia*

O C I M V M vulgò cognitum. Aegin. Cal. *ὄκιμονοι*
2. habet & humiditatem quandam excremē- *Basilic*
titiam, propter quam neque vtile est intus af-
sumptum: extrinsecus autem illitum discutit,
& concoquit.

O C Y M V M pabuli genus apud antiquos *ὄκυμον.*
erat, segete viridi, dissecta, antequam gereret *Dragee*
siliquas: eo citabant aluum bubus. Varro di- *aux che-*
ctum putat à celeritate proueniendi. *uaulx*

O D O N T I D E S scœni genus fruticosum, *ὀδοντι-*
triangulis flagellis, geniculatis, nigro arti- *dis.*
culorum nodo, foliis polygono lōgioribus, *Rust. scœ*
hordei semine in alis, cauliculis dēsis, ab ea *naria*
dem radice geniculatis, flore purpureo pusil-
lo: nascitur in pratis. Dentium dolori mede-
tur cauliculorum eius decoctum in vino au-
stero: inde ductum nomen.

O E N A N T H E folia habet pastinacæ: flo- *οιρανθου.*
rem candidum: caulem crassum, palmi al-
titudine: semen atriplicis. radicem magnam,
in multa rotunda capitula extuberantem. na-
scitur in petris. Caulis eius, & folia, cum mul-
so vino pota, secundas eiciunt. Radix è
vino, vrinæ stillicidio conuenit (& regio
morbo, vt Paulus adiecit, Dioscoridem ci-
tans.)

O E N A N T H E N diuersam in Vite sylue
stri dedimus.

ἔλαια. **OLEA** ramusculi quantum astringunt, tantum etiam refrigerat. Fructus qui exacte ematuruit, moderate calidus est. Immaturus maiorem tum astringendi, tum refrigerandi vim repræsentat. Aeg.

ἔλαια
αἰθιοπ.
κῆρ δ' α-
κρον. **LACHRYMA** quā Aethiopica olea stil-
lat, scammonia similis quadantenus est, ful-
ua, stillis exilibus constans, mordax. quæ au-
tem ammoniaci, aut gummi similitudinē re-
fert, colore nigricans, nec gustu mordens, su-
peruacua est. Nostrates oleæ, oleastrique, si-
mitem lachrymā sudant, quæ commodè ad
oculorum hebetudines illinitur. Appellatur
antem Aethiopica & agrestis olea. Aegine-
ta, Oleæ Aethiopica lachryma ammoniac-
co tenui similis, vires habet extensorias: qua-
re ad cicatrices, albugines, hebetudinesque
oculorum ea vtuntur, & ad dentium dolo-
res, si cauis ipsorum iniiciatur, efficax est.
Nonnulli verò syluaticam esse hanc oleam
asserunt.

ἐνέργα. **ONAGRA**, siue onothera, aut onuris, fru-
tex est arboris instar, fragrandis, amygda-
lino folio, sed latiore, lilio non dissimili: flo-
re rosaceo, magno: radice candida, longa: cū
siccata est, vinum olente. nascitur in monti-
bus. Aqua in qua radix maduerit, in potu da-
ta, feras mitigat, & cicures facit, illitu quoque
tetra vlcera mulcet.

ἐνὸ βρυ-
χίς. **ONOBRYCHIS**, folia habet lentis, lon-

giora paulo, caulem dodrantalem, florē purpureum, radicem parvam: nascitur in vliginosis & incultis. Herba suapte vi, si trita illinatur, tubercula dissipat. cum vino pota, strangurias sanat. illita ex oleo, sudores mouet. Rarefacit, & discutit. Reliqua sunt eadē Dioscoridi.

ONOSMA, oblonga folia habet. ad similitudinem anchusę, longitudine quatuor digitorum, & vnius latitudine, mollia, in terra iacentia, sine caule, sine semine, sine flore. radice nititur longa, tenui, infirma, rubescēte. gignitur in asperis. Aegineta, Onoma, vel onomis, vel phlomitis, vel ononis, acrem amarāq; vim obtinet, eāque ob causam folia eius cum vino pota, fœtus occidunt, expelluntq;. (Hippocrates, Onosma simpliciter radicem appellasse mihi videtur. *ὄνοσμα.*)

OPION optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facillē aqua diluatur, læue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandum non vt cera coëat, & in sole diffundatur: dein admotum lucernis, non atra luceat flamma: extinctum denique, odoris vim cōseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut sylvestris lactucę succo adulterant. Verū glaucio fucatum, in dilutione croci colorem reddit. lactucaceo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: gummi vitiatum,

*Papaue-
ris succus*

splendescit, & infirmum est. Nec desunt qui eò dementia deuerint, vt adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorū medicamenta, dum mollius atque rufius appareat. Hoc autē modo is excipitur succus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & prælo exprimunt, terentēsq; in mortario digerunt in pastillos: id meconium vocatur, multū opio ignauius. Porro opij faciendi ratio hæc est, Cū ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutē incidere oportet, lachrymam exeūtem digito in concham abstergere: nec multo post redire, vt cōcreta inueniatur. etenim quæ tum, aut postero die etiā offenditur, in vetere pila teri debet, & in pastillos cogi. Cū tamen inciditur, retrocedendum est, ne vestibus succus deradatur. Aeg. Papauer, quod prolixiore & proceriore cōstat calyce, medicatius vniuersis est: quapropter stuporē inducit, quousq; interimat. Nam & ipsum, & eius lachryma, quam per excellentiā opion nūcupant, quarto refrigerantium abscessui ascribuntur.

O P O P A N A X, lege Panaces.

obier ou
opier

O P V L V S corno similis arbor, arbusculo Gallico faciundo idouea, vlmī proceritate adolescit, caudice recto, enodi, rarioribus ramis brachiato, frondibus ferē vitigneis, bacis racematim dependentibus, prima puber-

tate viridibus, à maturitate puniceis. Ieiunū solum horret. Vitæ alit: verum quia frondē non habet idoneam, à plerisque repudiatur. Nullus eius in medicina traditur vsus.

Testiculus, quem Græci cynosorchin vocāt, foliis circa caulem mollis oleæ similibus in terra stratis, longioribus angustioribus, leuibus caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, vt bulbi. nascitur in petrosi, & sabuletis. Testiculus alto nomine serapias, Andrea authore, vocatur: quoniam radix ad multa utilis sit. foliis est porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarū sinu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis, radice testiculis simili. Aegineta: Maioris in cynosorchi radicis humida vis & calida est, cōque venetrem incitat. Minoris calida & sicca, vnde venerē coërcet. Serapias, vel thriorchis, priore valentius desiccet, quare laxos tumores dissipat, vlcera sordida & putredini obnoxia repurgat, herpetas abigit: inarescētā autem magis siccet. Quoniam verò substringere idonea est, aluum quoque cum vino pota retinet.

OREOSELINUM, caule est dodrantē alto ab radice tenui exeunte: per cuius ambitum rami & capitula cicutæ, multo tamē te-

ὄρχις.
off. testi-
cul^o canis
& satyri-
on min^o,

σεραπίης

ὄρεοσελί-
νον. Νό-
ε-
απί-
μό-
τανον.

nuiora : semine cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui. nascitur in petrosis, & montibus. Nec hallucinari nos oportet, existimantes oreoselinum esse, quod in saxis provenit. aliud enim est petroselinum. Aegineta, Viribus domestico æquale est, validius tamen.

ὀρίγανον.

Origane
ou mario
laine dā-
gle terre.

ὀρίγανον.

Mastich-
ma herba
vulg.

ὀρίγανον

ἀγριον.

ORIGANVM Heracleoticum, quod & cunilam vocant, folium habet hyssopo non dissimile, umbellamque nō in rotæ speciem orbiculatam, sed veluti multifidam, semine in summis virgis haudquaquam denso.

Quæ onitis appellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior. Semen veluti conium ætos corymbos habet. Vis ei origani Heraclei, sed multo inefficacior. Sylvestre origanum, aliqui panaces Heracleion, alii cunilam vocant, ex quibus est Nicander Colophonius : foliis est origani, ramis tenuibus, dodrantem altis, in quibus umbellæ anethi insunt, flores candidi, radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis à serpente, folia & flores ex vino poti auxiliatur. Aeg. Omnia origani genera incidendi, extenuandi, siccandi, & calefaciendi vires in tertio abscessu ostendunt.

ὄρυζα.

Riz ou
hordeū
gallaticū

ORYZA frugum generis est, in palustribus riguisq; nascens. Mediocriter alit. Aegi. Vim quandam astringentiam præ se fert, quæ etiam ventrem mediocriter cohibet.

ORNEOGLOSSON arbor est vlmispe ὄρνις:
 cie, foliis amygdalæ, prælogis siliquis in sur- γλωσσον:
 culorum cacumine prodeuntibus oleagina off. lague
 magnitudine, in quibus medulla inest lin. doyfel
 guæ auis similis, vnde nomē: exterius rubra,
 intus ex candore in luteum vergens: sapore
 acri, cum nonnulla amaritudine, Ea cal. 2. la
 terum dolores sedat, vrinam ciet, venerē sti-
 mulat, genituram auget.

ORNITHOGALVM cauliculus est te. ὄρνιθα:
 ner, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus γαλον:
 aut quatuor in cacumine mollibus agnatis, à Charles;
 quibus flores prodeunt, foris herbacei: & cū
 hiantes se pādunt, lactei visuntur: inter quos
 dissectum, cachryos modo, capitulum emi-
 cat. Coquitur cum pane, vt melanthium, ra-
 dix bulbosa, cruda & cocta manditur. (Aeg.
 non scripsit.)

ORNVS arbor satis procera, caudice te. Fresne
 reti, læui cortice, spisso, ramulis vtrunque pin- châpe-
 natis, folio fraxini, paulo profundiorib⁹ cre- stre.
 nis per ambitū serrato, bacculis racematim
 coactis, ab adolescentia rubescentibus, secun-
 dum maturitatē ex purpura nigricātibus, sa-
 pore ex acido in amarū degenerante, mēspī-
 laceo quasi concretu, multo graciliore. Habi-
 tu reliquo & effigie tota fraxinum æmula-
 tur. quare Lucio Columellæ orni tyliēstres
 fraxini sunt, foliis quā cæteræ lationibus,
 nec deterio rem frondem, quā vlmī præ-

stant. Capræ autem & oues libentius etiam hanc frondé appetunt. Asperis & sitientibus locis gaudet, môtēs amat: In plana etiâ descēdit, ita vt viti quoq; copuletur. folia ex vino bibuntur ad iocinoris & laterum dolores, aquæ subter cutē tumores reprimunt. Corpus obesum sensim ad maciem reducant, si cum vino terantur ad virium portionē, ita vt puero quinq; folia tribus cyathis dentur, robustioribus septem quinque vini cyathis. Scobs eius & ramenta pernicioſa traduntur, proinde vitanda.

ὄροβῆχχ
Tenic.

OROBANCHE cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruber, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, & in luteū vergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter quædam legumina nasci constat, & ea strāgulare. vnde orobanche sibi cognomētum vsurpauit. Estur, vt olus, cruda, & in patinis, asparagi modo decocta. legumentis addita, coctionem accelerare creditur. Aegineta, Frig. sic. i.

ὄσυρις.
offi. linaria.

OSYRIS, frutex est niger, ramulos ferēs tenues, lentos, fractūque contumaces: & in his folia quaterna, quina, senaue, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescētia. Decoētum eius potum, iuuat arquatos. Aeg. Osyris, è qua scopæ fiunt, amara est, & iccoris referandi vires habet.

OSTEOCOLLON Macedones vocant ὀστέκλον.
herbam saxis & moenibus familiarem, medi-
ci polygonion, aliqui talantion, vulgus sym-
phyton appellant. Perpetuò viret, viuítq; fo-
liis vidua: ramulos instar iuncipensiles, cir-
rosos, tenuioris proceriorisque spartí simi-
les spargit. Hac tradunt dissectas carnes coa-
lescere, si coquatur vnà, itidē ossa fracta fer-
ruminare.

OTHONNA aliqui maioris chelido-
niæ succū esse aiunt. quidam glauci. alii suc-
cū floribus corniculati papaueris expressum.
alii permistos cœrulæ anagallidis, hyoscia-
mi, & papaueris succos, esse contendunt. alii
Trogloditicæ cuiusdam herbæ succum, quæ
othonna vocatur: nascíq; eam in eo Arabiæ
tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna
foliis crucæ, perforatis cribri modo, & velu-
ti à tineæ derosis, squalore obstitis, paucis, flo-
re croci, latifolio. quare quidam anemones
speciem esse putauerunt. Aliqui tamen affir-
mant, lapidem esse Aegyptium, in Thebai-
de nascentem, exigua magnitudine, æreo co-
lore, gustu, cum feruore quodam & astricti-
one mordaci. Aegineta, Othonna detergit,
erodítq; omnia quę claritati oculorum offi-
ciunt exterens.

OXYACANTHA Quærq; Acuta
spina.

OXYAN Græci fagi genus alterum vo-
cunt ὀξύαν.

Nōn est ornus. cant. Lydi Myson, nostri Scissimā: in tenuissimas enim secatur laminas. Glandiferā non est, abictis aspectu, florens, erecta, enodis, illi crassitudine proceritateque ferē æqualis, materia colorata, robusta, nervosa, cortice leui, folio crasso, bifido, longiore quā pyri, per extremum aculeato. Fructus glandea effigie lauis, calyculo includitur echinato quidem, sed placido ac blando, nec vt castanea hispido, cui nihilominus similis est & dulcedine & succo. Radices arbor nec mukas nec altas agit, quæ summo cespite gaudeant. Minoribus nauibus cōmendatur: ad carinas, itē ad testudinē plaustrorum, vestibulorūque vilem fabricam specie visenda.

pain à coqu, offic. trifoliū acetosum, ou alle-luya.

παιονία. Piuoine.

oxyris herba Plinio à sapore dicitur, tribus tantum foliis.

AEONIA, siue glycyfide, Græcis aliquibus Pétoboron dicitur. sunt qui Idæos dactylos radicem pæoniam vocant. caulis altitudine sesquipedis adolefcit, comitātibus multis stolonibus. Huius duo genera, mas folia iuglandis habet: in fœmina verò, smyrnii more diuidūtur. summo caule siliquas emitrit, veluti græcas nutes. in quibus, cum dehiscunt, multa granula rubra, acinis puniceorum similia, inueniūtur, & in medio nigra, quinque aut sex, purpurea. radix maristenuis, digitali crassitudine, &

palmi longitudine, gustu astringēs, alba: fœminæ radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inherēt, vt in hastula regia. Aeg. Ali qui pētameron vocant, radicē habet acrē, & leuiter subamaram, & siccantē cum nōnulla astrictione. menses cit, renes & iecur purgat instar amygdalæ pota cum vino: quod si austerum sit, alui quoque fluores coërcet. ad. alligata verò puero, morbum comitalem abigit.

PALIURVS frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum inuenitur. Aegineta, Paliuri folia & radix astringunt, eoque aluum fluentē sistunt: tubercula, quæ dicuntur phymata, non nimis calida discutunt. Semen eius tam vehementi incisoria virtute valet, vt & calculos conterat, & excreationibus è pectore auxilietur.

πυλιύρος
Aubepi-
ne, fenel-
les, grose-
lier. aliis
ioumarī,
ou ioma-
rin.

PALMA in Aegypto gignitur. Ea medio maturitatis vigore, autumnō decerpi solet, Arabici myrobalani similis, pomatis cognomine, colore viridi, & odore mali cotonei. q̃ si ad maturitatem peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet.

φοίνιξ
Palme.

PALMA, quam aliqui elaten aut spathan ἑλάτη. appellant, fructus palmarum adhuc florentium, inuolucrum est, calyxque, quo inspisamenta vnguentarii vtuntur. Optima habetur odorata, adstringens, ponderosa: præ-

Palmula clusa, intus pinguis. Aegine. *Palmae fructus*,
 vulg. *Dates* ou *figues roy* qui iam ematuruit, calidus mediocriter est,
 alle. tum intus assumptus, tum foris applicatus.
 Reliqua *palmae* portio vehementer astringens est: quamobrem stomachicis & hepaticis in medicinis temperatur: longè magis astringit, quod fructus enascentis veluti in uolucrum est.

πάνκκις
 ἡράκλειον.

PANACEA nonnullis heracleum dicitur, ex quo opopanax colligi solet. plurimè in Boeotia & in Phocide Arcadiae nascitur: ibiq; compendii & questus, qui ex eo liquore facitatur, gratia studiose colitur. foliis est asperis, in terra iacentibus, herbacei coloris, multum ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinquepartito diuisis: caule, ut ferula, altissimo, qui lanugine quadam incanescit, foliis etià minutoribus obsitus, muscaris, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine odorato, feruentèque radices habet multas ab origine vna, candidas, graucolentes, crassae corticis, & subamari gustus. Nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice recenti caulium pullulatu. ea candidum succum emittit, qui siccatus, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, foliis excavato solo statis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule messibus inciso, profluentem succum eximunt.

eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq; , siccæ, quæ caric non sentiant, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maximè in hoc succi genere probatur, quàm amarissimus, internè albus, aut subfulvus, foris ad croci colorem inclinans, lævis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescent, graui odore. niger improbatur, ac mollis. Adulteratur ammoniaco, aut cera. Sed sinceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluitur, & laescat. Aeg. Opopanax cal. 3. sic. 2. emollit, discutitque. Radicis cortex est imbecillior liquore. habet nonnihil & abstergens, & carni inducendæ idoneum. Semen menses quoque citat.

PANACES Asclepii caulem à solo emit tit tenuem, cubitalem, geniculatum, maioribus quàm fœniculi foliis, hirsutioribus, odoratis: aureo flore, acri, odorato, ex muscariis dependente. radix parua est, & tenuis. Auxiliarem vim habent flores & semina, cōtra vlcera, phagedænas, & tubercula, si trita cum melle imponantur, aduersus serpentes ex vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces sylvestre origanum vocant, alii cunilam, de qua in Origani mentione diximus.

PANACES Chironium in Pelio monte

m

ὄππανά-
ναξ.
Succus.

πάνακτις
ἀσκληπιῶν
όγν.

πάνακτις
χαιρώνιον

maximè prouenit. folium eius amaraco simile. flos aureus: radix parua, quæ non altè demittitur, gustu acris. Pota radix, serpentium veneno resilit: illita coma, eadem præstat: Aegineta, Asclepion panaces & chironion priori calidiora sunt (malim cum Galeo dicere, minus calida) hinc floribus ipsorum & semine ad malefica vlcera & phymata vtuntur.

παγκράτιον.
Alii sci-
chorium.

PANCRATIUM, quod aliqui scyllam appellat, radice est magni bulbi, subrufo colore aut sub purpureo, gustu amaro ac feruente: foliis lili, sed longioribus. Aegineta. Specie ac viribus scyllæ simile est, verum imbecillius.

μήλινος.
Painz.

PANICUM frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile: eodemq; modo in panes subigitur. eosdem habet vsus: minus tamen & nutrit, & stringit. Aëtius: Extra illitum refrigerat & exiccat.

μήκων.
Pauot of
sic. papa-
uer cor-
nutum.

E satiuo PAPAVERIS genere, quod hortense est, semen in panem densatur, qui sanis in vsu sit. eo etiã ex melle pro sesama vtuntur. thylacitum vocant. capitulum habet longum, & semine candidum. Sylvestre verò, caput infidens demissumque, & nigrum semen, quod pithitis nominatur: nonnullis tamen & ipsum rhoeas dicitur, quoniam eius scapo lacteos succus emanat. Tertium magis sylvestre, & ad medicinas valētius, multo his lon-

gius productiore capitulo. Aegineta, Hortē-
sis papaueris, thylacitin etiam uocant, semē
esculentum mediocriter somnum conciliat.
Quod veluti decidētī ac depresso calyce est,
nigrum semen habet & medicatum, nimis
quàm frigidum. Quod prolixiore & proce-
riore cōstat calyce, medicatius vniuersis est,
quapropter stuporē inducit quousq; interī-
mat: nā & ipsum & eius lachryma, quam per
excellentiā opium runcupant, frig. 4.

PAPAUER erraticum, quod rhœada vocant, vere quidem in aruis cum hordeo nasci
tur, flore protinus deciduo, vnde & nomen
apud Græcos accepit. folia crucæ, aut origa-
no, aut cichorio, aut thymo similia spectan-
tur, sed longiora, diuisa, scabra. iuncus ei
caulis, rectus, cubitalis, asper: flos sylvestris
anemones, puniceus, interdum albus: ob-
longum caput, sed quàm anemones minus:
semen rufum: radix longa, subalbida, mi-
noris digiti crassitudine, gustu amara. Aegi-
neta: Rhœas appellatur quod flos ipsius cele-
riter defluat (vel semen, vt apud Aeginetam
legitur.) Validius hortensi est. Manducatur
itaque non per se, sed momentum copiosiori
melli mixtum.

PAPAUER ceratites, id est, cornicula-
tum. folia habet candida, hirsuta, verbasco
similia in ambitu sylvestris papaueris more
ferrata: caule non dissimili: flore pallido,

caliculo scœnigræci, in corniculorū modum inflexo, vnde nomē mutuatur. semine papaueris, pusillo, nigróq; radice per summa cespitum nigra, crassa. nascitur in maritimis & asperis. Sunt qui glaucium hoc papaueris genere factitari existimant, falsi quadam foliorum cognatione. Aegineta : Abstergendi vires sortitur, ideóque radices ipsius decoctū potu iocinorosis auxiliatur : folia autem & flores per quā sordida vlcera expurgant, crustasque tollunt. Aliud papaueris genus aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab aliis heracleum, caule dodrantali: foliis admodum paruis, radiculae similibus, fructu inter ea candido. Nam herbula alba est, & spumea tota : radice in summo cespite. Aegineta, Semen habet pituitæ purgandæ accommodatum.

πάπυρος. P A P Y R V S, qua chartæ fiunt, nullis nō cognita. Aegineta : Papyrus ignē non exper ta, materia quædam efficitur: vsta, siccata chartæ crematæ modo, verū papyri cinis viribus inferior est.

**παρωνυ-
χία.** P A R O N Y C H I A exiguus frutex, in pennis nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus foliis. Aegineta: Illita paronychis atque duritiis remedio est. Vis eius extenuare & siccare, idque citra rosionem.

παρθένιον. P A R T H E N I V M, aliqui amaracon vocant, foliis est coriandri, tenuibus: flore per

ambitum albo, intus melino, odore graui, sapore amaro. Aegineta : Amaracus calefacit tertio, siccat secundo.

of. & her.
Matricari.
re.

PASTINACA syluestris folia gingidii habet, latiora, subamara: caulem rectum, scabrum: umbellam similem anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam, ferme croceum. radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Satiua ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo aptior. Aegineta: Vrinæ & menses mouet, præsertim semen ipsius, & radix. folia autem abstergeri viribus prædita, phagedænicis affectibus congruunt, viridia cum melle. Syluestris ad omnia valentior est domesticæ.

Pastinacæ
de ouca-
rottes.

PEPLIS, quam aliqui syluestris portulacæ vocant, Hippocrates peplion, in maritimis maximè nascitur, latè opaco frutice, candidi succi pleno: foliis satiuæ portulacæ, rotundis, infernè rubentibus: semine sub foliis rotundo, vti in peplo, feruente gustu: radice singulari, superuacua, tenui. Colligi, & reponi ac dari, vti peplos, & sale cõdiri solet. Eadem habet vires. Aegineta, Peplion cætera quidem inutile, semen autem ipsius feruidi saporis, peplo consimiliter expurgat.

πῑλῑς.
Non est
sena.

πῑπλος.

PEPLOS frutex est lactei succi plenus, foliis paruis, vt rutæ, paulo latioribus: rotunda coma, ferè dodrantali, humi resperfa: se-

ur. reueil
le matin
de vignes

mine sub foliis rotundo, minore quàm candidi papaueris. pluribus scatet auxilijs. vnicam radicem habet, superuacuâ, ex qua fruticat. nascitur inter vites, & in hortis. colligitur mensesibus, siccatur in vmbra, & continuè versatur. fructus tusus & feruefactus reconditur. Aegineta: Nonnulli papauer spumeum vocant, liquorem habet, & tithymalorum modo purgat.

πέπων.
Pepón.

PEPÓN abstergēdi facultate efficax est, inde veluti caro ipsius ephelidas, & consimilia vitia faciei exterit, semē renes obstructio-
ne liberat. Aegineta.

PERICARPVM bulbi genus est, eius duæ species Plinio, cortice rubro alterum, alterum nigro, papaueri simile, sed vis maior quàm priori: vtrique autem exalfaciendi, ideo contra cicutam dantur.

περικλῦ-
μενον.
Capri-
feuille,
ou vinci.
boscc.

PERICLYMENON simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcādida, hordeacea. inter folia surculi exeunt, in quibus baccae, hederę similes: flos fabæ, candidus, aliquantū rotundus, & quasi in folium procumbens: semen durum, & quod difficilè euellatur: radice rotunda, crassa. nascitur in aruis ac sepibus cōvoluens se adminiculis, propter assidētibus. Aegineta, Eius folia & fructus incidendi simul, & calefaciendi vires obtinent, quapropter vrinam cruentam eliciunt ad sex dies pota.

(Quidam hic numerum dierum perperam quatuor aut quadraginta legunt.) Geniturā viti exiccant quadraginta (aut secundū Dioscoridem triginta septem) diebus in potione assumpta; item lienosos & ægrè spirantes adiuuat.

PERISTEREON, siue verbenaca nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse videtur, quòd columbæ circa hanc per quàm liber versari soleant, dodrātis altitudine, & interdum amplius adolefcit. folia è caule prodeunt incisa & subalbida. ea singulari ramo, radiceque sola, constare sæpius inuenitur. Aegineta, Adeò siccatastringitque vt vulneribus glutinandis, & sanguinis eruptioni sistendæ sit. Eius alterum genus in Sacra herba quære.

PERSEA arbor est, in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho utilem. in quo phalāgia cranocolapta nomine inueniuntur, præsertim in Thebaide. Arida folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in perside exitiosam esse, translatamque in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam. Aegineta, Folia siccant, & astringunt, eoque sanguinis eruptionem compescunt.

MALI Persicæ surculi & folia euidenter amara sunt, eoque concisa tritæque vmbilico

περιστε-
ριών.

Nō ē hęc
oruala ou
toute bō-
ne.

περσία.

μυλία

περσική
Peschier.

imposita lumbricos enecant. fructus autem ipsius, nempe Persicum hoc esculētum, frig. hum.2.

ἄρκουρον.
προσωπίον.
Glete
ron-offi.
bardana
ou lappa
maior.

PERSONATA folia habet cucurbitar, maiora & hirsutiora, nigriora & crassiora: caulem albicantem: quanquam & interdum vidua caule reperiatur, radice intuscandida, foris nigra. Aegine. Discutit, siccatur, & astrin- git, quapropter & folio ipsius vetusta vlcera perfunant.

Videtur
esse cor-
nu cerui.

PES MILVINVS à Columella in v- sum colligi & reponi iubetur, sed qualis sit non explicuit.

πτερί-
της.

Rur.ma-
ior barda
na.

PETASITES pediculus cubito maior, crassitudine pollicis, à quo prægrande foliū, galeri modo amplum, ceu fungus dependet. Contra phagedænas, & vlcera quæ cacoëthe vocant, efficaciter illinitur. Aegineta, Sic.3. vnde ad malefica & phagedænica vlcera eā vsurpant.

Oillet
dinde.

PETILIVS flos est autumnalis, circa vepres nascens, calyculo versicolori, foliis quinq;, paruis. Tantum colore commenda- tur, qui est rosæ sylvestris. Mirumq;, in eo flo- re inflecti cacumen, & non nisi retorto folia nasci. Semē luteum paruo calyci includitur. Vfus in medicina nullus. Huic Plinius Italiā ait nomen dedisse, tanquam nimirum Græ- cis ignoto.

πτερό-
δινον.

PETROSELIVM in Macedonia pro-

uenit, in præruptis locis: semine ammij, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Aegin. Semen cal. sic. 3. Vi incisoria præditum, urinam ciet, mensèsque trahit, flatibus discutiendis accommodatissimum.

PEUCEDANVM, caulē emittit tenuem, gracilentum, fœniculo similem. comam habet statim ab terra foliosam, spissamq; flore luteo, radice nigra, crassa, plena, graui odore succosa. gignitur in mōtibus opacis. Tenera radix cultello conciditur, profluensq; è plaga succus umbræ mandatur. in sole siquidem confestim euanescit. Colligitur, capite prius & naribus rosacco perfusis, ne capitis dolor premat, & vertigo sentiatur. affatione radix inutilis fit. Tam lac quàm succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti è mandragora. verum inefficacior succo lachryma habetur, & velocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lachryma thuris similitudine, caulibus radicibúsq; adhærēs. Præfertur succus è Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore graui, feruens gustu radix eligi debet recēs, quæ cariem nō senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris nucibus, aut ruta aut pane calido, aut anetho resoluitur. Aeg. Peucedani liquore & succo affatim calefacienti, discutiendi, extenuantique vtimur, tum naribus admoto, tum in potione assumpto, ad pulmonum & pectoris vitia ex humorum

Perfil de
Macedoi
ne

πευκεδά
νον.
Peucedana
ne oucue
de porce-
au.

crassitudine contracta, item ad lienē induratum: dentibus autē perforatis impositus, dolorē protinus sopit. neruorum affectibus idoneus est. Radix squamas ossium separat, maleficis vlceribus succurrit. Cal. sic. 3.

φάλαγγιον.

PHALANGIVM à quibusdam phalangites vocatur. ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresve, indiuerſa tendētes: flos candidus, lilio similis, multas incisuras habēs. semine nigro, lato, ad lenticulæ dimidiatæ figuram, multo tenuiore: radice parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur. prouenit in collibus. Aegineta, Nomen hoc inuenit quod phalangiorum morſibus medeatur. Naturæ subtilis est excicantisque, qua torminosis auxiliari putatur.

φάλαρις.

PHALARIS cauliculos emittit & ex culmis similes minutis ac nullius vsus radicibus, multos, duūm palmarum, geniculis cinctos, graciliores tamen ac dulces: semen cādidum, oblongū, milij magnitudine. Succus eius folia & semen pota vesicæ doloribus auxiliatur. Habet eadem herba tenuem quandā vim naturamque calidam.

φάσιολος.
φάσιλοι.

PHASIOLIMENTIO facta est in Isopyro. PHASELI, aut phasioli qui & dolichi appellantur, macerati donec radices succreuerint, ex garo ante cibū sumpti, aluum subducunt, ac plus quàm scœnumgræcum alimenti exhibent. Integri verò cum siliquis virides

comesti, plura pariunt excrementa. (Descriptionem habes in similace hortensi.)

PHELLANDRION in palustribus nascitur folio apij. Bibitur semen eius propter calculos & vesicæ incommoda. φῆλλανδρῖον.
δριον.
potatur

PHYLLITIS, folia promit rumici similia, longiora, & viridiora, sena aut septena, recta, quæ parte anteriore lævia cernuntur, à tergo autem pèsiles quasi vermiculos tenues ostendunt. in vmbrosis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbissimo. neque caulem, neque florem, neque semen profert. Aeg. Cum acerbissima sit, non immeritò alui profluuiis pota auxiliatur. esse officina
filipédu.
la aut
herb. siler
aquaticū
φύλλιτις
Non est
lingua
cerni off.

PHYLLVM, quod elæophyllon vocatur, in saxosis nascitur, duûm generû est, quod autem thelygonû appellât, vias habet floribus oleæ similes, pallidiores tamen. foliis itidem oliuæ est: caule tenui, breui. radice exili. floré album profert: semē papaueris maiusculum, Sed arrhenogonum cætera huic simile, solo fructu distat, habet enim racemosum quiddā deflorentibus oleis non dissimile. Ferunt potum alterius semen maris, alterius verò fœminæ conceptû facere. Tradidit hæc quondam herbarius Crateias, placuîtq; mihi vsque ad historiam, nec vltà de his docere. (Aeg. non meminit.) φύλλον.

PHYTEVMA folia habet radiculæ, minor: copiosum semen, perforatum: radi- φύτιυμα.

cem paruum, tenuem, per summa terræ nitentem: quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt. Aeg. non memorauit.

φλίον.

Dubitat
an sit sca-
bioſa
vulg. &
pſora Aë-
tij.

PHLEBON Theophrasto, nonnulli stœbā appellāt. (sed nos infra stœben longè diuerſam afferemus.) Non solum caulē habet aculeatum, sed & folium quoq; hispidum, iuxta cuius spinas aculeos etiam condit, radice nō in profundum acta. Germinat cum Vergiliis, primòque aratro vna nec folia dimittit, etenim annicula illi vita, sæpèque bimatū excedit.

φλοῦμ.

PHLYM à superiori longè diffidet, cuius lanugine, vt inquit Theophrastus, ad lixiuū mulieres vtantur, molle & placētaceum est, colore subrubido. Fœmina sterilis est, ad nexu idonea. Mas prorsus habetur inutilis. in insulis fluitantibus prouenit. Pars ab radice pueris cibo grata est. Radix ipsa pecudū pabulo vellitur. (Phlum Iulius pollux nominauit, vade Phloinas vestes in Herodoto quis legat, & Pausania.)

φοῖνιξ.

Aucine
serule
multis

PHOENIX folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, spicam lolio similem: calamos digitorum senūm, radici aduolutos: septenas octonāsve spicas. In aruis teētisq; recenter illitis nascitur. Aegin. Aliter thu vocatur: astringēdo, in vino austera pota, omnes fluidos affectus sistit.

φόρμιον.

PHORMION tenuis, abstersoria, & at-

trastricis est facultatis: semen igitur cū melle albugines extenuat, & spicula ē corporibus extrahit. Galen. & Aeg. (Hoc ab hormino, cui eadem ascribuntur, non dissidere iudico: nam Galenus phormij tantum meminit, nō etiam hormini.)

φού.

PH V, quod & aliqui sylvestre nardū ap- pellant, nascitur in ponto, folio olusatri, aut claphobosci, caule cubitali, aut altiore, læui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto: floribus narcissi proximis, maioribus, teneris, & exalbicante purpureis: radice superius ad digiti minoris crassitudinē, ex obliquo villosa in nigri veratri aut iunci odorati modum: capillamentis inuicem contextis, flauescens, odoratis, cum quadam odoris grauitate nardum emulantibus. Adulteratur radice rusci admista: sed maleficium deprehenditur: quoniam hæc dura est, & frāgenti contumax, sine vlla odoris gratia. Aeg. Radicem habet nardi persimilem, quæ tamē ad pleraque infirmior sit: sed vrinas magis quā ea elicit, nardi Gallicæ modo.

Valeria-
na maior
ou vertē-
trecum

PINVS Picea generi eidem ascribuntur, sed quandam flagitant specierum distinctionem. arbores vulgò cognitæ. Piceæ cortex astringendi vim eximiam possidet, qua intertrigenes & ambusta illitum persanat, vëtrempotus reprimat: folia etiam vulnera conglutinant. (Eadem ferè de pinu tedāq; scribuntur.)

πίτυς
πίυκη
Pin

uius, acrius, & ori gratius, nec non ad condimenta vtilius. Sed candidum, & adhuc in acerbum vergens, antè dictis infirmius est. Eligio oportet grauissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis recens minimè furfurosum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimèto defecta, cassa, inania, minimèque ponderis, quod vocant brasma. Non est huius arboris radix ginger, vt aliqui existimauere, sicut paulò post ostendemus. Namque piperis radix cocto similis est. ora gustatium accendit, saliuam ciet. hæc lienem reprimat, cum aceto illita, aut pota. caput etiā purgat, manducata cum semine pedicularis herbaræ, quam staphidem agriam vocant. Aegin. Piperis radix, costi vires refert. fructus nuper quidem germinantis arboris, oblongum est piper, humidum natura, & calidum. fructus veluti acerbus immaturusque album est piper, nigro acrius, vt quod multo magis asatum sit: vtrūque verò & calefacit & desiccet.

PYRETHRVM saliuarem vocant, folia caulēque emittit vt daucum syluestre & fœniculum: umbellamque aetæi, circinata rotunditatis. radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Aeg. Radix eius vtentē obtinuit facultatem. dentium ex frigiditytate dolores mitigat. ad febrium rigores ante accessionem infricatur cū oleo, Corporibus

πύρετρον
Piretre
ou pie
d'alexan
dre

à perfrictione stupentibus resolutisq; efficacissimè adhibetur.

ὄνη, ἄπος P Y R V M terrestre aliud sortitū est, aliud
Poiré aquosum, ob quod stomachum iuuat, sitim-
 que arcet: illitum verò sic. frig. mediocriter.

ἀγκία. Aegineta.

off. fisti. P I S T A C I A, quæ cōstat in Syria gigni, pi-
 ca & fisti neis nucib⁹ similia sunt. Aeg. Stomacho me-
 corū gra- diocriter conducunt, iecur obstructum rese-
 rant, præcipuè summi & odorati eorum ope-
 rimenti ex vino decoctum. Prosunt etiā con-
 tra serpentium morsus.

ἀριστολόχια P I S T O L O C H I A Plinio aristolochiæ
 genus est quartum, tenuior quàm clematidis,
 densis radicis capillamentis (vnde & poly-
 rhizos nominatur) iunci plenioris crassitudi-
 ne. Odor vt reliquis medicatus. Illita serpen-
 tiū moribus medetur. Quin & omnino sus-
 pensa supra focū fugat domibus serpentes.

πίσος P I S V M pariter Græci & Latini vocant le-
 gumen, caulibus fistulosis in terram sparsis,
 ramosisq;que, prætenui surculo, folio frequētī,
 præter cæterorū morem longiusculo, siliqua
 cylindracea, granis rotundis, candidis, flore
 papilionis forma, circa vmbilicū purpureo,
 radice imbecilla. Grana in valvulis se inuicē
 quasi tangunt, vt in eruo. Galenus, Pisa fabis
 non dissimilem retulere naturā, nec diuerso
 ab illis modo manduntur. sed nō ad eò vti fa-
 bæ inflāt, nec abstergūt: ideoq; segnius alio
 quàm

quàm ille excernuntur. Decoctorum cremor aluum ciet. Recentia, quæ cum suis valvulis manduntur, ructus mouent.

P. I T Y V S A M specie à cyparissia differre πινύου
constat, & si tithymallorū generi assignetur. σα.
caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geni off. herb.
culatus: foliis piceæ, acutis, exilibus: flore par & med.
uo, velut purpureo: semine instar lenticulæ, esula. græ
lato: radice crassa, candida, succo resecta, qui ci turbet
busdam in locis frutex hic prægrandis inue- & turbe-
nitur. Aeg. Liquorem vt tithymallus habet, ton.
eique similiter purgat.

Duo P L A N T A G I N I S genera. minor ἀγρόγλωσσ.
folia habet angustiora, minora, molliora, læ σεν.
uiora, & tenuiora: caule anguloso, in terra off. lance-
sessili: floribus pallidis: semine summis cauli, lotte
bus emicante. Altera maior, latior, viren plantain
tiorque, latis constans foliis, oleracei generis.
cuius caulis cubiti altitudinem petit, angu-
losus, subruber, à medio ad verticem tenui se-
mine circumdatus. radicibus nititur teneris,
hirsutis, candidis, digitum crassitudine æ-
quantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus, &
locis humidis. multo vtilior magna est. Aegi-
neta, Plantago frigefacit, siccatur. Tempera-
ta est ex aquea & terrestri substantia, cui et-
iam distractionis nonnihil adest: quo nomi-
ne ad maligna vlcera, fluxiones, putredines-
que accommodata est, temperamenti mode-
ratione sanguinis quoque profluua cohibet.

& plurimum congruit. compos enim est siccitatis minimè rodentis, & frigiditatis quæ nondum stuporem inducit.

πλατάν-
ος.

P L A T A N V S vi humidiorē & frigidiorē pollet, eaq; de causa folia viridia ad inflāmationes nascentes proficiunt. Cortex & pilulæ quoniam maiorem siccandi potentiā habent in aceto decoctæ dentium dolores sopiunt, ambusta cum adipe persanāt. Cortex autem crematus siccatur vehemētius, & abstergit, cōque lepras pellit, & humidis vlceribus medetur. Aeg.

πολύμυ-
τος.
βόσκι φα-
λσά.
αμβροσία
offic. &
herb. cre-
ditur

P O L E M O N I A M alij philetæriam. Capadoces chiliodynamin appellāt, ramis exilibus, vtrinq; pinnatis: foliis paulo quàm rutæ maioribus ac longioribus calaminthæ aut sanguinaræ proximis, quibus summis velut corymbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicante, radicula simili. nascitur in montosis & asperis. Aeg. Polemonij vis subtilis & exiccans: inde nonnulli contra coxendicis dolores, intestinorū tormina lienē induratum, radicem eius cum vino propinant.

πολύκνυ-
μος.

P O L Y C N E M O N, frutex est furculosus, foliis origani: caule, vt pulegii, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris & acris. Aeg. Cal. sic. 2. eoq; vulnera glutinat.

πολύγα-
λός.

P O L Y G A L A palmi altitudinem petit: foliis lenticulæ, gustu adstricto. Aegine. Poly-

galon calidi humidique temperamenti com-
pos est, foliis mediocriter acerbis. potū lactis
abundantiam facit.

POLYGONATUM nascitur in monti- πολυγό-
bus, frutice cubito altiore: foliis lauri. latiori ρατον.
bus, & leuiorib⁹, sapore mali cotonei, aut pu Signet de
nici, cū quadā adstrictione. flores per singu- salamon
los foliorū exortus promit cādidos, foliis nu-
merosiores, incepta à radice supputatione, ra-
dicem habet albā, mollem, longā crebro ge-
niculatā, densam, graucolentē, digitum crassi-
tudine equantē, quę vulneribus efficaciter il-
linitur. quinetiā maculas in facie delet. Aeg.
Varię particeps est facultatis, astrictorię, a-
cris, amarę, & cuiusdam gustu ingrati: quę
verbis nequeat exprimi, quapropter in mul-
tiplices vsus haud est accommodatū. Radicē
ipsius nonnulli ad faciei labes, ptilos Græci
dicunt, abstergendas illinunt.

POLYGONUM sylvestre Plin. describit πολύγον-
pene arboris frutice, radice lignosa, stirpe ce ρον.
dri rubicundo, ramis sparti binum palmorū, ἡγρίαι
nigris, geniculorū, ternis quaternisq; articu Geniste
lis, sapor mali cotonei (Diuersum hoc genus la
est à duobus reliquis polygonis sanguinarię,
sub voce numerandis.

POLYTRICHON, adiantum est.

Duo genera **POLII**. montanum, cui teu- πόλιον
thrio nomē est, & cuius est vsus. tenuis frutex
est, cādidos, dodrāralis, semine refertus: capi-

tutibus præditum.

POTERIVM, lones neurada vocant, πότης 109
largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus tragacanthæ proximis: foliis parvis, rotundis: flore exiguo candidi coloris: semine nullius usus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in aquosis, & collibus. radices demittit binū ternūve cubitorum, nervosas, & firmas. quæ proximè terram recisæ, dant succum gummi similem. tusæ, præcisus nervis & vulneribus glutinandis illinuntur. decoctum quoque eius nervorum affectibus prodest. Aegineta, Vocant alij phrynion. Radices concisæ, nervos præfectos & vulnera glutinant. Decoctum ipsius epotum, nervorum affectionibus auxiliatur.

POTHOS Theophrasto duorum est generum: alterum hyacinthi flore, alterum sine colore, candidum, quo sepulchra coronabant, à quo & nomen, quasi desideratis esset dicatum. floret æstate, sed diuturnius est candidum. πόθος

PRUNI fructus ventrem subducit, recēs magis, aridus minus. Decocto ipsius faucium & gutturis inflammationes utiliter colluuntur. Gummi quod ex arbore destillat, incidit, extenuat: vesicæ calculos cū vino potum nonnulli frangere affirmāt, ex aceto puerorū κοκκύνυ
λον

rum impetigines sanare. Sylvestrium prunorum bacce euidenter astringunt, ventremque reprimunt. Nominatur hæc planta in Asia prunum. Domestica sunt quæ Damascena appellantur.

ψόρα.

PSORA Aëtio herba nuncupatur (forſan ab habitu ſcabo, aut quod ſcabiei medeatur) eius uſta fumo arborum erucas mori ſcriptum reliquit.

ψύλλιον.
Herbe a
pulis

PSYLLION foliis coronopo nõ diſſimilibus hirsutis, longioribus: ſarmentosa fœni modo in totũ herbula, ramis dodrantalibus. coma à medio caule exoriẽ, duobus tribusve conuolutis in cacumine capitulis: in his ſemine duro, nigro, pulicum ſimili, vnde & nomẽ in arnis & incultis naſcitur. Aeg. Herbe pulicaris ſemen, frig. 2. ſiccãdo humectandoquẽ medium eſt.

πταρμικὴ.
offic. &
herb. py
rethrum
ſylveſtre

PTARMICA frutex eſt, furculos habens paruos, multos, & rotũdos, abrotano nõ diſſimiles. & circa eos folia oleæ, longa, multa, & in cacumine capitulũ, vti anthemidis, paruum, rotundum, quod ſuo acri odore ſternutamentum excitat: vnde nomẽ accepit. flores ſternutamenta efficaciffimẽ mouẽt. Naſcitur in montibus & petroſis. Aeg. Folia ſternutamenta proritant. Totus autem frutex viridis ſugillata, liuorẽſq; alios diſcicit. Eſt enim herba cal. ſic. viridis quidem 2. arida 3.

βλαχον.

TVLGIVM herba vulgaris notitiæ.

Vocant aliqui blechona, quoniā dum floret poulieul
gustatum à pecoribus, balatum concitat. Ac ou pou-
gineta, Calefacit & extenuat vehemēter, vn- liot
de si illinatur ruborem excitat, & crassos vi-
scososque humores è thorace & pulmone e-
molitur.

πίνυρις

PULMONARIA, quam aliqui pepanū
vocant, buglossi folio cōspicitur, sed promif-
fo magis, atq; læuiori, colore insuper dilutio-
re, albicātibus maculis notato, instar pulmo-
nis, inde nomen nascitur in humidis. Volunt
aduersus morbos visceris sui nominis pecu-
liari esse remedio, in cibo sumptā, vel potā.
(Aliam eodem nomine, cum de consilagine
mentio fieret, docuimus.)

MALVM punicum omne astringendi vi-
res eximias habet, quibus refrigerat siccātq;
verum dulce aliis minus: austerum magis re-
frigerat, siccīusque est, & stomacho amicum.
Acidum refrigerat quoque, & maiore quan-
dam incidendi virtutem representat. Verum
acini succo magis adstringunt siccātque: ef-
ficacius his adhuc malicorium, quod sidion
Græci vocant. Huic virtute respondet mali-
flos, qui cytinus appellatur. Aeg.

ῥοιὰς μῆ-
λον.

Granade

Q

πιντά:

Q

VINOVB folium ramulos fert
furculaceos, tenues, dodrātales, in quinq;
quibus semen: folia mēthæ, quina seuille

n iiii

13
singulis pediculis, raro plura, in ambitu serrata: florem ex luteo pallescentem, auri æmulum. nascitur in riguis, & aquariis ductibus. subrubram habet radicem, oblongam, veratro nigro crassiorē. Aeg. Sic. 3. minimè acre, eoq; in multos vsus accommodatur.

δρῦς
Chesne

Q V E R C V S & folia & fructus siccante & tepida vi pollent: quamobrem vulnera recentia glutinant, inflammationibus incipientibus medentur. at quod sub glandis corio & circa fructus carnem membranę simile includitur, valentius astringit: eoq; ad fluxum muliebrem, aliósque fluidos morbos exhibetur. Aeg.

R

ρῥύθιον
Herbeau
foullon
off. faponaia.

R

A D I C V L A seu struthiũ herbã vulgò nota, quã purgandis lanis vtuntur, qui eas eluunt. Gale. Radicis vsus est præcipuus. Acris est, cal. sic. 4. Abstergit, irritat: hinc est quod sternutationes cit similiter aliis, quorumcunq; cum acrimonia calidum temperamentum est.

ῥάφανος.
Raue fre
forũ, raphan.

R A D I X, quæ græcis raphanus dicitur:

syluestris raphani, quam Romani armoraciam vocant, folia satiuo similia, sed magis lapsanam imitantur. radix gracilis, tenera, subacris. Tam foliũ quàm radix in olera recipitur. sed hæc excalfacit, vrinam concitat, æstiuosa est. Aegineta. Radicula cal. 3. sic. 2. Syluestris efficacior est in ambobus. Semen

utriusque planta ipsa vehementius, itaq; sugillata aliósq; liuores difficiliter.

RADIX Hippocrati nominatur quoddam genus sati, sine flore, sine semine, tribus duntaxat foliis, sed proceris, & in terra stratis, duorum digitorum magnitudine, similibus anchusæ, radice purgadi viribus, sed exiliter. (Eadem mihi Dioscoridis Onosma videtur.

RANUNCULI complura sunt genera, vis tamen omnibus vna, acris, & vehementer exulcerans. Nam vnum coriandri foliis constat, latioribus, subalbidis, pinguibus: flore luteo, interdum purpureo: caule gracili, cubitū alto: radice alba, exigua, amarāq; multis capillamentis, hellebori modo fibrata, nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorū incisuris, plerunque in Sardinia proueniens, quā acerrimum, quod syluestre apium appellāt. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. Aeginēta; Omnia ranunculi genera excellenter sunt calida, sicca, acria, vrentia, adeò vt vlcus cū dolore excitent: quibus si modicè utaris, cutis vitia tantum exterūt. Radix autem arida sternutamentis ciendis est medicamentum. (De altero ranūculi genere multa leges in Sardonix mentione.)

RAPÍ radix & semen flatulenta, & semi-

βίση

βατράχου.

Apiū rusticū, & Apiū risus herb.

ραγγυλίσ Rabe.

ρογγυλῆς
ἀγρία.
reponce
of. rapha
nus sylue
stris.

ni creando sunt, veneremq; excitant. Aeg.

Sylvestre R A P V M in aruis nascitur, fruticosum, in cubiti altitudinem assurgens, ramosum, læue, in cacumine folia fert læuia, digitali latitudine, aut maiora: & fructū in siliquis calyculatis. cūmq; eorum inuolucra aperiantur, alia intus siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem præbet, in qua semina paruula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur in medicamenta, quibus ad detergendam cutem in facie, totq; corpore vitimur, præsertim quæ ex lupini, aut crui tritici, aut lolii farina fieri solent.

ῥητίνη.

Liquida R E S I N A è pinu & picea, à Gallia & Hetruria conuechi solet. atq; olim à Colophone petebatur: hinc Colophoniz sibi cognomētum vendicauit. A Gallia quoq; subalpina quam vernaculo nomine laricem appellant incolæ, ea in linctu, & per se magnopere prodest tusci veteri. Colore inter se distant. siquidem alia cādida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, vt larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinā, quæ ad eadem pollet. Quæ verò aridarum generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissima, trās-lucens, non retorrída, neque diluta, quandam ceræ faciem præbens, & friabilis. E picea & abiete resinæ cōteras antecedunt; odo-

ratę enim sunt, atq; thus odore imitatur. Prostantiores à Pityusa insula deferuntur, quę scđum Hispaniam sita est. Sed quę è picea, nucibus pincis & cupresso manarūt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur. Veruntamen eorundem gratia quorū & illę sumi solent. Lentiscina terebinthinę respondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadruplę capacitatis ad humorem qui infunditur. Itaque resinę congius in duobus aquę pluuię coquitur, subiectis leuibus prunis, resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrída reddatur, ac digitis cedat. ceterum vbi refrixit, in fictile non picatū, quod aconitū vocant, id est, nō illitū, recōditur. Fiet etiā eximii cādoris, si resina omnis eliquata præcoletur, quò fæculēta sordes excernatur. Vritur quoq; sine aqua, primū lento igne: & vbi coire cęperunt, maior carbonū strues supponitur, & triduo citra intermissione discoquantur, vsq; dum antedictas naturę suę notas exuerint, mox, vt dictū est, reponuntur. Aridas vnus diei spatio decoxisse satis est. Aeg. Resinę omnes calefaciūt & desiccant, verū terebinthina principatum obtinet, discutientis naturę, emolliētis, tenuis, & absterforię, eaque scabiem corrigit. & latex huiusmodi est. Quę verò è teda destillauerit, atque hac magis adhuc pinea, acrior est, non tamen aut discutit magis, aut attrahit.

medium inter ipsas locum tenet, & quæ de piicea & quæ de abiete raditur.

ῥάμνος.

Burgaspi
na ou ne
prum.

RHAMNVS fruticat in sepibus, ramos ferens rectos, & aculeos in acutæ spinæ modum, foliis paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. tertium nigrioribus latioribusque foliis constat, & quadâtenus rubentibus. cuius ramî quinûm cubitorum longitudinem implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus minúsque rigentibus aculeis. Fructum edit latum, cãdîdum, tennem, follicularii specie, verticillo similem. Aegineta, Siccatur 2. frig. primo, Quare herpetibus & erysipelatis non admodum calidis medetur. sed teneris eius foliis vtendum est.

RHAPHANVM in Radice habes.

ῥάπον/ι-
κόν.

Reubar-
be. offic.
rhaponti-
cum.

RHA, aliqui rhœum, Latini rhapsanticū vocant, prouenit in iis quæ supra Bosporū suut regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, centaurio magno similis, sed minor & ruffior, fungosa, aliquantum læuis, sine odore. Optimum habetur quod teredines non sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lentescat, manducatūque colorem reddat pallidum, aut ad crocum inclinantem. Aegin. Compositum est ex terrestri frigida & tenui substantia, aërâque calida & leniter acri: eamque ob causam conuulsis, ruptis, recta ceruice spirantibus opitulatur. Quod

discutiendi vim habet, liuores emēdat: quod
 astrictoriam, cruētas excreationes, coeliacos,
 & intestinorum tormina sanat: vtraque verò
 facultate iocinorosos iuuat.

Gignitur RHODIA radix in Macedo-
 nia, costo similis, leuior, inæquabilis, quæ cō-
 trita rosas redolet. Vtilissima capitis dolori-
 bus, si madefacta fronti & temporibus cum
 rosacei momento imponatur. Aegineta. Ca-
 lesfacit secundo, tenui & discutiente vi præ-
 dita.

RHVS, quæ obsoniis aspergitur, ab ali-
 quibus erythros appellata, semen est coria-
 ri fruticis: sic vocati, quoniam coriorum in-
 fectores eo vtantur ad inspissandas pelles. ar-
 buscula in petris nascens, binū cubitorum
 altitudine, foliis oblongis, subrubentibus, in
 ambitu serratis, acino vuarum gracilium dē-
 so, magnitudine terebinthi, quadam tenuis
 lato. Cuius corticosa tunica perquam utilis
 est, Aegineta, Rhu coriariæ à medicis dictæ
 fructus præcipuè, & succus, magno in vsu
 sunt: astringit enim, & sic. 3. frig. 2. (Emen-
 dauimus *ῥυπτικόν*, vt iuxta Galenum *ῥυκ-
 τικόν* legatur.

RHV herbæ syluestris Plinio, colico-
 lis breuibus, foliis myrti, tineas & venena
 pellit.

CICR, aut croton, nomen accepit à ricini
 animalis similitudine. arbor prouenit parua

*ῥοδία ρι-
 ζα.*
 Rosaceū
 lignum.

ῥυς.
 rur. viur-
 ne.

κρότων

Herb. ca- ficus altitudine : folio, platani, sed maiorē,
 taputia læuiore, & nigriore : ramis, caudicibūf-
 maior. of que cauis, in arundinis morem : semine in
 fi. et vulg. uis asperis, quod corticibus exutum, ricinū
 palma animal repræsentat: ex quo oleum, nomine
 Christi. cicinum, exprimitur, cibus fœdum, lucernis
 emplastrisque vtile. Aegineta. Ricini fructus
 quæadmodum purgat, abstergit, digerit: sic
 etiam folium, sed imbecillius.

RODORA Gallis appellata herba, vt in-
 quit Plinius, iuxta viduas populos prouenit,
 caule instar ficulneæ virgæ articulato, foliis
 vrticæ in medio exalbidis, quæ processu tem-
 poris tota rubent, flore argenteo. Præcipua
 contra tumores feruorēque & collectiones
 per se, vel cum axungia veteri tusa.

ῥόδον.
 Rose.

ROSA refrigerat & astringit, sed sicca
 multò magis. Succus recentibus foliis expri-
 mitur, defectis forfice vnguibus (sic appellan-
 tur candidæ foliorum partes) reliquum in pi-
 la premi & teri debet in vmbra donec coga-
 tur: & ita ad oculorum circumlitiones recon-
 di. Siccantur etiamnum folia rosarum, conti-
 nuò versata ne muceant, néve situs in iis insi-
 deat. Aegineta, Rosq; mixta constant substan-
 tia, aquosa scilicet, calida, astringenti & ama-
 ra: flos autem ipsarum magis adhuc astringi-
 git, eoque desiccatur.

ῥοσµαρί-
 νις.

Duo ROSMARINI genera, vnum fœ-
 cundum frugiferūque, cuius semē cachrys

vocatur. folia fœniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, iucundè olentia. caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis concavum alis. in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylo simile, rotundum, angulosum, resinaceum, quod in mādendo linguam exurit. radix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum vti sphondylion, odoratum, minimè exurens, radice foris nigra, intus si frangatur alba. Verū id quod sterile dicitur, illorum planè similitudinem refert: sed neq; caulem, neq; florem, neq; semen promit. nascitur in saxosis & asperis. Rosmarinum cū erica nasci, foliis lactucæ sylvestris amaræ asperioribus, candidioribúsq; radice breui. Theophrastus author est. potúque id ipsum alterutra parte purgare.

ROSMARINVM, quo coronarii vtuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, dēsa, longa, exilia, subter incana, superne virentia, graui odore. Aegineta, Libanotis vna sterilis est, duæ fructum ferentes. Vires illis extergendi, incidendi, discutienti, & emolliendi. Succus earum oculis ex humorum crassitie hebetibus salutariter ex melle imponitur. Coronariæ verò libanotidis decoctum, regio morbo laborantibus rectè bibitur.

Incēsariā
ou Ros-
marin.

λιβανω-
τίς σιφα
νωματι-
κή

ῥυθροδανῶν
ῥοῦ.
 off. rubia
 tinctorū.
 vulg. ga.
 ranse.

ERYTHRODANVM radix rubra est, qua tinguntur lanæ. vna sponte prouenit, altera feritur, vt in Thebana Galliæ, & Rauenna Italiæ, in Caria inter oleas, vt in aruis, solo creditur. hanc non sine quæstu ferunt. nanque maximū ex ea sentiunt prouentum. asperi caules & quadranguli, longi, asparinæ non dissimiles, robustiores, & multo prorsus maiores: foliis per intervalla certa circum articulos stellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia viride, mox rubrum, postea cum ematurit nigrū: radix tenuis, longa, rubra. Aeg. Radix acerba amarâque est. Lienem iecur, & renes ita purgat, vt cruenta quoq; per vrinam & menses euocet. Cutis vitia rancida abstergit.

ῥατος

RVBVS, notitiæ vulgaris. Aegi. Rubi runce, ca fruticosum abundè astringit & siccatur, qua de therine, causa & vulnera cōmittit, & defluxiones sistit. Radix autem præter astrictiōē, non parū etiam subtilis est, vnde renum calculos cōfringere est idonea. Fructus si maturus est, magis calefacit, simulque mediocriter astringit, ac ideo cibo idoneus est: immaturus aut, & acerbus est, & validè siccatur, præsertim aridus. Eadem etiam flos efficit. (Chamæbatū rubi genus humile suprâ diximus.)

ῥατος
ἰδατος

Idæus **RVBVS** appellatus est, quoniā passim in Ida proueniat. Est autē longè tenerior priore, ac minoribus spinis hōrēs: quanquā & sine

& sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat quæ supradictus. Aeg. non recensuit.

R V B V S canis frutex est arboris instar, rubo longè maior. folia fert multò latiora myrto, firmis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Aegineta, Rubi canini fructus non instrenuè astringit: folia id præstant mediocriter. At quod in fructu lanæ speciem præ se fert, ceu arteriæ inimicum cauere debet.

R V M E X, vide Lapathum.

Syluestris MYRTVS, aliquibus oxy-myrsine, aut myrtacantha, Latinis ruscum appellatur. folium fert myrti, latius, in formam lanceæ mucronatum. baccae per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio dependentes, osseo intus nucleo. cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modò lentî, fractu contumaces, foliosi: radice graminis simili, acerba, & subamara. Folia & baccae in vino potæ urinam cient, menses pellunt, vesicæ calculos frangunt, stillicidio urinæ medentur, dolores capitis sanant, & regiâ morbum. In asperis & præcipitibus locis enascitur. Decoctum radice in vino potum, eodem præbet effectus. Cauliculi recentes, asparagorum vice, in cibo sumuntur. Amari autem sunt, sed urinâ mouent. (Galenus & Aegineta nullam fecere mentionem.

κυνόσβα
τος.
engletica

ὄξυμυρσι
ν.
Hou ou
housee.

πύκνον
Rue.

RUTA mōtana syluestrisq; satiuā & hor-
tensi acior est, & in cibis dāmnata. satiuā ve-
rò quæ sub ficu arbore enascitur, magis in ci-
bos admittitur.

πύκνον
ἄγριον.
offi. har-
mela &
syluestris
ruta.

vocāt etiamnum syluestrē rutā, quod
in Cappadocia & Galatia Asiæ finitima mo-
ly dicitur. Frutex est qui ab vna radice mul-
tos emittit cauliculos: foliis multò quàm al-
terius rutæ longioribus, tenerioribúsq; odo-
re graui: flore candido: capitulis in cacumi-
ne paulo maioribus quàm satiuæ rutæ, quæ
tribus maximè partibus constat: in quibus
triangulum semen, subrufum, gustu amarū
recluditur, cuius est vsus. semen autumnō ma-
turefcit, quod cum melle, vino, croco & fœ-
niculi succo, ac gallinaceo felle teritur cōtra
retusam oculorum aciem. Sunt qui eam har-
malam vocent, Syri besafan, qui Cāppado-
ciam incolunt moly, quoniā quandam cum
moly seruet similitudinem: radice nigra, flo-
re cādido. In collibus & læto solo prouenit.
Aeg. Ruta syluestris calefacit, siccāt quarto.
Satiua vsq; ad tertium. Vis eius est crassos len-
tósque humores incidere, & dissipare, vrinā
mouere, attenuare, & flatus discutere, vnde &
venerem coërcet. Alio loco in moly, quæ
etiam ruta syluestris est, substantia tenuem
esse prodit, calefacit 3, & reliqua cum supe-
rioribus eadem.

S

SABINA duorum generum est. *βεάβη.*
S Vna foliis cupresso similis, spinis *fauiniere*
 horridior, grauiters olens, acris &
 ferues. arbor est coactæ breuitatis, quæ se
 magis in latitudinem fundit. huius foliis nõ
 nulli pro suffitu vtuntur. Altera tamarici fo-
 lio similis est. Aeg. Cal. sic. 3. tenuissimæque
 est, extenuat, & digerit pota, tum in putredi-
 nes cupresso similiter efficax est.

SACRA herba, quæ & peristereon nomi *ισοβότα*
 natur, ramulos emittit cubitales, aut maius- *vn.*
 culos, angulosos, in quibus ex interuallis fo-
 lia quercus, sed minora angustioræque, eisdẽ
 diuisuris in ambitu, colore aliquatenus cæ-
 sio. radix longa, tenuis. flores purpurei, gra-
 ciles. Galen. & Aeg. tacitæ præterierunt. Dio-
 scorides serpentibus aduersari scribit: mor-
 bo regio cum aliis quibusdã succurrere. Vete-
 res tumores & inflammationes illitam leni-
 re, sordida purgare vlcera, tonsillarum cru-
 stas cum vino erumpere: oris depascencia vl-
 cera compescere.

SAGAPENIVM ferulaceæ herbæ succus *σαγαπην*
 est, quæ in Media nascitur. Optimũ est trãs- *vor.*
 cès, fuluo forinsecus colore, & intus albo, ne-
 scio quid inter laser & galbanũ redolēs, gustu
 acri. Aeg. Liquor est calidus & tenuis, cui etiã
 absterforia quẽdã vis inest, qua & oculorum
 cicatricibus & suffusionibus prodest.

ἰτιά.
Saulx.

SALIX vulgò nota est. Aegineta. Salicis & folia & flos facultate cōstant quæ citra ro-
sionem siccet, tum quæ nonnihil etiam astrin-
gat. Cortex autē paulo siccior est, cuius peru-
lūcinis ex iis habetur quæ vehementer exic-
cent, quippe clauos & myrmecias cum ace-
to extemit.

ἰαλίσφα
κος.
Saulge.

SALVIA siue elelīspacon, frutex est ra-
mosus, longus, virgas, habens quadrāgulas,
& canas: folia mali cotonei effigie, sed lon-
giora, asperiora, crassiora, & quæ sensim at-
tritarū quasi vestium scabritiem referant, hir-
suta, subalbida, perquā iucundo odore, sed
gravi. semen summis in caulibus sylvestri or-
mino simile gerit. In asperis nascitur. Aegin.
Euidenter calfacit, & leuiter astringit.

ἄκτιν.
Sus, ou
suin.

SAMBUCI duo genera. Vnum in arbo-
rem assurgit, surculos spargēs arundinaceos,
teretes, cauos, candicantes, proceros. folia iu-
glandis, terna quaternave, ex interuallis cir-
ca ramos exeunt, graui odore, minutim in
ambitu secta: & in ramulorum cacuminibus
cauliculisque circinnatæ umbellæ, quæ flo-
rem candidum pariūt, mox acinū terebin-
tho similem, in nigredine suppurpureū, ra-
cemosum, succo madentem, vinosūque.

Hycle

Alterū genus chamææde vocatur, Roma-
nis ebulum, longē humilior est, magisq; her-
baceo generi assignandum, caule quadran-
gulo, geniculato: foliis amygdalæ, ex inter-

uallo longioribus, geniculatim expāsis, pin-
natísq; graueolētibus, in ambitu ferratis, mu-
scario sambuci: flore & acino eiusdem. radi-
ce nititur longa, crassitudine digitali. Aegi-
neta: Sambucus pariter & ebulus deficcant,
modicè digerunt & conglutinant. Potu autè
esive per aluum aquam educunt.

SAMPSECVVM in Cypro & Cyziceno σάμψυ-
χος.
laudatissimū, secundum sibi locum vendica Mario-
laine.
uit Aegyptum. Amaracū gens Sicula & Cy-
zicena appellat. Herba est ramosa, per terrā
repens, foliis eius calaminthæ quæ tenui fo-
lio constat, leptophyllos appellatur, hirsutis
& rotūdis. suauissimum odorem spirat: ideo
coronis inseritur. Aeg. Cal. sic. 3. Est etiam te-
nuis naturæ & discutioria.

SANGVINARIA, vel polygonū mas πολύγ-
νος.
ramos habet teneros & molles, frequentibus
geniculis cinctos, qui per terram, vt gramē,
repunt: folia rutæ, sed molliora longioraque:
semine sub omnibus foliis turgescente: vnde
marem appellari volunt. flos ei cādidus, aut
punicus. Sanguinaria fœmina fruticat vno
caule arundini teneræ simili, dēsis geniculis,
& in se tubarū modo factis. articulos in or-
bē cingunt. apices foliolis piceæ similes. radi-
cis nullus vsus. nascitur in riguis. Aeg. Habet
sanè vim quandā astringendi, sed humiditas
in secūdo ordine frigida in ea præpollet. Sto-
machi, feruori frigida inspergitur vtiliter, fa-

cris ignibus inflamationibúsq; calidis illinitur, ac talis quū sit, fluxiones repellit, atq; hac ratione siccatoria esse putatur. Fœmina autē mas vehemētior est. (De tertio quodam eius genere in polygono syluestri iam diximus)

σάντα-
λον.

SANTALVM Græcis recentioribus lignum est, quod India mittit. Luteum præferatur, si pingui quodam scatet. Secundas partes obtinet rubrum, & frigidius aliquanto cæteris existimatur. Tertio loco reponitur albū. Cal. 3. sic. 2. Excalfactis auxilio sunt, imbecillitatē stomachi leuant, itémq; cardiacos effectus, quos irrepens bilis excitauerit. Ex albo oui liquore fronti imposita defluxionum impetus quæ ad oculos decumbunt, cohibent. Trita ex stillatitio rosarum liquore, & illita temporibus adiecto caphuræ momento, ardētes capitis cruciatus mitigāt. In candescētib; articulorū inflamationibus, podagrísq; ex succo solani, aut sedi, vel portulacæ, lenticulæve palustris illinūtur, repelluntq; humores, qui eò loci se conferunt, præcipuē rubrū. (Nunc nullæ non ferè medicorū potiones vt gratiam odore suo à sumentibus ineanant, iis imbuuntur santalis)

σαρκο-
κόλλα.

SARCOCOLLA lachryma est arboris in Perside nascentis, pollini i huius similis, rufa, gustu amara. Vulnere glutinat, oculorum fluxiones inhibet. emplastris inferitur. Adulteratur admisto gummi. Aegineta, Op-

plet, citra rosionem siccatur, ideoque vulnera glutinat.

SARDONIA vel sardoa herba pro alto ranūculi genere intelligitur, copiosissimū in Sardinia, gustus acerrimi, priuatim apium rusticum cognomināt. Sunt qui apiastro, id est, syluestri apio similem faciant. Meminit Dioscorides libro sexto. hac vescentibus mētem adimi, & quadam neruorum distēctione dehiscere in rictus ora cogi, ita ut ridentium imaginem præbeant. Inde Homerus & posterius risum nullo salubri sensu dignum, sardonium nominant. Strabo ex hac herba toxici genus Hispanos confecisse prodidit, haustu cuius urgente vi maiore citra dolorem ipsi sibi mortem conscisciebant. Nascitur secus fontes, nullum tamen virus pestilens aquis impertitur, Pausanias apud Sardos eam pignus scripsit.

SATYRIUM aliqui trifolium vocant, quoniā tria fert folia, ad terrā infracta, rumici aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalē, nudum: florē lilii effigie, cādidū: radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluā, intus, ut ouū, candidam, gustanti dulcē, & ori non ingratam. Est & alterū satyriū erythroniū siue erythraicon, id est, rubrū semine lini, maiore, duro, læui, splendente, quod fertur, nō secus atq; scincus, libidinem excitare. cortice radicis gracili, rufo, intus

σατυριον
testicul^{is},
sacerdoti^{bus}.

ερυθρον
violeta

autē album includitur, sapore dulci, non ingrato ori. in mōtosis & apricis enascitur. Ac. gūeta. Satyriū humidum est & calidū, item flatuosum, vnde veneris appetentiam facit. Nonnulli opisthotonis cum vino austero potum salutare esse tradunt. Galenus in commentario de theriaca, trifolium ait hyacintho simile, quum aëre inturgescens, semen sylvestri cnico æquale habet: decocti ipsius ius superfusum, phalāgii aut viperæ morsus sanare: sano idem potui datum, similem animalium horum ictibus affectum conciliare.

σατυριον
βασιλικόν.

SATYRION basilicum Græcis nominatur, foliis nigra plumbagine maculosis, reliqua superficie cynosorchi similis. radix subest lutea, ac instar manus effigie ramosa. Cutim erugat, ad neruorū dolores, & contra noxia medicamenta datur. Semen ex vino sumptum nouem diebus comitiales sanat. In eundem effectum vinū diluitur herbæ decocto. Scobs radicis propinatur in vino ad arcendā quartanam, quam & vomitione curat, paulo ante accessionem pota. Fertur & amuletum esse radix gestata. (Herbam quoque illam satyrion Indam appellauerim, Theophrastō allatam ex India: incredibili neque fanda ad libidinis motus potestate vel cōtactu: nō tamen speciē eius aut nomen aliud reddidit Theophrastus.) Habent hodie & Syri herbam simili effectū, bucheidénq; nominant,

& Indicum satyrion, radice candida & dura, commendatiore quo crassior, rugosior & albius fuerit, podagris utili.

SATYRIA trivialis notitiæ est. gigni *βύμβρα* tur in asperis locis, & tenui solo, thymo simi *Sarietto* lis, minor tamen & tenerior. defert spicā florum plenam, coloris herbacei. Eadem potest quæ thymum, si modo cōsimili sumptitur. Aptus sanis vsus. Est etiamnum quædam satyria, sylvestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam, commodius in cibos recepta est. Aeg. Thymbra agrestis quidem eadem quæ thymus præstat: hortensis autem in omnibus quidem imbecillior, sed ad cibum laudatior.

SAXIPHRAGA seu saxiphrages urinā mouet, & calculos conterit. Aeg.

SCAMMONIA, ramos ab vna radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui non nihil crassitudinis præ se ferāt: foliis helxine, aut hederaceis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangulis: flore cādido, rotundo, in calathi modum cauo, graucolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus, Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excavatur, quo fit ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos, subiectis iuglandium *σκαμμο-
νία.
Diagre-
don me-
dici nūc
appellāt*

foliis, profundunt succum, siccátumque extrahunt. Laudatur autem scammonium leue, nitidum, rarum, & colore quàm simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ deportatur. Nec attendere solum par est, si linguæ tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod admisto fit tithymali lacte) sed longe magis antea narratis. item si non vehementer linguam exurat, id quod misti tithymali argumentum est. natione autem Syriacum & Iudaicum deterrima habentur, grauiora, densa, erui farina & tithymalo vitata. Aegin. Scammonia calfacit, digerit, & biliosa extergit, magisq; eius liquor qui iam & phymata dissipat, foetus appositu corrumpit, lepras exterrit, in diuturno capitis dolore cum oxyrhodino vtiliter respergitur. Radix autem tum ipsa, tum decoctum eius potū, purgat. Cum aceto & farina hordeacea decocta, coxendicum doloribus illinitur.

- σκανδίσ.* **S C A N D I X** syluestre olus est, amarum, subacre, quod crudū coctūve manditur. sto macho & ventri vtile. Aeg. Cal. sic. 2. Vrinam pellit, viscera obstructione liberat.
- σκύλλα.* **S C Y L L A** incidit, calefacit, & desiccatur, in secundo ordine. præstat autem eam assam aut elixam sumere.
- Charpen* **S C O P A** regia Plinio viola est violentum
caire spirans odorem, sed hoc foliis, non floribus.

(fortassis eadem fuerit viola flammea, cuius ramuli & folia odorata describuntur, flos inodorus. Vere statim post purpuream emicat, sylvestris dūtaxat: interdum tepidioribus locis, ubi cælum arridet clementius, nondū exacta hyme, colore cōmendabili, odore nullo semine proueniens coronis. Plurimum durat tempus. Græcis phlox & phlogion appellatur.) Diosc. bunion suum Latinis scopam regiam scribit appellari. Plinio similiter appellatur sideritis, quæ sit latissimo folio, vulneribus præcipua, quæ etiam præcisos nervos glutinare possit.

SCORDIUM in mōtibus & palustribus nascitur, foliis trifaginis, maioribus, nō sic in ambitu diuisis. aliquantū allia redolentibus, gustu amaris & astringentibus: quadrangulis caulibus: subrubro flore. inter priora efficaç Ponticum natione, Creticūmq; Aeg. Variis pollet facultatibus, vt quod amarū, acerbū, & acre sit. purgat igitur simul & calfacit viscera. vrinas & menstrua concitat, refrigerata omnia exalfacit, vulnera glutinat, repurgatque: aridum illitum cicatricem inducit.

σκορδιον
Herb.

chamæ-
dryspalū
stris rur.

chamara.

Non est

hæc alliū

sylvestre

scu allia,

ria

SCORDION alterius generis méthastro simile à Plinio traditur.

σκορδιον

ἑπείον.

SCORPIOIDES herbula est, quæ semen habet ad similitudinem caudæ scorpionis, foliis paucis. illitum valet aduersus animal

σκορπιον

δίσ.

Non est sui nominis. (Plinius herbam scorpium vocat edula, cauuit, quanquam & aliis idem nomen con-
nec sol tribuat.)

se quia **SCORPIVS** siue nepa nullum folium habet Plinio, sed in cacumine aculeum, sub cuius extremo in carne protuberante, florem profert per initia cādidum, postea leniter accedentem ad purpuram. Post æquinoctium autumnii floret, radice singulari eadēmq; breui cohæret. Spina est in totum, asparagi caule. Nomen ab aculeo suo traxit. (Eadem arbor cum Dioscoridis trago herba. Describit & alium scorpium Plinius cyclamini folio, aconiti generibus adnumerandum.)

SEBASTI, vide Myxa.

σκόροδος **SCORODOPRASVM** magnitudine porrum æquat, qualitatum porri & allij particeps. vnde promiscuas sibi vires ex utroque vendicauit, effectus allij & porri præbens, inefficacius tamen coctum, porri modò, dulcescit, & in olerum vicem transit. Aeg. Porri & allii mixtas habet vires, & gustatum.

Segle **SECALE** Plinio farraginis genus, occari tantum desiderat. Taurini sub alpibus assiam vocant. deterrimum & tantum ad arcendam famam vtile, fœcunda, sed gracili stipula, nigritia triste, pondere præcipuum. Admiscet huic far vt mitiget amaritudinem eius, & tamen sic quoque ingratissimum vètri est. Nas citur qualicunq; solo cum ceterisimo grano,

ipsumque pro latamine est.

HEDYSARON, vnguentarij pelecini, *πυλίκιον*
 id est, securidacam vocant, fruticosa est, foliis *vos.*
 ciceris. semen rufum in filiquis fert, cornicu- Feue de
 lorum modò aduncis, quod ancipitem secu loup, her
 rim æmulatur, vnde nomen accepit. amarum bue ou
 gustu. Nascitur in segetibus & hordeis. Aeg. graue
 Amarum est, leuitérq; astringit, vnde potum ou cor-
 stomacho gratū redditur, viscera obstructa nuette
 repurgat.

SELAGO similis herbæ Sabinæ est. Hæc
 contra omnem perniciem habendam prodi-
 dere Druidæ Gallorum, & contra omnia ocu-
 lorum vitia fumum eius prodesse.

SEMPERVIVVM magnū ideo nomi- *αἰψων.*
 natur, quoniam perpetuò folia vircant. cuius *lōbarde*
 caules cubiti altitudinem implent, interdum *ou lou-*
 excedunt, pingues, crassitudine pollicari, vi- *barde*
 rentes, characiæ tithymali modo infecti: fo-
 lia pingua, carnosæ, lōgitudine pollicari, in
 cacumine linguæ similia, alia in terram con-
 uexa, alia in capite stantia inuicem, ita vti am-
 bitu effigie imitentur oculi. nascitur in mon-
 tibus, & testaceis. supra domicilia etiam feri-
 tur. Sempervivum paruum in petris, parietibus, & maceriis, necnō scrobibus opacis na-
 scitur, caulibus ab vna radice multis, tenui- *Vermicu-*
 bus, crebrò foliatis: exilibus foliis, rotundis, *lalis &*
 pinguibus, mucronatis: caule à medio emi- *cauda*
 cante, palmum alto, vmbellam herbidósque *muris*

Menu
pourpier
tauluage

florēs & tenues gerente. Folia eisdem cū priore viribus prædita sunt. Tertiū videtur semperui genus, quam aliqui andrachnen agriam, aut thelephion vocauerunt, Romani illecebram, pusillis, crassioribúsq; foliis, hirsutis, portulacæ proximis. nascitur in saxis. Vis ei excafactoria, acris, exulcerans. illita cum axungia strumas discutit. Aeg. Aizoon vtrunque frig. 3. siccatur autem astringitq; mediocriter. Valet erysipelatis, & ad herpetas, inflammationesque ex fluxione concitatas conuenit.

ἡριφύων.
Seneccon

SENECIO cauliculo est cubitali, subrubro, foliis continuis, diuisura crucæ, sed minoribus multo: luteis floribus, qui celeriter dissecti vaneſcunt in pappos. nomē verò sibi vendicauit, quoniam flores capillorum ritu vere canescāt, radice superuacua. nascitur maxime in maceris, & circum oppida. Aegine. Mixtas habet vires, refrigerat, & modicè discutit.

οἰκίς.
cichoree

SERICA in Ziziphis leguntur.

SERIS duūm generum est. altera sylvestris, quæ picris & cichorion vocatur. altera satiuā, latioribus foliis cōstat. stomacho quā hortenſis vtilior, quæ iterum in duas species digeritur. vna folio latiore prodit, lactucarū simillima. altera angustiore est folio, & gustu amara. Aegineta, Subamarum olus est, admodum refrigerans humectansque, cum

astriptione nonnulla.

SERPILLUM duorū generum est. Hor- ἑρπυλλον
tense odore sampfuchum imitatur, atq; in co- Serpillet
ronas addi solet, cui à serpendo nomen indi-
tum est: quoniam si qua eius particula terrā
attingat, inibi radices demittet. folia & ramu-
los origani habet, sed candidiores. in mace-
riis multo procerius assurgit. Sylvestre, zy-
gis appellatum, non serpit, sed in altitudi-
nem increfcit, ramulos edens tenues, surcu-
losos, foliis refertos longioribus quā rutæ,
& durioribus, angustius. flores iucundè olēt,
gustāti acres. radicis nullus vsus. Nascitur in
petris, satiuo efficacius, atque magis ex calfa-
ciens, & ad medendi vsū aptius. Aeg. Serpil-
lum calefacit, vt & vrinam & menstrua com-
moueat.

SESAMA stomacho inutilis cibus. Aeg. σησαμον
Sesamū non parum lentoris, pinguisq; obti- offic. sifa
net: idcirco opplere, mollire, & mediocriter mum
calefacere idoneum est.

SESAMOIDES magnū, in Anticyra el- σησαμον
leborum vocant, quoniam albo veratro in αδ'is με-
purgationibus misceatur. simile est senecio. γα.
ni aut rutæ: longo folio: flore candido: radi-
ce gracili, ignaua: semen gustu amaro, cæte-
ra sesamæ simile. Ventrem detrahit. datur
tritum ad bilis pituitæque deiectiones, quan-
tum tribus digitis capitur, addito verati al-
bi sesquiobolo, ex aqua mulsa.

εν σαμο- Sefamoidi paruo cauliculi sunt dodrantes:
 εις εις μι- folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cau-
 κρον. liculorum cacumine capitula, florū penè pur-
 purcorum, medio eorū albo: semen sesama,
 fuluum, amarū: radix tenuis. Detrahit bilem
 pituitasque, semen ex aqua malsa potum di-
 midio acetabulo. illitum ex aqua, tumores
 ac tubercula discutit. nascitur in asperis. Aeg.
 Sefamoides albi (aut potius parui, mendum
 enim interpretor λευκοῦ pro λεπτοῦ.) semen
 calefacit, detergit, & rumpit. Maius autem ve-
 ratri vires sequitur. Galen.

τρυδύ-
 λιον.

T O R D Y L I V M, quod aliqui Creticum
 fefeli vocant, iuxta Ciliciam in Amano mon-
 te nascitur, herbula surculosa, semine duplici
 rotundo, scutulorum effigie, odorato, suba-
 cri. Aegineta, Gordylon alii fefeli appellant,
 calidum est, urinæ & mensibus educendis ha-
 bile. Radix ipsius cum melle lineta, quæ in
 thorace hærent, educit.

σισυλι-
 offic. &
 herb. sa-
 xifraga
 maior

S E S Y L I Massiliense folia fœniculi habet,
 crassiora: caulem vegetiorem: umbellā ane-
 thi, in qua semen oblōgum, angulosum, de-
 gustanti statim acre. radix longa est, iucundi
 odoris. Aethiopicum fefeli, folia habet hede-
 ræ, minora, & ad periclymeni modum ob-
 longa. frutex nigricat: palmītibz in bina cu-
 bita extensis: ramis sesquipedalibus: capitu-
 lo anethi: semine in tritici morem denso, ni-
 gro, amaro, Massiliensi odoratiore, & acio-
 re,

re, multum suavi. Peloponnense folia ha- πυλοπον
 bet cicuta. latiora, & crassiora: caulem supra νκριακόρ
 Massiliensis magnitudinē, ferulaceum, & la-
 tum: in cacumine umbellam, in qua semen la-
 tius, odoratum, & carnosum pender. Eisdem
 viribus præditum est. nascitur in asperis, ri-
 guis & collibus. inuenitur etiamnum in insu-
 lis. Aeg. Sesele radix magisq; semen insigni-
 ter calefacit, tenuisq; substantiæ est, urinam
 quoq; ciet, comitialibus & recta ceruicæ spi-
 rantibus accommodatum.

SEVTLOMALACHON recens Græc. σιντλο-
 cia fecit olus, quasi dicas maluaceam be- μάλαχον
 tam (fortè quod figura & denticulato semi-
 nis habitu betam, & mollitia maluā menti-
 retur.)

SYCOMORVM aliqui etiam syca συκομο-
 minum, id est, morum vocant cuius fructus ρος.
 sycomorum etiam propter inefficacem gu-
 stum appellatur. arbor est magna, fico simi-
 lis, frondosa, multo lacte abundans foliis
 mori. pomum ter aut quater anno fert: non
 ramis, vt ficus, sed caudice ipso, caprifico nõ
 dissimile. dulcius grossis, sine granis interio-
 ribus. quod nõ maturescit, nisi ungue aut fer-
 ro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria,
 Rhodo, locisque non multi tritici feracibus:
 ubi prouentu fœcundo astibilibus iuamen-
 tum adfert, cum amonæ caritas premit. Gi-
 gnitur & in Cypro arbor genere distas, quæ

cum sit vlmus, prædita tamen est foliis sycomorî, fructu pruni magnitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis. Aegin. Sycomorî fructus nullius nutrimenti est, & stomacho noxius. Liqueor arboris vi pollet emolliendi, glutinatoria vulnerû, discussoria tumorû: bibitur inungiturq; ad serpētium morsus, lienes induratos, stomachi dolores, & in accessionibus febrium horrores.

S I D E planta lacustris est in Orchomenio lacu frequēs, papaueri similis, roseo flore, vasculo mali amplitudine, cādidis membranis obducto: semine intus rubro, gustu triticum æmulāte. Caput & folia super vndas emicāt, mox cum defloruit inclinatur in vadum, semēnque spargit. Plin. & Theo.

sidnē-

tis.

Herb. &

off. tetra-

hil, ou

herbe Iu

daice.

S I D E R I T I N aliqui heracleam vocant. folia habet marrubii, sed longiora, satis ad frondē quercus, aut saluix accedentia, minorā tamen, & aspera. caules edit quadratos, pal- mum sæpe excedentes, nō iniucundi gustus, aliquantūmq; substringentis, in quibus per interstitia orbiculatæ vertebrae, vt in marrubio, spectantur, & semen in eis nigrum, nasci- tur in petrosis. Illita folia, suapte vi, vulnera sine inflammationis periculo iungunt.

Lunaria

maior

Altera sideritis binūm cubitorum, ramulis exilibus: folio filicis, numeroso, vtrinque per oras diuiso: pediculo longo, prodeunti- bus ē summo alarum sinu surculis, longis, te-

nuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen cōtinetur, quàm betæ rotundius aliquāto, ac durius. Huius vis, foliorūque, ad vulnera, præcipua est. Sideritim aliam esse tradunt, quam Crateuas heracleam vocat, in maceris & vineis nascētem, foliis coriani, à radice numerosis: dodrantalibus cauliculis, læuibus, teneris, in rubore candicantibus: florē purpureo, paruo, gustanti amaro & lento. Huius ea vis est, vt quamuis recenti vulnere imposita, sanguinem supprimit. Galenus, Habet quidem & abstergēs aliquid, sed amplius humidū & mediocriter frigidum, cum adstrictione pauca, hinc inflammationib⁹ resistit, vulnera glutinat. De Achillea sideriti alibi diximus.

Mille
feuille.

SIDERITIS Plinii latissimo folio in scoparia regia habetur.

SILER frutex est, qui nonnunquam arborescat, vt baculos rustici ex eo faciāt, in aquaticis nascens quasi pumila salix, cuius etiam generibus annumerari creditur. Eius folia illita fronti capitis dolores sedant. Semen tritū in oleo phthiriasēs coërcet. Serpentes hunc fruticem refugiunt, baculūque ob id ex eo rustici conficiunt.

Officina
cōfundit
cū scelsi.

SYLIBON, lata spina est, folia ferēs chamaeleonis albi. Hæc recēs cum sale oleoq; cocta estur. Radicis succus drachmæ pondere potus, vomitiones ciēt. Aegineta, Succum

συλίσον

cum malsa bibendum adiicit.

ἀλυσκ.
Arinca
gallis
olim

S I D E M generi filigo adscribitur, sed minus aliquanto nutrit. in panes, vt zea, cogitur. Fit quoq; è filigine crassior farina, quā Græci crimonon vocitant. Galenus, Olyrae naturam inter triticum & hordeum est media, siue vt nutrimentum consideres, siue vt medicamentum.

κερατω-
ρία.

S I L I Q U A E fructus arboris ceratonix siccandi & (Galen. astringendi) refrigerandi virtutis, nonnullius etiam dulcedinis participes est. Aegineta.

σύμφυ-
τον π-
τρίων.

Bugle, nō
est Cōso-
lida me-
dia officii
narum.
σύμφυ-
τον πικρον
cōsolida
de ou cō-
syre

S Y M P H Y T O N petraeon, id est, alus. nā scitur in petris, ramis tenuibus, paruis, origano similibus: capitulis thymi: surculosum totum, odoratum, gustu dulce, saluā ciens: longa radice, subruſa, digitali crassitudine. carnes autē cum symphyto decoctæ coalescunt. Est & alterum symphyton quod aliqui petraeon vocant: id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, vt sonchi inanem, circa quem breui interuallante spacio, folia exeunt angusta, linguæ bubulæ proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam striato: foliis tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus, in quibus flores lutei, & circa caulem velut verbasci semina emicant. tam caulis quam folia, aspera lanugine horret. tācūq; pruritus concitant. Radices demittuntur foris nigrae, in-

rus candidæ, viscosæ, quarû est vsus. Carnes quoque, si concoquantur, cogunt additæ. Aegineta, Petræum contrariis cõstat viribus, habet enim aliquid quod incidat, ideòque pus in thorace & pulmonibus collectum expurgat, itémque renes. Habet etiam aliquam contrahendi virtutem, qua sanguinis excreationibus medeatur. conuulsis, ruptis, mulierum fluxionibus rubris, intestinorum ramicibus. Item calida quædã humiditas ei inest, qua sitim arcet, & arteriæ asperitates sanat. Symphytum alterum viscosum quippiam & mordax repræsentat, scillæ simile. Vtuntur eo ad quæ superiori.

SYPHONAM, quam alij crumphenam, Fortè hæc Plinius repræsentat alternis viridibus roseisq; genesis per caulem foliis, eamque in posca sanguinè seu helezicientibus mederi. fia Gall.

SINAPI hortense, aliqui napi vocât. Eli- νάνυ,
gi debet adultû, valde rufum, nõ magnopere σίγνυ.
siccum, sed quod fractum internè virescar, & Seneue
veluti quodam succo madeat, cæsum colore.
siquidem recēs id genus, tempestiuum habetur. Aeg. Cal. sic. 4. σίσαρον.

SISER vulgò cognom. Cuius radix de- Serulle
cocta ori grata est, & stomacho utilis, urinã seruile,
ciet, & appetentiam inuitat. Aeg. Radix cal. ou escher
2. (aliàs enim perperam legitur. 3.) uille

SISYMBRIUM, alii serpillû syluestre σίσιμν
vocant, in solo inculto nascitur, méthæ hor. βρίον.

offic. na- tensis similitudine, odoratius, latiore folio.
 sturcium Inferitur coronis. Alterum sisymbrii genus,
 aquaticū quod aliqui cardaminam, alii sion appellāt,
 vulg. cres ea herba riguis gaudet, & eisdē in locis qui-
 son. bus sion prouenit. quæ ideo nonnullis carda-
 mina nominatur, quod gustu cardamum, id
 est, nasturtium repræsentet. folia primum
 rotunda prædeunt. adulta crucæ modo fin-
 duntur. Galenus, Sisymbrium est subtile, dis-
 cutit, calefacit, siccatur 3. semen eius tenue cali-
 dūque est, vnde cum vino ad singultus &
 tormina exhibetur. Cardamina vero arida
 calefacit siccatur tertio. Viridis calefacit siccatur
 secundo.

σιων. s i s o n exiguum semen est, in Syria na-
 Menthe tum, apio simile, nigrum, sequeus, oblon-
 aquaticū gum, quo in condimentis, cum cucurbita,
 outhym- & aceto, indigenæ vtuntur. in cacumine gra-
 bree ou nula multa gerit. Aegineta, Sinon calidus &
 balsami subamarus est, vrinam mouet, concoctio-
 ta. nem adiuuat, menses educit, & viscera ob-
 structa aperit.

σμίλαξ. s i v m, quære Lauer.
 s m i l a x à Græcis, taxus à Latinis
 appellatur, arbor a Metis magnitudine, & fo-
 liorum eiusdem figura, in Italia & Narbo-
 nensi Gallia Hispaniæ contermina nascens.
 Auiculæ quæ Italicæ taxi baccas deuorant,
 denigrantur: & qui edetjnt easdem homines,

alui proflusio corripuntur. Narbone tam præsentis est veneni, vt si qui dormiant sub ea, aut in eius vmbra subsideant, lædantur, & sæpenumero moriantur. quare de taxo hæc traduntur, vt ab ea caueamus. Aegine-
ta, Smilax, vel cactus arbor est virosæ virtu-
tis. (Sed pro κακὸς malim legere τῶς.)

σμίλαξ

κηπιός

Hortensis s m i l a x, frutex, cuius se-
men à nonnullis lobia vocatur. folia habet
hederæ, molliora tamen: tenues caules, &
capreolos vicinis fruticibus circumuolutos:
qui tantum adolescunt, vt topiarias scenas
repræsentare videantur. siliquas scængræci
profert, longiores & torosiores. in quibus se-
mina renum similia, sed inæquali colore re-
cluduntur: quæ quadam ex parte fuluescunt.
Siliqua cocta, cū semine in oleribus, aspara-
gi modo, estur. urinā ciet, & tumultuosa so-
mnia facit. Vide plura in Phaselis.

σμίλαξ

τραχίαι

s m i l a x aspera, folia habet peri-
clymeni: sarmenta tenuia, multa, rubi mo-
do, aut paliuri aculeata. arbores scandit ab
imo ad summa perreptans, se conuoluens
eis. fert racemos exiles, qui maturi rubescūt,
gustumque leniter mordent. nascitur in palu-
stribus & asperis: radice dura, crassaque.

σμίλαξ.

λίκα.

Læuis s m i l a c i s folia hederæ similitu-
dinē habent, molliora, læuiora, tenuiora. hu-
ius sarmenta nullis horrent spinis. conuolui.

tur arboribus, & prior. fructum parit lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac smilace, quadam topiariorum arte, tentoria cōtra æstus molestiam faciuntur. folia per autumnum decidua. Aegin Milax tam lævis quàm aspera, arbores amplexa, calidam acremque facultatem possidet.

σμύρε.

νιόν.

Leuechia
ou lues-
che

S M Y R N I V N, quod in Cilicia petroseli nū vocāt, passim in Amano monte gignitur. caulem habet apij, & stolones multos: folia latiora, suppinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia, iucunda, colore in luteum languescente. capitibus caulium orbiculatis, vt anethi. semine brassicæ, rotundo, nigro, acri, myrrhæ sapore, ita vt alterum alterius loco cedat. radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. cortex eius foris niger, intus viridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus atque squallidis, & limitibus terrenis. Aegineta, Quidam hipposelinum, quidam apium sylvestre nominant. Cal. sic. 3. apio duntaxat fortius, petroselino inualidius. vrinæ & mensibus educendis accommodatum.

σπύλινος

κντά σφ.

Morelle

solatrum

Hortense S O L A N V M, frutex cibus idoneus, exilis, pusillus, multis concavis alis: folio nigro, maiore quàm ocimi, & latiore: fructu rotundo, viridi, qui post maturitatem

nigricat, aut fuluescit. herba innocentis gustus. Aeg. Astringit, & frigefacit secundo.

Est & aliud **SOLANVM**, quod peculari nomine halicacabon, id est, vesicariā, ant physalida vocāt, foliis antedictō latioribus. cuius caules, posteaquam adoleuerunt, pro-na terram spectant, folliculis orbiculatis, ful-no intus acino, vesiculis simili, rotundo, læ- ui. quo coronarii vtuntur, & corollas faci- tant. Vim vsumq; herten-sis solani habet: verū cibis nequaquam expetitur. Aegineta, Uri- næ ciendæ idoneum fructum habet, acino vix æqualeq.

SOLANVM manicon, aliqui persion, al- lii thryon appellauere. huic folium eruce si- mile, maius aliquanto, satis acantho, quem pæderota vocant, accedens. caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adolescentes: caput in cacumine oliuæ figura, sed vt platani pilulæ, hirsutius, verum maius, latiúsq; florem nigrum. post- quameo exiit, racemus exit rotundius, ni- ger, denis aut duodenis acinis constans, simi- libus hederæ corymbis, vt vix mollibus. ra- dice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. gignitur in montibus vento perflatis, & pla- tanetis. Aegineta, Intus assumptū inutile est: à foris illitum vlcera depascentia curat. Frig. sic. 2.

SOLANVM somniferum, aliqui etiam

στυχνοσ
ἀλικακ-
καβος.
offi. alca-
quengi.
tur. cocre-
tum.

στυχνοσ
μανικός.
offic. sola-
trū. Ino-
relle.

στυχνοσ
ὕπνωτι-
κός.

her. & of. halicacabon appellât, fruticat multis ramis,
 folatrum densis, caudicosis, fractu contumacibus, pin
 dormito. guium foliorum, cotoneæq; mali similium
 riû ouma plenis: flore grandi rubro: fructu in follicu-
 rinum. lis crocato: radice longa, subrubro cortice ve-
 stita. nascitur in saxis, non procul à mari. Aeg-
 ineta, Radicis cortex cû vino denarii pon-
 dere potus, somnum conciliat. Semen urina
 mouet, frig. 3. Vnde corymbi ei⁹ plures duo-
 decim epoti, furorem accersunt.

κόμφορ. S O M P H V S cucurbitæ genus syluestris
 est, cui nomen, quia fit inanis, digitali crassi-
 tudine, non nisi in saxosis nascent.

σόνχος. S O N C H I duo genera. syluestrior qui-
 dâ est, & magis spinis horret. alter teneritate
 aliis pa- quadam mollescit, cibis expetitus, angulo-
 lais aulic so caule, inani, interdû rubente: foliis in am-
 ure. nô é bitu per interualla dissectis. Alter sonchus
 hec scari- tenerior, arboris instar, latis constans foliis.
 ola officii caulé in ramos exeûtem folia distingunt, sed
 larum. ad eadem pollet. Aegineta, Astringit & ma-
 nifestè refrigerat, tum corpori admotus, tû
 manducatus: exarefactus autem mediocri-
 ter calefacit.

ὄβα. S O R B A colorem luteum referentia pri-
 Sorbe ou us quàm maturescant, dissecta & sole siccata
 corne. manduntur, vt alium sistant. eadem est fun-
 ctio molitorum farinæ, si polentę loco suma-
 tur, quod & decoctû eorum in potu præstat.
 Aegineta, Sorbus arbor, cuius fructus oa, à

nonnullis *δύα* dicitur, adstringendi vim obtinet, sed minorem mespilo.

SPANACIAM olus recentiores Græci *σπανακία* dixerunt, vt putant nonnulli ab oleris raritate: vel ab aliis (vt est simile veri) nationibus Spinage: emendicato spinaceo nomine.

SPARGANION, aliqui xiphidion vocant. folia habet gladioli, sed arctiora, & in terram magis procumbentia. in summo caule veluti pilulæ prominent, in quibus semen Contra serpentis venena, radix cum vino datur. Aegineta. Vim habet exiccantem. *σπαργάνιον* off. spatula foetida

SPARTION frutex est, longas ferens virgas, sine foliis, firmas, fractu contumaces, quibus vites vinciuntur: semen lenticulæ, in folliculis phasiolorum modo nascens: flore, vt albæ violæ, luteum. Aeg. Sparti & semen & flos cum mulsâ instar quinq; obolorum posita, per superiora purgant vetatri modo sine periculo. Semen per inferiora quoque purgat. Virgulæ ipsius ad coxendicium dolores proficiunt. *σπαρτίον*

SPHONDYLIVM folia quadam tenus platani & panacis habet. caules fœniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex, seseli simile, sed latius, cãdidius, & magis palaceu, grauis odoris. flores eius albi, aut palldentes: radice raphani, candida. nascitur in palustribus & aquosis. Aegineta, Fructus eius *σφονδύλιον*. Panaiiz sauluage.

& radix virtute acri & incisoria suspiriosis, comitialibus, & arquatibus succurrit. Radix autem circumrasa, fistulisque imposita, illarum callos tollit. Succus è flore ipsius expressus antiquis aurium vlceribus instillatur.

SPINA acuta, vide Acuta spina.

ἄκανθα
λευκή.

SPINA alba nascitur in montibus & syluosis, folia fert albi chamæleonis, angustiora, & candidiora, aliquantum hispida, & aculeata: caulem supra bina cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine, albicantem, intus cauum. in cacumine capitulū inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen cœnicū, sed rotundius. Aeg. Eius radix siccatur, & modicè astringit, cœq; & stomachicis, & sanguinem expuentibus, dentiumque doloribus succurrit. Semen tenue calidumque est, hinc conuulsioni quoque medetur.

ἄκανθα
ἄραβικὴ.

σχῆνος.

Mōtana
& mollis
saluaherba.
naui-
cula, ou-
corona-
ria herba

Arabicam ἄραβικὴ natura albæ spinę similem esse cōstat. ipsa siquidem stringit ad sanguinis reiectiones, mēsum abundantiam, cæterasque fluxiones radix etiamnum valet. Prouenit in asperis. Aeg. Aegyptia vel Arabica spina astringit, siccaturq; impense, unde sanguinem, & alias defluxiones retinet.

STACHYS frutex est marrubio similis, sed longior. folia ferēs numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi, & complures virgas ab radice exeuntes, marrubio can-

didiores. nascitur in mōtibz & asperis. Vim habet excafactoriam & acré. foliorum decoctum potu pellit menstrua & secundas, Aeg. Cal. 3. menses excitat, interimit fœtus, secundas pellit.

STAPHYLODENDROS arbor trans alpes simillima aceri, alba in materia, fert si- σταφυλό-
δενδρος
liquas, & in iis nucleos sapore nucis auellanae. Plinius. (Sunt qui eandem Theophrasti colyceam interpretantur.)

STAPHIS agria, siue herba pedicularis, σταφίς ἀ-
γρία.
folia habet labruscae diuisa: & cauliculos rectos, molles nigrosque. fert florem glasti: & offic. sta-
phis a-
gria.
folliculos virides, similes ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluescentem, intus album, gustu acrem. Aeginaeta, Acris adeo est vt pituitam per os educat, & vehementer abstergat.

STYRAX lachryma est arboris malo cotoneae similis. Praefertur sordescēs, flauus, res στυράξ.
nosus, albicatibus grumis, quam plurimum offic. sto-
in sua odoris gratia permanens. qui dū mol- rax & Ca-
litur, melleum liquorem reddit, qualis ē Ca- lamītha.
thaballis, Pissidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, fursutosus, friabilis, cano-
que situ obductus. Cæterū lachryma inuenitur gummiū similitudine, perlucida, & myrrhe gummula. verum perpauca manat. Adulteratur ligni scobe, quam vermiculi erodentes excusserūt, melle, & iridis sedimēto, & quibusdam aliis,

Alii ceram aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis foliis cum styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua vermiculos exprimunt, venundantq;. Styra- cem hunc, quoniam in vermiculorum specie contrahatur, scoleciten cognominant, quem tanquam sincerum imperiti approbant, non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam. siquidem acer admodum est, qui adulterationis vitio caret. Aeg. Styrax calefacit, emollit, & cōcoquit. Tussi, destillationi in nares, & grauedini utilis. Menses idem potus appositusve trahit.

σολιβή.

Non est
vulg. sca.
biofa.

STOEBAE semen & folia sic. 3. ordine, principio viribus donata astrictioris, eamq; ob causam vulnera magna conglutināt. Decoctum ipsorum intestinorum torminibus, sanguinis eruptionibus, auribus purulentis auxiliatur: folia illita oculis ex ictu suffusis conferunt.

στοιχάς.

STOECHAS, iuxta Galliam in insulis eiusdem nominis è regione Massiliæ gignitur, vnde cognomētum accepit. herba tenuibus furculis, coma thymi, lōgiore folio, sub-amara gustu, & aliquantū acris. Aeg. Aperit, extenuat, detergit, & confirmat viscera omnia, totūmq; corporis habitum.

στρατίωτες
cumī, ou
aneth sau
uage, ali
is asini-
nusdauc.

STRATIOTES millefolium exiguum frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit. foliis auicularū pennas imitantibus, bre-

ui admodum dissectoque foliorum exortu. folia sylvestre caminum simulant, præsertim breuitate atq; scabritia, breuiora paulò, densiore umbella, & plenior. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum anethi: flores paruos, candidos. Nascitur in asperis agris, præcipuè circa semitas. Eximii vsus ad vlcera vetera, recentiaque, profluentè sanguinem, & fistulas. Aeg. Astringit, vlcera committit: nonnulli eo & ad sanguinis eruptiones, & ad fistulas vtuntur.

STRATIOTES in aquis nascens, iisdè στρατιώτης supernatat, & sine radice uiuit: vnde cognomentum traxit. Herba semper uiuo similis, ni maiora haberet folia. Aegineta: Humidus & frigidus est natura.

STRUTHIUM in Radicula quære.

T

AXUM arborem habes in simile T
lace descriptam.

TELEPHIUM herba portulacæ τηλεφίον
similis & caule & foliis, habes gemina tuber vineatica
cula, à singulis radicum geniculis enascètia, sæpuiua,
à quibus rami seni septémve fruticant, à ra- cicotri-
dice referti cœruleis foliis, crassis, lentis, car- nū, faba
nolis: flore luteo, aut cādido. Nascitur in cul- inuersa,
tis, & maximè inter vites. Tempore verno fo- crassula
lia senis horis illita albam vitiliginem sa- minor, a-
nant: sed postea herdeacea farina illini de- liis re-
bet. perunctam ex aceto etiā in sole vitiligi- prinse.

nem tollunt. sed vbi inaruerunt, absterguntur. Aeg. Cal. 1. sic. 2. Est itidem absterforiū, quapropter vlceribus putredinem expertis conuenit: & vitiligines, tum leucas, tum alphas cum aceto abolet.

Τερμιν-
θος.

TEREBINTHVS cognita arbor est, cuius folia, & semen, & cortex astringunt, & ad eadem ad quæ lentiscus conueniunt, simili parata modo sumptæque. Aegineta, Cal. 2. viridis sic. 1. aridus sic. 2. fructus vbi inaruerit sic. 3. hac igitur ratione & urinam mouet, & lienes adiuuat.

TESTICVLVM herbam in Orchi quære.

Τένκριον
Nō est q̃
vul. Tun-
sa faba.

TEVCRION, siue vt alijs placet, teu-
cris, herba est virgæ referens effigiem, trifagi-
nis similitudine. tenui folio, non multum à ci-
cere alieno. hæc in Cilicia iuxta Gentiadem
Cissadēmque; vbertim prouenit. Aegineta, Ca-
lesact 2. siccatur 3. Vi incisoria tenuique lieni-
bus medetur.

Θαλίτρον
Argētine

THALIETRON folia coriandri habet,
pinguiora paulò: caulem rutæ, in quo folia.
Quæ trita, illitu antiqua ulcera ad cicatricē
perducunt. Nascitur maximè in cāpestribus.
Aeg. Siccandi vim sine rosione habet. hinc vl-
cera inueterata cicatrice obducit.

Θάψια.

THAPSIA nomen ideo accepit, quod
in Tapso eiusdem nominis insula, primum
inuenta sit. tota verò natura ferulæ similis
est: gra-

est: graciliore caule: foliis fœniculi: umbella anethi in cacumine, à singulis surculis erūpēte, flore luteo. semē quale ferulæ, latū, sed aliquāto minus. radix foris nigra, intus cādida, longa, acris, crassiore libro vestita. Lactis extrahēdi ratio hæc est: Facto in ambitu scrobe cortices inciduntur: aut radix in fornicis specie in se excavata, cooperitur, quo merus succus confluat. oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallū expressus fictili crasso insolatur. Aliqui folium vnā terunt: sed inualidior huiuscemodi succus. Hoc autem interest, quoniam qui ab radice manauit, grauius olet, & humidus permanet: è foliis autem extractus, exiccatur, atque terebinthi iniuriam sentit. Qui succū colligit, stare debet non obuersus vēto, aut potius cū dies apricus est, & à flatu silet: quoniam ob halitus acrimoniam facies vehementer intumescit, nudāq; corpora inuadunt pustulæ: ob id prius liquido cerato & astringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedūt. Aegineta: Tapsia acris est, & valenter cum humiditate calefacit: ex alto igitur trahit insigniter, attractūque discutit.

THE RIONARCA inde nomen inuenit, quod serpentibus torporem inferat. θυριοναρχη
 frutex est foliis subherbaceis, roseo flore. κη Ser.

pentes necat cuicunque admota fuerit.

θυμλαία **THYMELAEA** est, qua granum gnidiū, oliuella, quod est semen ipsius, colligitur. hoc Syri a-
leo rerro, polinum vocāt, quoniā sativi lini frutex sua-
oulin sau pte natura, similitudinem referat. virgas edit
uage. perpulchras, multas, tenues, trepidancas: fo-
liis chamelææ, angustioribus, & pinguiori-
bus, viscosis, gummosisq; si mordeantur: flo-
re candido: fructu myrti in modum rotun-
do, qui inter initia viret, & tandem rubescit:
inuolucrum fructus durum, foris nigrum, in-
tus album. Nascitur in montibus & asperis.
Hallucinantur qui coccon gnidium fructū
esse chamelææ existimant, decepti quadam
foliorum similitudine. Aegineta: Thyme-
læa, vnde granum gnidium fit, similes ei vi-
res obtinet. Habet autem granum id acrem
& adurentem facultatem, aluum cum aqua
potum purgat.

θύμος
Thyn.

THYMVM ab omnibus cognoscitur,
furculosus frutex, exilibus foliis, multis & an-
gustis circūdatus capitulis in cacumine, flo-
re purpureo refertis. Gracili solo & petroso
prouenit. Aeg. Calefacit, siccatur. 3. Glutinosos
crassosq; humores incidit.

θλάστι.
Senece
sauluage
herb. na-
sturtiū te
storū.

THLASPI, herbula angustis foliis, digi-
tali lōgitudine, in terrā versis, suppinguibus,
in cacumine diuisis: binūm dodrantū cauli-
culo, tenui, non sine adnascētibus ramis. fru-
ctu circa ipsum totū, ab extremo in latius se

pendente: semine nasturtii incluso, lenticule
 vasis effigie, nisi quod infringitur, vnde no-
 men accepit. flos albicar. Nascitur in semi-
 tis, & sepibus fossisq̃ue. Alterum thlaspi Nó ē hęc
 tradit Crateuas, quod aliqui Persicon sinapi bursa pa-
 vocant, latis foliis, radicibus magnis. vtile storis.
 ischiadicorū infusioni. Aegineta: Thlaspi se-
 men est viribus acre, intestinos abscessus po-
 tu rumpit, menses prouocat. ab inferioribus
 partibus iniectū, coxarum dolores finit, cruē-
 ta vacuat. suprā infrāq; biliosa, instar aceta-
 buli potum, expurgat.

THVS in ea gignitur Arabia, quæ thu- λίβανος
 rifea cognominatur. Primatum tenet in eo τός.
 genere masculum, stagonias appellatum, su- Eccent.
 apte natura rotundum. Tale autem indiu-
 dum est, candidū cum frangitur, intus pin-
 gue, in suffitu statim ardens. Indicū verò ful-
 uescit, & colore liuet, sed rotūdum industria
 facit. nā in quadrangulares formas disse-
 ctum fistilibus versant, donec rotunditatem
 contrahit. verum huiusmodi thus tempore
 flauescit, quod atomum aut syagrum appel-
 lant. Secundum locum habet Arabicum, &
 in Smilo nascens, quod aliqui copiscum vo-
 cant, minus multò & fuluius. Est & genus a-
 liud, cui ammitæ cognomen est, alioqui can-
 didū: quod dum mollitur, mastiches more di-
 gitis cedit. Adulteratur in itinere, pini resina
 & gummi. quod facile deprehendi potest.

siquidem suffitum gummi flammam nō eiaculatur, & resina in fumum evanescit, thus verò statim ardet. idem maleficio odor prodit.

λίβανου
τοῦ
φλοιός.

Præfertur **THURIS** cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, lævis, minime scaber, sine mēbranis. Adulteratur admisto pini aut nucis eius cortice. sed horum index ignis est. siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructāt. thuris verò cortex ardet, & cū odoris fragrantia vaporem eiaculatur.

μάννα
λίβανου.

MANNA thuris probatur candore micarum frequētia, & puritate. Vim habet eandē quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris contusi adulterant. sed hæc igne deprehenduntur. Neq; enim æquē suffitu aëriū vaporē, sed fuliginosum & impurum expuit, & permistū suaueolentiæ halitus virus habet. Aegineta, Lachryma thuris calfacit secundo sic. 1. Habet & modicam quandam vim leuiter astringentem. Cortex ipsius manifestò astringit, & siccatur 2. absolutè, crassior thure & minus acris: hinc sanguinē spuētibus, dysentericis, cœliacis, & stomachicis, tum foris impositus, tū intro assumptus salutaris est. Surculus ipsius calefacit siccatur 3. atque nonihil extergit: quocirca oculorum vlcera & purgat & explet.

TILIA Græcis philura dicitur, folio hederaceo, molliore, & in angulum acutiorem rotundiore & prolixiore, & in orbem lentè crispo atque serrato, flore tantisper dum calyculo continetur herbaceo, vbi emerſi flauo: fructus magnitudine fabæ, ſimilis acinis hederæ, in quo ſemen prætenue quantum atriplicis, omnibus animalibus ingratum, cum foliorum pabulo maximè ducatur, eorumq; mira dulcedine, quæ in cortice intelligitur. Materies maris dura, nodosa, odorati- or. (Theophrasto tamen fœminæ odoratior est) ruffior, cortex quoque craſſior, ac detra- ctus inflexibilis, nec ſemen fert aut florem vt fœmina. Tilia vertit folium conſecti ſideris ſignum. Multi corticem com manducatū vul neribus putant vtiliſſimum; folia trita asper- ſa pedum tumori. Humor è medulla caſtratæ arboris effluēs capillum reddit capiti illitus, deſluentēque continet.

ΤΥΡΗΑ foliū edit cyperidi ſimile: cau- lem album, læuem, æquabilem: florem in ca- cumine ambientem, denſum, qui in pappos ſoluitur, quod paniculam aliqui nōminant. Huius herbæ flos, ſuillo adipe eloto exce- ptus, ambuſtis medetur. Gignitur in paluſtri bus & aquis ſtagnantibus. Galenus & Aegi- neta non meminerunt.

ΤΥΡΗΑ vel tipha cercalis ſpecie ſiligi- ni non diſſimilis, ſimplici culmo aſurgens,

φιλύρα
Tilet, Ti
leul, teil.

τύφη, vel
τίφη.
Maffes.

τύφη σι
τώσης.

grano multiplici, tunica velato atq; leuissimmo, radice numerosa, tritico perquam similis traditur, & in id quoq; mutari si pista setur, nec protinus, sed anno tertio.

- τιθύμαλι** TITHYMALI genera septem, quorum masculus characias appellatur, ab aliquibus amygdaloides. Alter myrtites, qui foemina existimatur. cum quo myrsiniten, aut caryiten vocant. Tertius, paralius, quem tithymalida appellarunt. Alius, helioscopius. Quintus, cyparissias. Sextus, dendroides. Septimus, platyphyllos dicitur. Characiae caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo atque acri madentes: foliis oleæ circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignosa. pendet in cacuminibus caulium, coma iunci, sub qua caueolæ foliolis balnearum similes, in quibus semen continetur. nascitur in asperis & montibus. Foemina, quam myrsiniten, aut caryiten vocarunt, similis suapte natura daphnoidi: foliis myrti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis, & pungentibus: ramulos ab radice mittit dodrantales. fructum fert alternis annis nuci similem, mordaci gustu. nascitur in asperis. Aliud tithymali genus dicitur paralius, quem tithymalida, aut mecona aliqui appellauere. nascitur in maritimis, ramis subrubentibus, palmum altis, quinque senisve à radice exeuntibus: foliis lini, angustis,

paruis, oblongis, in versus quosdam dige-
stis: capite in cacumine orbiculato, in quo
semen, ut eruum, vario colore emicat. Flos
albus. Frutex totus cum radice lacteo succo
turget. similes ad usus reconditur. Heliosco- ἡλίσκο;
pius dicitur, foliis potulacæ, tenuioribus, ro- πιος.
tundioribusque: ramulis, prodeuntibus à ra-
dice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodran-
tali altitudine, tenuibus, lactis copiosi ple-
nis: capite anethi: semine velut in capitulis
incluso. Helioscopi nomē accepit, quoniam
comas cum sole circumagat. circa oppida na-
scitur, potissimum in tuderibus. Colligitur
succus semenque, ut aliorum. Eadem quæ su-
perioribus vires, non tamen usque, adeo validæ.

Cyparissias in caulem exit dodrantalem, κυνπαρισ;
vel maiorem, subrubrum: ex quo folia piceæ πας.
similitudine exoriuntur, molliora tamen, &
tenuiora: & in totum nascentē piceam æmu-
latur, unde nomen traxit. candido succo ma-
det, cui eadem vis quæ superioribus.

In petris nascens, dendroides cognomina- πτρο-
tur, ampliter opacat. in cacumine fródosam φνής,
spargens comam, succo lacteo prægnans, cau- δινδρσθ-
liculis rubentibus: foliis myrti tenuioris: siu δής.
Qu characiæ. Eiusdem effectus, cuius supe-
riores, similique modo reconditur.

Platyphyllos, verbasco similis est. Radix, πλατύ-
succus & folia per inferna trahunt aquas. Pi- φυλλος.
scæ necat, tusus, & aquæ inspersus. Reli-

qua tithymalorum genera quę suprā scribuntur, idem efficiunt. Aegineta, Tithymali omnes cal. 4. acrimonię, & validę amaritudinis participes, sed radix quum sit quodammodo imbecillior, aceto incocta dentiũ erosorum dolores finit. Liquores vehemētiore donati virtute dentium cauis imponuntur, reliquũ corpus si attingant, adurunt. Quare etiā pilos modicē delitos auferunt, item myrmecias, verrucas, & huius generis alia. Cutis labes abstergunt, maligna vlcera phagedenica curant. Cæterum ex septenario ipsorum numero validissimi sunt appellati, characias, myrsinites, & qui in petris arboris modo nascitur. hos sequitur qui verbasco similis est, & cyparissias, deinde paralius, quasi dicas maritimus, postremo helioscopius.

τράχα-
κάνθα.

TRAGACANTHAE radix lata & lignosa, summo cespite nititur, vnde furculos humiles, robustos, latissimē fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquā tenuia exoriuntur, quę sub se spinas albas, rectas & firmas occulunt. Est etiamnum tragacantha, lachryma quę vulnerata radice manans, concrevit. Præstat pellucens, gracilis, lævis, syncera & subdulcis. Aegineta, Tragacantha per similes gummi representat.

τράγιον

TRAGIVM nascitur in creta tantum insula, lentisco semine, folio & ramis simile, singulis tamen minoribus. succus ei lacteus,

gummi non dissimilis. Est & alterū tragiū, Bursa pa-
quod tragoceros aliqui vocant, folia scolo- storis esse
pendrij habet, & radicem sylvestris rapha videtur
ni, tenuem, candidam. Aeg. Tragiū cal. 3. at-
trahit, discutit, cum tenui substantia. Aculos
igitur educit, calculos comminuit, mensesq;
citat instar denarii potum. Sed alterū tragiū
hoc minus (lego enim non μικρότρον, sed
μικρότρον, è Galeno) scolopendrio assimi-
le, nascitur multis in locis, tanta astringendi
virtute præditū, vt fluidis affectibus commo-
dè faciat.

TRAGOPOGON, id est, hirci barbula.
Nascitur in aruis sua sponte. Radice longa,
dulci, folio croci, lōgiore, caule paruo, super
quem calyx latus, & barbula quæ summo ver-
tice incana & proluxa funditur, vnde nomen
accepit. Herba edendo est, flore luteo. (Quæ
vero altius in hortis crescit, folio est latiuscu-
lo, flore purpureo. Radices in altū agit, quæ
hybernis diebus acetaria dulcedine sua com-
mendant.) (Apud Galenum ladanum quo-
que ἀπὸ τραγώγων vocatur, quia colligitur
ab hircorum barbis.) Quantum hirci barbu-
la à senili distet, ex eius in gerontopogone
descriptione colligitur.) Aegineta non recē-
suit. (Est etiam superius descripta in hirci bar-
bula.)

τραγώ-
γων.
Herbape-
træ.

TRAGORIGANVM tenuis frutex est, Mastichi-
sylvestri serpillio aut origano similis, folio & na.

τραγώ-
γων.

ramulis, quibusdam in locis lætius virentiuf-
que inuenitur, & latioribus foliis, satis glutu-
nosum, alterum exilibus surculis, ac tenuibus
foliis, quod aliqui prafium vocauere. Opti-
mum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneū,
& in Chio Cooque proueniens. Aegineta,
Origani virtutes habet, & nonnullam etiam
astringentem.

τραγος σι
τωδης.

TRAGOS quandam halicæ frugis figurā
gerit. multo minus quàm zea nutrit, q̃ multū
aceris habeat. quare ægrius cōficitur, aluūm-
que magis emollit.

τραγος.
Herb. iū-
cus mari-
nus

Est etiam herba TRAGOS, quam aliqui
scorpion aut traganon vocāt, maximè in ma-
ritimis nascēs, palmum alta, aut amplior, fru-
ticolosa, humilis, oblonga, sine foliis, pusillis
circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudi-
ne vitici acuto cacumine, gustu multū astringe-
nte. (Confer hāc ad scorpionem siue nepam
Plinii, suprā nobis commemoratam, & can-
dem existimabis.)

τριβλος.
Chaulce
treppeou
calcetrep
pe.

TRIBULI genus vnum terrestre, foliis
ad effigiem portulacæ, tenuioribus viticulis,
in terra stratis. spinis secundum folia rigidis,
præduris. iuxta amnes & rudera nascitur.

Treuſle,
ou cha-
ſtaignes
aquati-
ques.

Est & alterum genus, aquis familiare, quod
in fluminibus natum comam exerit, aculeos
condens: foliis latis, & pediculo longo: caule
parte summa quàm ima crassiori. capillamē-
ta quædam indidem exorta spicantur. semen

durum, ab altero non abhorrens. Thraces qui ad Strymona amnem habitant, virenti tribulo equos sagināt, & ē dulci semine & esculento panem, quo vescuntur, faciunt. Aeg. Aquaticus mediocriter refrigerat: terrestres autem siccando valentior est, alter etiam humectat leuiter. Vterque contra inflammationum generationes, omnesque influxus cōuenit. Terrestres fructus cum tenuis existat renum calculos conterit. Trichomanes, in fidicula descriptum est.

TRIFOLIUM, Græci triphyllon, alii *τρίφυλλον* oxy triphyllon, alii menyantes, alii asphaltion vocant. frutex supra cubiti altitudinem attollitur, virgas habens tenues, iunceas & nigras, vnde ramulares enascuntur appendiculæ, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, loto arbori similia. iis recenter enatis rursus odor inest. vbi autem adoleuerūt, bitumen olent. florē ædit purpureum, semen quadam tenus latū, subhirsutū, ex altera extremitate exertum, antennæ modo corniculigerēs. radix tenuis, longa, valida. Gal. Trifolium, asphaltiū & oxytriphyllon appellatur, ob res quas ei contigisse apparet. Menyāthes autem & cnicion haud scio vnde. Vis eius est calida & sicca instar bituminis, cuius odorem imitatur. Vtrūq; vero præstat abscessu tertio, ideoq; laterum ex obstructione dolores potu iuuat, yrinas ac menses ducit.

τριπό-
λιον.
Curbít

TRIPOLIVM in marinis nascitur lo-
cis, quæ allidit vnda, recedensq; dimittit, ne-
que in mari, neque in sicco: folio glasti cras-
sior: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius.
vt tradunt, flores colorem ter die mutât, ma-
ne cãdidi, meridie putpurei, sero punicei cõ-
spiciũtur. radice alba, odorata, calidi gustus.
Aeg. Radix eius cal. 3. acris est.

χαμαι-
δρύς.
Chesnet-
te & serra-
tula ou-
german-
dree

CHAMAEDRY S Græcis, aliis chamæ-
drops, Latinis trifago dicitur. sunt qui eam
teucrion appellauere, propter eam quã cum
teucrion seruat similitudinem. Nascitur in pe-
trosis & asperis. frutex dodrantalis, folia ha-
bens exigua, amara, effigie & diuisura quer-
cus: flore paruo, penè purpureo. Carpitur se-
mine prægnans. Aeg. Cal. sic. 3. Lienes igitur
consumit, vrinas & menstrua elicit, viscerum
obstructiones expurgat.

πυρρίς.

TRITICVM cal. i. medium inter sic. &
humid. nonnihil etiã glutinosum & obstru-
endi efficax obtinet. Elixum coctũ difficile
est, & inflationes creat: concoctum tamẽ ali-
mentum præbet valentissimum. in panẽ au-
tem coactũ, minus inflat, minúsq; ægrè con-
coquitur, vtpote fermenti & salis particeps.

TVBBRA rotundæ radices sunt, sine cau-
le, sine foliis flauescences. vere fodiuntur. cru-
da & cocta eduntur. Aegineta, Terrestri con-
stant substantia cum modica quadam virtu-
te tenui.

T V S S I L A G I N I folia sunt maiuscula θύχιον.
 quàm hederæ, sex aut septem à radice, subal- offic. &
 bida à terra, supernè virentia, in plures angu herb. vñ
 los exeuntia : caulis palmū altus, flos luteus. gula ca
 in vere, flore & caule cōfestim exiuitur. inde ballina,
 nonnulli his vacare existimauerūt. radix te- & vulg.
 nuis est & superuacua. nascitur in amœnis & pata equi
 riguis. Aegin. Iuuat tusses suffitu, & recta cer- na.
 uice spirantes. Constat ex calida aquosaque
 substantia.

V

V **E N E R I S** pecten herba repræ- off. herb.
 sentatur radice candida, colicu rura, ra-
 lis semipedē altis, aut paulo ma stellū ou
 ioribus, foliis pastinacæ, sed tenuioribus, flo falcetum
 re albo, exili, depēdentibus summatim com-
 pluribus rostellis, in mucronem turbinatis,
 & pectinatim inter se disiunctis, inde nomē.
 Radix cum malua tusa, omnia corpori infi-
 xa extrahit.

H E L L E B O R V M album, Latini vera. ἡ ἑλλεβο-
 trum album vocāt, fert folia plantaginis aut γορ λιν-
 betæ syluestris similia, sed breuiora, & nigri- κός.
 ora, rubescētia: caulem cauum, quadrantālē, verart ou
 tunicis conuolutum cum arefcere cœpit. radi ellebore
 eibus nititur multis, tenuibus, ab oblōgo & blanc.
 exiguo capite exeuntibus, ceparum modo
 fibratis. nascitur in montibus & asperis. radi-
 ces messibus colligendæ. Optimum habetur

candidum, friabile, carnosum, modicè exten-
tum, nec tamen iunci modo mucronatum,
quod frangēdo puluerem emittit, & tenuem
habet medullam, gustu non admodum fer-
uens, neq; saluam subinde ciēs. huiuscemodi
autem strangulat. primatum Cyrenaicum te-
net. Galaticum autem & Cappadociū, can-
didiora & puluere quodā obfita, celerius strā-
gulatus mouent.

ἡλίβο-
ρος μέλας
Allebore
noir

HELLEBORVM nigrum, appellatur
melampodion, quoniam caprarum pastor,
nomine Melampus, furentes in se Prætidās,
primus purgasse & sanasse fertur. folia ei viri-
dia, platani similia, minora, foliis sphondylii
proxima, subaspera, nigriora, pluribus diui-
suris incisa: caulis asper: flores purpurei, can-
didi, racematim cohærentes: semen cnici,
quod in Anticyra sesamoides vocāt: quo de-
iectiones moliūtur. radicibus cohæret nigris,
tenuibus, à capitulo cepæ simili confibratis.
quarum est vsus. in collibus, asperis, & sitien-
tibus locis enascitur. Optimum est quod ex
huiusmodi petitur terris, vt ex Anticyra. Ni-
grum inibi probatissimū gignitur. Eligi de-
bet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit
medulla, acre gustu, feruensque: cuiusmodi
est in Helicone, Parnaso, & Actolia natum.
attamen Heliconium præcellit. Aegin. Vera-
trum vtrunque cal sic. 3. item acre est abster-
sorium, vnde etiam ad leprosa cutis vitia cō-

uenit. Nigrū vero si fistulis inseratur, tribus diebus callum exerit.

VERBASCUM differentias summas habet φλόμος
 duas, hoc nigrum, illud albū. in quo mas Bouhon
 & fœmina intelligitur. Fœminæ igitur folia off. taxus
 sunt brassicæ pilosiora multo, & latiora, can- barbatus
 dida: caulis albus, cubitalis, aut amplior: sub-
 hirsutus: flores albi, aut ex luteo pallefcētes:
 semen nigrū: radix lōga, gustu acerba, crassi-
 tudine digiti: nascitur in cāpestribus. Verba-
 scum, qui mas appellatur, oblongius, albis fo-
 liis, & angustioribus, tenui caule. Sed nigrum
 prorsus albo simile esset, nisi nigriore latio-
 réq; cōstaret folio. Syluestre, folia fert saluig,
 altas virgas & lignosas, & circa eas ramulos
 quales marrubiū: flores luteos, auri æmulos.
 Sunt & phlomidēs duæ, hirsutæ, rotundis fo-
 liis humiles. Tertia lychnitis appellatur, ab
 aliis autem thryallis, foliis ternis aut quater-
 nis, vel paulò pluribus, asperis, crassis, pingui-
 busq;: apta ad lucernarum lumina. Aeg. Ver-
 basci genera plura sunt, inter quæ est & dicta
 thryallis. Cæterum folia omniū siccātem &
 mediocriter astringentiam vim referunt, præ-
 cipuè eius quod aurei coloris est, & acerbū:
 fluidis conferunt affectibus. nonnulli & den-
 tes eis colluunt.

VERBENACA. vide Peristereon.

VERBENACAE genus alterum. vide Sa-
 era herba.

VIBURNI mentionem fecit Virgilius,
quantum lenta solent inter viburna cupressi-

VIOLEA flammea in Scopa regia continetur.

ῥομφαία VIOLEA purpurea foliū habet hedera minus, tenuius ac nigrius, nec multo dissimile. cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus, suauiter olens, purpureus. opacis & asperis nascitur. Aeg. Violæ folia aquea frigidaque substantia præpollenti constant.

ῖσος VISCVM optimum est recens, intus porraceum, extrà fulvum, quod asperi nihil, aut fursurosi concēperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxco fruticis folio. contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquūt. sunt qui commanducando ipsum efficiant. gigni tur quoque in malo, pyro & plerisq; aliis arboribus, quin etiam inuenitur in quorūdam fruticum radicibus. Aegineta. Calefacit cum acrimonia, humores ex alto validè elicit, & thapsiæ modo discutit, hac tamen multo est ignauius.

ἄγνος VITEX, siue lygos, frutex est in arborē assurgēs, nascitur in fluminum ripis, asperisque locis, ac torrentium alueis. ramos gerit prælongos, fractu peruiacces: folia oliuæ, sed molliora. Duo genera eius. vna harū album florem mittit, cum purpureo: altera tantum purpureum, & semen, vt piper. Aegin. Agnus

calefacit, siccatur tertio. Substantia tenuis est, coque flatus abolet. Ad castitatem conservandam conferre creditur, non modò commanducatus potiusque, verum etià in cubile substratus. Semen ipsius iccori lenique obstructis succurrit. Fructus vitæ minus inflat, & facile digeritur.

VITEM albam aliqui bryoniam vocant. ἀμπλος. Foliis, viticulis, pampinisque, sativam vitem λευκή. imitatur, sed hirsutiora sunt omnia. ea quos offic. & prope se nata sit frutices, suis claviculis com herb. bryplectitur. fructus rubes in vva dependet, quo onia & vicia coria pilis spoliantur. Ex ea asparagi, qui prius alba. ma germinatione exeunt, decocti in cibo, alvulgo uum & urinam ciunt. Succus è radice vere ex couleu- primitur. Aegin. Appellat & psilothrum. ger uree. mina sanè ceu stomacho grata eduntur, vrinæque; ciendæ sunt. radix abstergit, tenuis naturæ, mediocriter calida, unde fit ut lienes etiam potu consumat, extrinsecus autem cum ficiis illita scabiei & lepræ medetur.

Nigra vitis, quam aliqui nigrâ bryoniam ἀμπλος vocant, folia fert hederæ, sed maiora, similibus proxima: caules etiam cognatos. capreo- μίλαινα. Tamaris- lis suis arbores, quasi adminicula, comprehendit. fructus racematim coheret, qui inter principia virent, & post maturitatem nigrescunt. radix foris nigra, intus buxæ colore nitet. viticulæ, quæ primo germinum partu etumpunt, in olera recipiuntur. Aegin. Hæc etiam

bryonia appellatur: superiori consimilis est, sed inefficacior.

ἄμπιλος V I T I S sylvestris sarmenta vitis modo
ἀγρία. prælonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cor-
 Vigne tice, foliis hortensis solani, longioribus ac la-
 faulnage tioribus: muscoso flore, & capillaceo, fructu
 viorneou exiguis vuis simili, post maturitatem rubēte.
 hardie rotunda est acinorum facies. Enascētes viti-
 culæ cibi gratia sale cōdiuntur.

ἄμπιλος V I T I S sativæ facultas responder sylve-
 stri, sed imbecillior est.

πτελιά. V L M V S siccare valet, & abstergere, vul-
Orme. nera glutinare: præcipuè cortex, si recens fa-
 sciolæ modò vulneribus circūdetur: idem cū
 aceto lepras tollit. Ossa fracta radicum deco-
 cto perfusa, solidantur.

κοτυλή. C O T Y L E D O N, siue umbilicus Veneris
δών. folio est in acetabuli formā tornato, incui-
 offi. Vm. denter cōcauo, breui in medio cauliculo, in
 bilicus quo semen inest: radice oliuæ modo rotūda.

veneris Est & alterum genus eiusdem, cymbalion
κοτυλή. aliqui vocant, pinguibus foliis, latioribus, li-
δώνιτί- gularum modo densis, circa radicem mediū
ρα. oculi ambitū describētibus vt in maiore sem-
 peruiuo, astringentis gustus: cauliculo tenui,
 in quo flores & semina hyperici: radice ma-
 iuscula. Facit eadem quæ semperuiuum. Aeg-
 R refrigerat, repellit, abstergit, & dissipat. fo-
 lia ipsius cum radice commāducata calculos
 comminuere, & urinam cicere creduntur.

Duo VRTICAE genera, syluestris, aspe- ἀκαλίφη
rior, latioribus nigrioribúsq; foliis: semine Vrtic
lini, sed minore. altera non æquè aspera, mi-
nuto semine. Aeg. Vrticæ & fructus & folia
tenuem habet substantiam, citràque rosionē
ficcant, tumores discutunt, abstergunt, ven-
trem subducunt, mediocriter flatulenta, qua-
re etiam ad Venerem incitant. (Aeg.

V V A passa cōcoquit, astringit, leuiter dis- ἀσαφίς.
cutit.

X

X ANTHIVM nascitur leto & pin Herb. lap
gui solo & lacubus exiccatis, cau- pa minor
le cubitali, anguloso, pingui, pro- aut inuct
deutibus ex eo crebris alis. folia atriplicis ha- sa.
bet, insecta, nasturtium odore imitantia: fru-
ctum grandis oliuæ modo, rotundum, & vt
platani pilula, spinosum, qui contactu vesti-
bus adhærescit. Aeg. Xanthiū, phasganiūm- ξανθιον,
ve fructum fert discutientem.

XYLON, quem aliqui gossipion nomi-
nāt, frutex est exiguus, laniger, palmæ folio, ξύλον:
similem barbatae nuci gignens fructū, cuius cotonū
in exteriori bombyce lanugo netur in linum ou cotton
candidissimū mollissimūmq;. Gignitur & in
quadam arbore, cuius folia ni maiora essent,
vitium planè poterāt videri, cucurbitis coto-
nei mali amplitudine, quæ maturitate osten-
dūt lanuginis pilas, ex quibus vestes precio-
so linteo textūt. Theophrast. lanigeras Indiæ

arbores demonstrat mori folio, corpore autē cynorrhodi. foliotum succus medetur infantiū torminibus, semen tussi & pectoris vitiis. oleo eius emaculantur lentigines.

ῥυρίς.

offic. &

herb. iris

sylvestris

rer. glaiu

sauuagē

X Y R I S, folia habet iridis, latiora & in turbinem mucronata: quorum medio caulis erūpit crassus, cubitalis, ex quo filiquæ triangulares dependēt, in quibus purpureus flos, in medio puniceus: semen in folliculis, simile fabis: rotundum, rubrum, acre: radix longa, geniculata, rufa. Aeg. Xiris. aut xyris, naturæ tenuis est, discussorie & extrahentis, ac nimirum siccatoriae, præcipue semen, quod & vrinam cit, & licni indurato medetur.

Z

ῥαδιόρα

offic. &

med. ze-

doaria

Z

A D V R A, aliis ziduara, radix est teres, aristolochiæ nō absimilis, sapore & colore gingiberis. Hæc ad

nos India mittit. Cal. sic. 2. Corpus lætiore sagina reficit, flatu discutit. graue virus animæ quod alliū, cepa, vel vinum excitauit, abigit. venenatis moribus opitulatur. Crassiorē ventris spiritū digerit: aluū retinet, abscessus vteri soluit: vomitiones cohibet, & colicos mulcet cruciatus. (Nunc ferè nostræ ætatis medici cōtra pestilentis cœli contagia vtuntur.

Z A R N A B V M, vel zarnabadium, est

ῥαῖ.

espeltre

Arnabo.

Z E A duorū generum est. vna simplex, altera in geminis putaminib⁹ grana bina iun-

Et gerit. ob id dicoccos appellat. plus quàm hordeū alit. ori grata. digeritur in panificia, winus quàm triticum alens. Aeg. Zea tritico viribus respondet, medium inter calorem & siccitatem obtinens, leuiter exiccat, nec non obstruit.

ZIZIPHA Pampinius Italiae primus inuexit, baccis similia quàm malis, & intacta iam syluæ ascendunt, flore oleæ, sed odorato magis, corni baccis simile pomum. Quo amplius & maturius, eo innocentius, cū alioqui difficile perficiatur, & lienem offendat. itaq; decocto potius vtendum cēsent. Aedescina vocant quàm grādissima, calore & humore temperata, teste Actio: idē sanguinis acrimoniam edomant, probum succum creant, ferosum sanguinis humorem eliciunt. Decoctum eorum tussim & difficultatem spirandi lenit: pectori, renibus vesicæ prodest. Vomitionem acri concitatam humore sedant. Serica ea vocat Galenus, parui succi poma, nec concoctioni, nec stomacho facilia. Nanque, vt idē testatur, insolentibus & effrenatis pueris & mulieribus cibi gratia tantum expetuntur, exiguumque præbent alimentum. Rutilum & album ziziphum probatissimum ad apum passionē Columella scripsit.

Ζιζιφάς
off. iuu-
bes ou
guindo-
les.

PLANTARVM HISTORIAE
FINIS.



PARISIIS
EXCVDEBAT IOANNES LODOVI-
CVS TILETANVS.

M. D. XLI.





S.H.B.

7



